



FONDO PIZZOFALCONE



BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

VI



G.

Palchetto

Num.° d'ordine

48 353 39

NAZIONALE

B. Prov.



VITT. EM. III

1083

NAPOLI




B. Rev.

II

1083

5. -



C10279 SPH


ŒUVRES
DE
MONSIEUR TISSOT,
NOUVELLE ÉDITION,
Augmentée & imprimée sous ses yeux.
TOME SEPTIEME,
CONTENANT
LE TRAITÉ DE L'ÉPILEPSIE.



A LAUSANNE
Chez FRANÇOIS GRASSET & COMP.
Et chez les principaux Libraires de l'Europe.

M. DCC. XC.





TRAITÉ
DE
L'ÉPILEPSIE,

PAR MR. TISSOT.


D. M. DE LA S. R. DE LONDRES,
DES S. ACAD. DE BASLE, BERNE,
ROTTERDAM, ET DE LA S. R.
DE MÉD. DE PARIS, &c. &c. &c.



A LAUSANNE.

Chez FRANÇOIS GRASSET ET COMP.

M. DCC. LXXXIX.



T A B L E

D E S A R T I C L E S

Contenus dans ce Volume.

ART. I.	<i>Description de la maladie.</i>	pag. 3
II.	<i>Des causes de l'épilepsie en général, & de la cause prédisposante en particulier.</i>	24
III.	<i>Division des causes déterminantes.</i>	44
IV.	<i>Des épilepsies sympathiques qui ont leur siége dans quelque partie interne.</i>	48
V.	<i>Des épilepsies sympathiques qui ont leur siége dans les parties extérieures.</i>	85
VI.	<i>Réflexions sur les épilepsies sympathiques.</i>	98

VII. Des épilepsies idiopathiques.	pag. 104
VIII. Des causes qui déterminent le sang à la tête.	122
IX. Des épilepsies occasionnées par l'âcreté des humeurs.	138
X. Questions sur les causes de l'épi- lepsie.	146
XI. Des causes occasionnelles.	154
XII. Symptômes avant-coureurs.	170
XIII. Des maladies qui précèdent l'é- pilepsie, ou qui lui succèdent.	173
XIV. Singularités dans la marche de la maladie.	182
XV. Des effets de l'épilepsie.	186
XVI. Prognostic.	205
XVII. Idée générale du traitement.	223
XVIII. Traitement des épilepsies sympathiques qui ont leur siège dans les parties internes.	231
XIX. Traitement des épilepsies sym- pathiques qui ont leur siège dans les parties externes.	255

XX. <i>Traitement des épilepsies idio- pathiques.</i>	pag. 258
<u>XXI. <i>Traitement des épilepsies qui dépendent de la plethore ou de l'acreté.</i></u>	<u>267</u>
<u>XXII. <i>Traitement de la cause pré- disposante. Le régime.</i></u>	<u>270</u>
XXIII. <i>De la saignée & des autres évacuations sanguines.</i>	277
<u>XXIV. <i>Moyens d'empêcher que le sang ne se porte à la tête.</i></u>	<u>285</u>
<u>XXV. <i>Les spécifiques en général. La racine de Valériane.</i></u>	<u>300</u>
<u>XXVI. <i>Suite des spécifiques. La pi- voine, le guy, le musc, l'opium, les feuilles d'orangers.</i></u>	<u>314</u>
<u>XXVII. <i>Le kina, le fer, le camphre, le castor, l'assa fétida, la rue, le mercure, l'antimoine.</i></u>	<u>336</u>
<u>XXVIII. <i>Spécifiques inutiles.</i></u>	<u>353</u>
<u>XXIX. <i>Spécifiques dangereux.</i></u>	<u>359</u>
<u>XXX. <i>Usage des acides.</i></u>	<u>369</u>
<u>XXXI. <i>Usage du lait.</i></u>	<u>373</u>

XXXII. <i>Le bain froid.</i>	pag. 378.
XXXIII. <i>Les cauterés & les vésicatoires.</i>	387.
XXXIV. <i>Traitement pendant l'accès.</i>	394.
XXXV. <i>Traitement des suites de l'épilepsie.</i>	401.
XXXVI. <i>Epilepsie feinte.</i>	403.
XXXVII. <i>Récapitulation.</i>	411.

FIN de la Table.



TRAITÉ DES NERVEUX ET DE LEURS MALADIES.

CHAPITRE VINGTIÈME.

De l'Épilepsie.

§. I. **L'**ÉPILEPSIE est une maladie convulsive, dont chaque accès fait perdre sur le champ le sentiment & la connoissance, & est accompagné de mouvemens convulsifs plus ou moins violens, & dans un plus ou moins grand nombre de parties (a).

(a) Cette maladie a eu de tout tems plusieurs noms : on l'appelle encore aujourd'hui *mal caduc, haut mal, mal de la terre, mal de St. Jean*. Les anciens l'appelloient *mal*

2. DE L'ÉPILEPSIE.

Quand on dit, en la définissant qu'elle est accompagnée de convulsions violentes de toutes les parties, cette définition n'est pas applicable à toutes les épilepsies, puisqu'il y en a dans lesquelles les convulsions ne sont ni fortes ni générales.

L'écume de la bouche & la forte contraction des pouces, que quelques Médecins regardent aussi comme des caractères spécifiques de cette maladie, ne le sont point; j'ai vu, comme tous les Médecins, des accès dans lesquels les malades n'écumoient point; & la contraction involontaire des pouces est, comme on l'a vu ailleurs, un symptôme de plusieurs maladies convulsives qui ne sont point l'épilepsie.

d'Hercule, mal des Cornes, & sur-tout maladie sacrée ou divine, nom dont HIPPOCRATE a déjà fait sentir le ridicule, en prouvant que quelque terrible qu'elle soit, elle n'a rien que de très-naturel, & qu'elle dépend des causes physiques tout comme les autres. De morbo sacro, Chap. 3. CHARTER. Tome 101 page 478.

ARTICLE I.

Description de la Maladie.

§. 2. Comme les accès varient, non-seulement chez les différents malades, mais souvent même chez le même malade, il est impossible d'en donner une description qui convienne à tous, & il faut se borner à décrire d'abord la marche la plus ordinaire pour indiquer ensuite les singularités les plus remarquables. Cette première partie, l'histoire de la marche ordinaire, est si bien faite par Mr. VAN SWIETEN (b), que je ne ferai presque que le traduire très-librement, en ajoutant quelques-unes de mes observations propres.

Tous les malades perdent connoissance au moment où ils tombent, & la plupart poussent involontairement un cri violent dont ils ne conservent jamais aucune idée; ils sont en même tems attaqués de convulsions très-variées & très-singulières dans les différentes parties musculaires.

Le front & la peau chevelue sont excessivement agités, les cheveux s'hérif-

(b) §. 1073. Tome 3. p. 397.

sont , les sourcils sont en mouvement, quelquefois ils s'abaissent & se rapprochent, comme on le voit dans les mouvemens d'indignation , & alors les yeux sont ordinairement saillans , fixes , tendus , comme dans la colere. J'ai vû ce coup d'œil si marqué chez une femme , pendant plusieurs accès , & si exactement ressemblant au regard d'une personne irritée, que j'oubliois presque que c'étoit l'effet de la convulsion.

L'agitation des paupieres n'est pas moindre , & quoiqu'elles soient ordinairement fermées, il est rare qu'elles le soient complètement ; on apperçoit presque toujours la partie inférieure de la cornée transparente , & la paupiere supérieure est dans un tremblement très-vif & continu ; souvent on remarque que l'œil recouvert par la paupiere est dans un mouvement de rotation très-rapide.

Les autres muscles du visage ne sont pas moins agités ; ceux sur-tout qui forment les joues , se meuvent de façon à produire les grimaces les plus singulieres , il n'est pas rare de voir ceux des lèvres les allonger en forme de bec , & les retirer, en les élargissant presque jus-

ques aux oreilles. Mr. ROERHAAVE vit une Juive, chez laquelle ce mouvement étoit si rapide, qu'il occasionnoit un vertige à ceux qui le regardoient attentivement (c).

La mâchoire inférieure peut être ouverte avec tant de force que Mr. VAN SWIETEN a vû un jeune homme chez qui elle fut luxée, n'ayant pas été remise d'abord, elle ne put jamais l'être; & cet infortuné, reçu dans un hôpital, y mena la vie la plus triste : mais un accident très-ordinaire & le plus effrayant, c'est les convulsions violentes de cette mâchoire, qui saisissant souvent la langue, portée elle-même en avant par ses propres mouvemens convulsifs, la broye cruellement, la blesse très-souvent, la partage quelquefois presque entièrement; comme ARETÉE en avoit déjà averti, & comme on en voit un exemple dans TURNER (d), l'ampute même totalement. Le sang qui en coule, rougissant l'écume qui sort ordinairement des lèvres & que j'ai vû, chez deux malades, avoir une odeur cadavereuse insupportable.

(c) Ibid.

(d) *Art of Surgery*, Tom. I. Obs 54. p. 378.

table, que je ne vois indiquée par aucun observateur, rend le spectacle plus pénible; & le grincement continuél de dents, qui est quelquefois assez fort pour en faire sauter des fragmens avec impétuosité, comme Mr. VAN SWIETEN en a été témoin lui-même (e), & comme on le voit déjà dans les Mémoires des Curieux de la nature (f), en aggrave l'effrayant pour tous ceux qui, ne pouvant pas se persuader que des mouvemens si violens ne soient point sentis par le patient, s'imaginent que ses souffrances sont proportionnées à son action.

La tête exécute, avec une rapidité qu'on a peine à comprendre, les mouvemens les plus extraordinaires; quelquefois, c'est une rotation continuelle; dans un autre moment, elle est portée alternativement en avant & en arriere, avec une force à laquelle rien ne résiste; d'autrefois elle est fixe dans l'une ou l'autre de ces attitudes, c'est-à-dire, le menton fixé sur la poitrine, ou la tête absolument renversée en arriere; quelquefois le col est dans l'état de la plus

(e) Ibid.

(f) *Decur. 2. ann. 7. Observ. 110. p. 176.*

grande roideur , & auffi peu fufceptible d'aucune flexion qu'un col de marbre : j'ai vu un jeune homme qui avoit de fréquens accès , & pendant toute la durée de chaque accès, la tête étoit fi fortement tournée du côté gauche que le menton repofoit prefque fur l'épaule.

Les bras , les mains , les doigts exécutent avec une grande violence , les mouvemens de flexion , d'extenſion , d'abduction , d'adduction , de rotation , de pronation , de ſupination , & la cloſure du pouce , dont j'ai parlé , eſt plus ordinaire que bien d'autres mouvemens , parce qu'il a des muſcles plus forts que les autres doigts.

Les muſcles du tronc , c'eſt-à-dire du dos , de la poitrine , du bas-ventre , ſont également agités , & l'on voit très-ordinairement la poitrine & les muſcles du bas-ventre ſe mouvoir avec une grande célérité & le tronc ſoulevé , tourné , courbé , par leurs différens mouvemens : d'autres fois tous ceux qui meuvent le tronc ſe roidiſſant dans le même inſtant , le malade ſe trouve dans un véritable tetanos ; ſi la convulſion attaque ceux qui fléchiffent , on voit naître un emproſtonos , & un

οἰστίτονος si ceux qui le renversent sont seuls convulsés. Tous ces mouvemens se succèdent quelquefois dans le même accès; d'autres fois on ne les observe que dans des accès différens. Les muscles des cuisses, des jambes & des pieds sont dans le même cas & éprouvent de fortes convulsions ; si l'on n'apperçoit pas ordinairement ceux des doigts des pieds chez les adultes qui les ont couverts, on n'en est pas moins sûr de leur existence, puisqu'on les voit très forts chez les petits enfans qui ont ordinairement ces parties nues, & qui offrent mieux que les adultes quelques parties du spectacle d'un accès, parce qu'on a leur corps tout entier sous les yeux ; j'ai vû les doigts des pieds s'écarter les uns des autres si étonnamment qu'ils paroissent allongés du double ; quelquefois le pied se courbe si prodigieusement que le bout du gros doigt est porté presque sous le talon (g) ; & en général l'action des muscles est si

(g) Ce sont les fortes convulsions des jambes jointes à cette espece de gémissement qu'on remarque pendant l'accès qui ont occasionné la comparaison d'ARETÉE, *Εσθραγγμένοισι Ταύροις ἥδε κέλη η̄ ξυμφορη.* De caus. & sign. acut. morbor. Liv. I. Chap. 5. p. 2.

ariée & si forte, qu'elle exécute non-seulement les mouvemens les plus bizarres, mais encore ceux qu'on croiroit les plus impossibles même aux pantomimes les plus exercés, & les exécute avec une force infiniment supérieure à celle de l'homme sain.

Un si grand travail occasionne nécessairement une sueur abondante, les malades en sont ordinairement baignés, sur-tout dans les parties supérieures, la tête, le col, la poitrine. Mr. DE HAEN, qui observe avec tant d'exactitude, l'a vue d'une fœtidité extraordinaire & si abondante que le lit même en étoit mouillé (b).

Les rots, les borborigmes, les vomissemens, les évacuations involontaires des excréments, de l'urine, du sperme prouvent que les muscles intérieurs sont dans le même état de convulsions que les extérieurs. Il y a, il est vrai, des malades chez lesquels aucune de ces évacuations n'a lieu, mais il y en a aussi plusieurs dans lesquels elles sont très-fortes; & j'ai averti dans un autre ouvrage que les accès accompa-

(h) *Ratio medendi*, pars 5, cap. 3. § 6.

gnés d'une évacuation de sperme , accabloient beaucoup plus le malade que les autres ; celle des urines est assez fréquente ; j'ai vu des enfans chez lesquels elle formoit un jet de dix pieds , c'est même quelquefois par la vessie que la convulsion commence , & l'évacuation involontaire de l'urine forme le premier symptôme , comme cela arriva au premier enfant que VEFFER vit mourir des effets de la ciguë (*i*) & à une femme qui , où qu'elle fut , se trouvoit tout-à-coup obligée de rendre son urine , & perdoit tout de suite connoissance (*k*). J'ai sous les yeux un malade qui fait des efforts pour vomir pendant la plus grande partie de l'accès , quoique la cause du mal ne soit point dans l'estomac ; l'évacuation des matieres fécales est la plus rare ; les rots , & les borborigmes sont très-ordinaires , & il n'est point surprenant qu'il y ait autant de convulsions internes , puisque c'est une observation constante , dont la raison se

(*i*) *De cicut. aquat. p. 6.*

(*k*) SCHENCKIUS , *Observationes Medic.* fol. p. 119.

trouve aisément dans la structure des arties, qu'il faut une irritation bien moins forte pour convulsionner les muscles internes que les externes; aussi les convulsions des membres sont assez rares, & celles des organes intérieurs sont une des maladies les plus fréquentes. J'ai vu quelquefois de fortes palpitations de cœur; PECHLIN en vit d'effrayantes chez une femme (1), & le pouls pendant l'accès est toujours vite: il seroit même presque impossible, qu'il ne le fût pas, cette violente action de tous les muscles lui donne la même fréquence que lui donneroît un exercice très-fort; dans les commencemens, il est petit, & il acquiert de la force à mesure que l'accès avance; souvent il est irrégulier, & quelquefois la difficulté de le tater exactement le fait paroître tel, lors même qu'il ne l'est pas; je m'en suis assuré plus d'une fois en touchant l'artère temporale. Mr. MORGAGNI a fait quelques observations intéressantes sur la lenteur du pouls dans quel-

(1) *Observ. Phys. Med.* Liv. 2. Obs. 29.
page 285.

ques épileptiques hors de l'accès ; mais elles m'ont paru mieux placées dans le chapitre du poulx qu'ici.

La gêne qu'éprouve la respiration fait que le sang ne pouvant pas se porter au poulmon, s'arrête dans la veine-cave , & par-là même toutes les veines restent plus gonflées ; on s'en aperçoit sur-tout aux veines jugulaires , aux ranines , aux frontales ; le visage se gonfle , devient rouge , livide , noir , & quelquefois reste échimofé après l'accès ; j'ai été consulté par un malade , chez qui cette échimofe étoit très-forte au front & aux yeux , quand les accès étoient forts ; il est sur-tout très-fréquent que le visage reste parsemé de petites taches rouges , suites du sang extravasé , qui se dissipent quelquefois au bout de quelques heures , mais que j'ai vû d'autres fois durer plusieurs jours. Il peut aussi se faire des épanchemens intérieurs ; Mr. VAN SWIETEN a vû rendre le sang par les vomissemens & par les selles (*m*) , & l'on en trouvera d'autres exemples plus bas.

(*m*) VAN SWIETEN , §. 1 77. page 429.

§. 3. La durée des accès n'est point fixe , j'en ai vu ne durer que trente-sept à quarante secondes , d'autres dix à quinze minutes , quelques-uns plusieurs heures ; BARBETTE parle d'une fille de vingt ans dont les accès n'étoient pas extrêmement violens , mais ils durent toujours quatorze heures (n). La durée la plus ordinaire est depuis dix jusqu'à vingt minutes , & ils finissent ordinairement au moment où la violence du mal paroît parvenue à son dernier période & où le malade paroît prêt à suffoquer ; la respiration devient tout-à-coup plus lente & plus aisée , la vitesse du pouls se ralentit , les convulsions diminuent & bientôt cessent tout-à-fait ; le malade reprend sa physonomie , il ouvre les yeux & a l'air étonné ; tous ses membres paroissent engourdis , il se sent une lassitude & une faiblesse générale , quelquefois il reprend la connoissance sur le champ , d'autres fois il reste plusieurs heures avant que de revenir parfaitement à lui ; & pendant tout ce tems , il paroît quelquefois dans un état de mal-

(n) *Praxeos Medica* , Liv. 1. Chap. 1.

aïse, d'autres fois il s'endort profondément au moment même où l'accès cesse & dort plusieurs heures de suite; mais soit qu'il s'endorme ou ne s'endorme pas, il ne conserve également aucune idée de ce qui s'est passé & aucun souvenir [de l'accès. Quelques malades ont d'abord repris leurs forces; d'autres restent languissans & changés pendant quelques jours; presque tous conservent un peu de tristesse, & souvent une sensibilité excessive & de la mauvaise humeur.

J'ai été consulté pour une malade chez laquelle tous les accès, & elle en avoit beaucoup, se ressembloient; " ils
 „ commençoient par un criaillement
 „ d'environ une minute, des convul-
 „ sions de sept ou huit, au bout des-
 „ quelles elles bavoit des glaires, puis
 „ un évanouissement de dix à douze,
 „ & ensuite un assoupissement, soit som-
 „ meil de vingt-cinq à trente; ainsi
 „ le tout duroit ordinairement plus de
 „ trois quarts-d'heures. "

Une autre femme, dont je reparlerai plus bas, étoit ordinairement attaquée la nuit, & ne s'apercevoit de ses accès que le lendemain par une tristesse

cablante & une espèce de frayeur intérieure qui ne l'abandonnoit point.

Mr. VANDELLI, premier médecin du duc de Modene, a vu deux fois, chez son valet, que l'accès laissoit une hydrophobie, ou une aversion passagère pour l'eau, qui se dissipoit bientôt après (o) ; & cette observation rappelle ce qu'on trouve dans le Journal de médecine l'histoire d'un malade observé par Mr. BRIEU, dont le mal commença par de longs & violens maux de tête, ensuite des accès d'épilepsie, & enfin une véritable hydrophobie qui termina sa vie (p).

§. 4. J'ai décrit la marche la plus ordinaire & la plus fâcheuse, mais ce n'est pas la seule, & SENNERT a déjà bien vu qu'elle étoit souvent fort différente ; quelquefois, dit-il, dans une légère épilepsie, les convulsions ne sont point générales, le malade ne tombe point, mais quelques parties seulement entrent en convulsion ; les uns ne font

(o) SAUVAGES, *Nosolog. methodic.* Clas.
1. Tom. 2. page 235.

(p) *Journ. de Med.* Tom. 14. page 315.
Avril 1761.

que secouer la tête, d'autres renverser les yeux, d'autres agiter les bras & les jambes; il y en a chez qui la convulsion n'est marquée que par la cloture des mains, d'autres tournent, d'autres enfin courent, mais tous ont ceci de commun, c'est qu'ils perdent absolument le sentiment & ne conservent aucune idée de ce qu'ils éprouvent (q). Il paroît en effet qu'on doit admettre pour caractère de l'épilepsie une perte totale & subite de sentimens avec quelques mouvemens convulsifs, & reconnoître pour accès d'épilepsie tous les accidens qui auront ce double caractère, quelques dissemblables qu'ils puissent être d'ailleurs par la violence & par la durée; mais quelques violentes & quelques générales que soient les convulsions, si elles ne sont pas accompagnées de perte de connoissance & de sentiment, ce n'est point l'épilepsie (r).

§. 5. TRINCAVELLI parle d'un enfant qui avoit eu pendant quelque

(q) Dan. SENNERTI *Medicina practica*, Liv. 1. Sect. 2. Chap. 31. Tom. 1. page 728.

(r) HOLLERIUS *opera omnia pract.* Chap. 15. *De epileps. scolium.* page 95.

tems de légers accès; tous les quinze jours, ils devinrent si fréquens qu'il en eut jusques à cent cinquante dans un jour, mais ils n'étoient marqués que par une convulsion de la tête & une petite bulle d'écume au coin de la lèvre (s); & l'on trouve dans l'ENIVERNIUS l'histoire d'une jeune fille qui ne tomboit point, n'écumoit point, mais restoit debout ou dans telle autre attitude dans laquelle elle se trouvoit, & remuoit seulement la tête de côté & d'autre, avec une grande rapidité sans rien voir & sans rien entendre (t), & après l'accès, elle ne se souvenoit point de ce qui lui étoit arrivé. DURET parle dans ses Commentaires sur la pratique d'HOLLIER, d'une épiéptique qui ne remuoit que la tête, & ERASTE d'une autre qui n'éprouvoit qu'une courte perte de connoissance avec une contraction presqu'insensible des levres. PECHLIN parle aussi d'une jeune personne dont les accès n'étoient qu'une légère contorsion des yeux, de la tête &

(s) *Consil. Lib. 1. cons. 25. v. Mercur. compilat. p. 167.*

(t) SENNERT. *inst. medic. Lib. 2. pag 3. sect. 1. ch. 9.*

de la poitrine, avec privation de sentiment, ce qui duroit à peine la dixième partie d'une minute.^(u), mais ils revenoient plusieurs fois par jour.

J'ai vu un enfant de dix ans chez qui les accès ne furent pendant long-tems caractérisés que par une perte instantanée de connoissance & un violent mouvement du bras droit qui jettoit fort loin ce qu'il se trouvoit tenir à la main; j'avertis ses parens du danger, ils y firent peu d'attention, le mal continua; deux ans après il survint de véritables accès d'épilepsie, très-forts & très-fréquens; la convulsion du bras droit étoit toujours la plus marquée, & souvent entre les grands accès les premiers reparoissoient. J'ai vu une jeune personne chez qui ils n'étoient marqués que par une convulsion instantanée des muscles du visage & du col, avec la perte cependant de connoissance; chez une autre, un léger cri produit par la convulsion du larynx étoit le seul symptôme convulsif qui accompagnât la perte de connoissance; l'une

(u) *Observat. physico. medic.* Tom. 2. obs 29. page 283.

& l'autre eurent ensuite des accès très-orts. J'ai été consulté depuis peu par un homme de trente ans chez qui la perte de connoissance qui entraîne sur le champ une chute brusque, dure six, sept & même huit heures, sans cris, sans convulsions violentes, mais un très-ort resserrement de la machoire & des poignets. C'est cette espece sans doute qu'on a appelé *épilepsie apoplectique*, & qui est déjà indiquée dans COELIUS AURELIANUS (x). Mais Mr. de SAUVAGES remarque très-bien qu'on la distingue toujours de cette maladie par le spasme, ou de la machoire, ou de quelques doigts, ou des muscles du bas-entre (y) : on la distingue aussi par la respiration toujours gênée dans l'apoplexie & libre dans l'épilepsie, quand les muscles de la respiration ne sont pas convulsés ; on la distingue de la vraie incopie, parce que le coloris, la force & la liberté du pouls subsistent. Je vis, il

(x) *Morbor. chronicor. Lib. prim. Cap. tum p. 291. ejus passionis species duæ esse rebantur* : alia quæ somno similis altissimo idetur : alia quæ diverso raptu corpus afficit.

(y) *Nosolog. method. 4to. Tom. 1. page.*

Y a plusieurs années une fille de vingt-huit ans, qui éprouvoit depuis trois mois le cinquième accès de cette espèce; je ne vis d'abord de convulsif que le serrement des mâchoires, mais en l'examinant bien attentivement, je découvris que la langue étoit dans une action continuelle. Mr. MORGAGNI parle d'une malade chez qui l'accès commençoit par un léger tremblement auquel succédoit une roideur générale, sans mouvemens, avec perte de connoissance (2).

Il y a des accès bien opposés, & on lit, dans un recueil d'observations, ce de d'un homme dont tout l'accès consistoit à être forcé de courir dix pas en arrière, tomber sans connoissance & se relever sur le champ très-bien (a). Chez un jeune homme, dont parle le même PEIROUX, l'accès étoit tout aussi bizarre; il croyoit voir venir au galop & avec grand bruit un carrosse dans lequel il y avoit un petit homme en bonnet rouge; craignant d'être écrasé par ce carrosse, il

(2) *De sedib. & causis morbor.* L. 1. Ep. 9. §. 16.

(a) PEIROUX, *observat. medicin.* p. 90.

tomboit roide & sans connoissance, & un instant après il revenoit à lui (b). OETHEUS parle d'un autre qui en commençant l'accès, étoit obligé de tourner plusieurs fois circulairement (c). L'on trouve déjà chez un plus ancien observateur, l'observation d'une épilepsie qui faisoit courir (d).

L'on m'a amené en Septembre 1769 une étrangere, âgée de quatorze ans, dont la maladie offre quelque singularités remarquables.

Elle avoit joui d'une très-bonne santé jusqu'à l'âge de sept ans; à cette époque, elle se trouva sur l'eau en partie de plaisir avec d'autres jeunes personnes, au moment d'un orage violent qui les effraya toutes beaucoup, mais elle fut la seule qui ne vomit pas. Quelques jours après, on remarqua dans les paupieres un mouvement qui parut d'abord un tic, mais qu'on reconnut bientôt pour

(b) Ibid. p. 81. Le fils d'ALSAHARAVIUS voyoit venir à lui une femme noire couverte d'un cuir, & tomboit, quand elle l'approchoit. SCHENKIUS, pag. 112.

(c) SCHENKIUS, *Observat. medica.* vol. 1. Francof. 1609. pag. 119.

(d) V. SENNERT *ibid.*

être convulsif : on la confia aux soins de deux médecins très-habiles qui ne purent pas empêcher qu'il ne parut au bout de quatre mois de vrais accès d'épilepsie, qui étoient très-forts & très-fréquens, & durèrent plusieurs mois ; pendant une partie de ce tems, la jeune malade avoit fréquemment, dans l'intervalle des grands accès, de petits très-courts qui n'étoient marqués que par une perte instantanée de connoissance qui lui coupoit la parole, avec un très-léger mouvement dans les yeux ; souvent en revenant à elle, elle achevoit la phrase, au milieu de laquelle elle avoit été interrompue, d'autres fois elle l'avoit oubliée. Pendant une autre partie de ce même tems, ces accès instantanés ne la prenoient jamais que quand elle marchoit, elle étoit arrêtée sans connoissance pendant quelques secondes, & il y avoit toujours un léger mouvement convulsif dans la jambe qui étoit en avant. Cependant les grands accès s'éloignoient, mais ces petits étoient fréquens, quand un jour, après en avoir eu plusieurs, la malade alla se baigner dans la rivière avec une femme de chambre, & depuis cet instant, elle resta vingt & un mois sans en

avoir ni grands ni petits. Les grands reparurent à cette époque dans le moment du chagrin de la mort imprévue d'un pere , & dès-lors ils ont continué, & sont assez fréquens dès les premiers froids de l'automne jusques aux premiers jours chauds de l'été ; mais pendant toute cette dernière saison , la malade n'en éprouva aucun & jouit d'une parfaite santé , à cela près qu'elle a le genre nerveux très-mobyle, s'attriste souvent & s'effraye avec la plus grande facilité ; les bains froids que le succès du premier avoit indiqué , lui ont été inutiles dans cette rechute.

Il me paroît inutile de rapporter un plus grand nombre de variétés d'accès épileptiques, l'énumération de celles qui ont été observées resteroit toujours très-incomplète , & le nombre de celles qui sont possibles est indéfini.

Je finirai cet article par remarquer que chez plusieurs malades , tous les accès ne sont pas également forts ; il y en a qui ont souvent les avant-coureurs de l'accès sans que l'accès suive ; d'autres un commencement momentané d'accès qui disparoit bien vite ; j'ai vu, il n'y a que peu de jours, un garçon tailleur dont les accès commençoient tous par un petit mouve-

ment involontaire des doigts, comme s'il avoit badiné, pendant lequel il ne perdoit point connoissance ; ce mouvement revenoit très-souvent, (je le vis deux fois dans un quart d'heure,) sans aucune autre suite ; c'étoit le premier degré de la maladie, le second étoit l'enroissement des doigts qui se ferroient avec beaucoup de force, & le malade tomboit dans l'insensibilité & l'assoupissement ; mais dans un assoupissement agité & inquiet ; souvent encore le mal en restoit là, & au bout de quelques minutes le malade se réveilloit, croyoit avoir dormi & se faisoit ; quand il parvenoit au troisième degré, les convulsions étoient d'une violence étonnante, & au réveil le malade étoit encore plus courroucé qu'après le second degré.

ARTICLE II.

Des causes de l'Epilepsie en général & de la cause prédisposante en particulier.

§. 6. La cause de cette maladie ne peut exister que dans le cerveau & à l'origine des nerfs, qui paroissent être fortement comprimés ou contractés dans ce moment là. Cette compression pousse

pousse les esprits animaux dans les nerfs moteurs, comme la contraction du cœur chasse le sang dans les arteres, & elle empêche l'abord de ceux qui reviennent par les nerfs sentans, tout comme le sang veineux est empêché de se jeter dans le cœur pendant sa systole. En comprimant le cerveau, on peut aisément empêcher le sentiment; si l'on exerceoit une compression plus forte, on forceroit le mouvement des esprits animaux, & on produiroit une épilepsie plus ou moins forte & plus ou moins générale; c'est peut-être uniquement de cette façon qu'elle est souvent produite par les épouchemens & guérie par le trépan. L'épilepsie, par rapport au cerveau, est donc une action trop forte des esprits animaux moteurs, & un empêchement total à l'action des esprits animaux sentans; ou bien il y a une action trop forte & irrégulière dans les arteres nerveuses, une suspension d'action dans les veines correspondantes. Une forte convulsion du cerveau, ou au moins de cette partie du cerveau qu'on appelle le *sensorium commune*, qui est celle d'où partent tous les nerfs, peut produire cet effet; la

plus ou moins grande durée, force & étendue de la convulsion & la plus ou moins grande aptitude des différens muscles à être convulsés, ce qui dépend de leur plus ou moins grande irritabilité, produisent toutes les variétés de l'accès.

§ 7. Pour produire l'épilepsie, il faut donc nécessairement deux choses; 1°. une disposition du cerveau à entrer en contraction plus aisément qu'en santé; 2°. une cause d'irritation qui mette en action cette disposition.

La première de ces conditions, la disposition du cerveau, est ce qu'on appelle cause *prédisposante*, ou dans les écoles, *proegumene*; la seconde est la cause *déterminante* ou *procatartique*.

Peut-être le cerveau de tous les hommes est susceptible d'acquérir cette disposition, qui mise ensuite en jeu, produit le paroxisme; mais elle n'existe que chez un assez petit nombre, & tous ne l'acquièrent pas avec la même facilité. Chez ceux, chez qui elle existe, elle est, ou héréditaire, dit Mr. BOERHAAVE, ou connée, c'est-à-dire acquise dans le ventre de leur mère par une suite de frayeur (c).

(c) *Aphor.* 1075.

§. 8. L'on ne peut pas nier l'hérédité de quelques maladies ; elle n'est que trop constatée pour la goutte , pour les maladies scrophuleuses , quelquefois pour les maux de poitrine , & j'ai été consulté pour le quinzieme enfant d'un pere mort étique , dont les quatorze aînés étoient morts de cette maladie entre l'âge de quatorze & dix-huit ans ; il est possible que l'épilepsie soit héréditaire ; la foiblesse du genre nerveux s'hérite , & cette hérédité ne contribue pas peu à la rendre plus fréquente : on lit dans un ouvrage publié comme leçons de Mr. BOERHAAVE , qu'il vit mourir épileptiques tous les enfans d'un pere qui l'étoit (f) , & ZACUTUS LUSITANUS avoit déjà connu un pere épileptique , dont huit fils & trois petits fils le furent cruellement jusques à leur mort , & dont il ne sauva un arriere petit-fils qui l'étoit aussi que par le moyen du cautere ; il est vrai que cette observation chez un auteur fort épris du merveilleux , n'est pas extrêmement concluante (g) ;

(f) *Praxis medica* , Tom. 5. pag. 30.

(g) *Liv. 1. Observ. 33.*

mais quand l'épilepsie feroit quelque-fois héréditaire, comme il le paroît, il ne faut point croire que ce soit une hérédité inaliénable : PECHLIN a déjà remarqué qu'on voyoit des femmes cruellement tourmentées par cette maladie, dont les enfans en étoient absolument exempts, & je connois beaucoup d'enfans nés de peres ou de meres qui en sont atteints, qui n'en ont jamais eu aucun ressentiment; j'ai soigné souvent dans différentes maladies, la fille d'un pere attaqué de cette maladie dès long-tems avant son mariage, & qu'elle tua quelques années après, chez qui je n'ai jamais vû, même la plus légère convulsion; mais je n'en suis pas moins persuadé, comme Mr. BOERHAAVE, que par plusieurs raisons ceux qui ont le malheur d'y être sujets, devroient se faire un devoir de vivre dans le célibat.

§. 9. Par rapport à l'épilepsie connée, admise par Mr. BOERHAAVE & par tous ceux qui admettent les influences de l'imagination des femmes enceintes sur leurs enfans, j'avoue que je ne puis point la comprendre, & que je crois en

voir trop clairement l'impossibilité pour pouvoir l'admettre.

La communication qu'il y a entre la mere & l'enfant n'est point aussi intime que l'imaginent ceux qui ignorent comment elle se fait ; elle est même moins étroite que celle qu'il y a entre la terre & la plante qu'elle nourrit , puisqu'il y a un corps étranger interposé entre la mere & l'enfant ; c'est le placenta ou l'arriere faix , qui tire sa nourriture de la matrice par des vaisseaux qui n'ont aucune communication avec ceux de l'enfant , & celui-ci tire la sienne de l'arriere-faix par de petits vaisseaux qui la pompent exactement comme les racines de la plante : l'on voit par-là qu'il n'y a pas plus de liaison entre l'uterus & l'enfant , qu'entre l'arrosoir qui fournit l'eau à un vase & l'arbrisseau qui croit dans ce vase ; il n'y a point de vaisseaux ni de nerfs communs ; il n'y a même aucun nerf dans tout le placenta ; il n'y a point par-la même de moyen d'action immédiate de la mere sur l'enfant ; il n'y a donc point d'influence. L'enfant ne peut souffrir de la part de sa mere que de trois façons. 1°. Mécanique.

ment, si elle se donne un coup, si elle fait une chute, si elle est comprimée, alors il est certain qu'il souffrira ce que souffriroit un vase qui seroit dans un sac mol, si ce sac recevoit des coups. 2°. De la corruption des humeurs de la mere; si elle n'a qu'un sang pauvre & gâté à fournir au placenta, celui-ci n'est plus qu'une mauvaise terre impregnée de sucs nuisibles, incapables de nourrir une belle plante; ainsi l'enfant, ou mourra, ou languira; apportera une santé foible, chancelante & une grande disposition à toutes les maladies. 3°. Par la violente contraction de l'uterus; cet organe a ses fibres charnues, il est par-là même susceptible de spasmes, il en éprouve souvent, & si la contraction est très-forte pendant la grossesse, elle peut ou détacher le placenta, & c'est une des causes les plus fréquentes des fausses couches, ou, ce qui est plus difficile, comprimer l'enfant au point de l'endommager, peut-être même de le tuer: mais on voit qu'aucune de ces façons d'agir ne ressemble à celle qu'admettent les partisans de l'opinion que je rejette, & qui a été combattue fort en détail & avec

une force victorieuse par plusieurs autres médecins (h).

Mr. VAN SWIETEN allégué en faveur des épilepsies connées (i) une observation tirée de FABRICE de Hilden, mais qui me paroît bien éloignée d'être concluante; une jeune fem-

(h) *Dissertation physique sur la force de l'imagination des femmes*, traduite de l'anglois de Mr. BLONDEL, 8°. Leyde 1737. *Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes*, 12 Paris 1745. Ce petit ouvrage sensé & bien écrit, est sans nom d'auteur; mais je vois dans la *France littéraire*, qu'on l'attribue à M. Isaac BELLET, médecin de Bourdeaux. J. G. ROEDERER, *Dissertatio pro questione ab Academia Petropolitana proposita*. L'académie de Pétersbourg avoit proposé en 1756, d'expliquer comment l'imagination de la mere agissoit sur l'enfant; Mr. KRAUSE, médecin de Leipfick, résolut cette question & eut le prix; Mr. ROEDERER prouva qu'elle rouloit sur un fait impossible, & ne fut point couronné. Mr. de HALLER, qui dans ses premiers ouvrages, avoit admis le système commun, & cru aux envies, a fait voir depuis lors qu'elles étoient une chimere.

(i) §. 1075. T. 3. p. 406.

me, très bien portante, fut extrêmement effrayée dans sa première grossesse par un homme qui tomba épileptique à ses pieds, & au bout de quelques mois, elle accoucha d'un enfant, qui, peu de tems après sa naissance, fut attaqué d'accès épileptiques, qui se reproduisant malgré tous les remèdes, l'emportèrent avant l'âge d'un an. Si la vue de cet épileptique avoit procuré un accès d'épilepsie à la mere, s'il lui avoit occasionné une fausse couche, ou d'autres accidens aussi graves, il n'auroit pas été douteux qu'ils dépendissent de la frayeur qu'elle avoit eue; une frayeur produit tous les jours cet effet chez ceux qui l'éprouvent; mais qu'elle ait produit l'épilepsie de l'enfant, voilà non seulement ce qu'on n'expliquera pas, mais ce qui ne peut pas être; & malheureusement il a péri par l'épilepsie tant d'enfans, dont les meres étoient très-saines, dont les freres & sœurs n'en ont jamais eu d'attaque, qu'il n'est point nécessaire de recourir à la frayeur de la mere pour expliquer ce fait; & l'on voit par tout cet article que les épilepsies sont très-rarement héréditaires & connées, mais

plus ordinairement acquises après la naissance.

§. 10. La facilité à l'acquérir, varie beaucoup, suivant l'âge, le tempérament, le sexe.

Les enfans sont d'autant plus susceptibles de cette maladie, qu'ils sont plus jeunes, & c'est dans ce seul sens qu'on pourroit dire qu'elle leur est connée. Les nerfs, à cet âge, sont très-mobiles; la plus légère cause les agite considérablement, & les muscles sont très-irritables: ainsi l'épilepsie doit naître très-aisément.

L'irritation du méconium qui n'a pas été assez évacué, celle que produit un peu d'acide dans l'estomac ou dans les intestins, des matières glaireuses, qui gênent la respiration, des ligatures trop fortes, une humeur âcre, qui ne se dépose qu'incomplètement sur la peau, comme l'humeur des croutes de lait ou de la teigne, ensuite les dents, les vers, &c., jettent ces petites créatures dans des accès d'épilepsie les plus forts & les plus fréquents; pendant que des causes irritantes bien plus actives, ne produisent point le même effet chez les adultes, parce que l'âge,

en donnant de la consistance au genre nerveux, diminue cette facilité à se convulser, qui fait le caractère de l'enfance.

Mr. VAN SWIETEN a très-bien remarqué qu'un accès de colere, qui ne paroît produire aucune altération sensible chez la nourrice, altère cependant assez son lait, pour que l'enfant qui l'allaita tombe dans de violentes convulsions dès qu'il l'a avalé (*k*).

Au bout de quelques années, les changemens que l'âge seul opere auront affermi les nerfs de l'enfant, ils seront devenus presque inébranlables; & si quelque maladie a affoibli ceux de la nourrice, la même impression, qui jettera celle-ci dans des convulsions, n'occasionnera peut-être pas même un mouvement de crainte à son nourrisson; aussi il ne faut point craindre pour la suite les attaques d'épilepsie que les enfans éprouvent les premiers mois, & même la première année de leur vie; la cause prédisposante de l'épilepsie existe bien alors dans leur cerveau, mais elle est telle que chaque

(*k*) §. 1074. T. 3. p. 403.

jour la diminuera, & qu'elle se détruira d'elle-même absolument; je vois tous les jours un nombre de jeunes gens jouissant d'une bonne santé, & n'ayant aucune maladie de nerf, à qui j'ai vu plusieurs accès d'épilepsie dans les premiers mois de leur vie. Mais si, après la première année, les accès continuent, s'ils se reproduisent souvent & pour de légères causes, s'ils paroissent accabler l'enfant, s'il y a quelque partie qui, dans tous les accès, paroisse plus constamment affectée, s'il reste dans la physionomie quelque chose d'étonné, si les facultés ne se développent pas autant qu'on devoit l'espérer, alors il est à craindre que le mal ne se perpétue; j'ai vu plusieurs enfans épileptiques, de huit ou dix ans, dont le mal avoit exactement suivi cette marche; aussi dès que je vois un petit enfant dans ce cas, je donne la plus grande attention à son état, & avec quelques remèdes, & sur-tout beaucoup d'attentions de régime, j'en ai préservé un grand nombre du triste avenir qui paroissoit les attendre.

§. II. Le tempérament & le sexe varient aussi beaucoup l'aptitude à l'épi-

lepsie, si l'on veut me passer ce terme ; il y a des personnes fortes, robustes, dont le genre nerveux n'a aucune mobilité & ne s'altère point par les impressions, dont les muscles fermes & denses ne sont presque pas convulsibles, qui ne sont presque pas susceptibles de cette cruelle maladie, à moins que quelques causes mécaniques ne fassent une irritation sur leur cerveau même, comme dans les cas où une plaie à la tête jette dans des accès d'épilepsie le grenadier le plus intrépide ; ces gens-là n'ont que bien peu de disposition à devenir épileptiques ; il faut une cause bien forte pour les rendre tels, tandis que d'autres, foibles, délicats, dont la constitution se rapproche de celle de l'enfance, dont les nerfs mobiles prennent aisément de faux mouvemens, dont les muscles sont très-irritables, sont jetés dans cette maladie par des causes assez légères. Il est vrai que quand les premiers en sont attaqués, elle est atroce, & je n'ai point vu de spectacle aussi effrayant en ce genre, que celui des accès d'un des hommes les plus robustes que j'aie connu, qui s'étoit attiré cette ma-

ladie à l'âge de trente ans, à force de boire des liqueurs : je fus témoin de deux accès qui se succéderent dans l'espace d'une heure , & j'aurois craind d'en voir un troisieme.

§. 12. La différence du sexe peut rentrer dans celle des tempéramens : celui des femmes est en général plus foible, plus mobile que celui des hommes , & je me suis assuré par ma propre pratique, que le nombre des femmes épileptiques est plus considérable que celui des hommes ; mais cela n'est pas vrai dans les premiers mois de la vie , & je crois qu'à cet âge , il y a, sur un nombre égal de part & d'autre , autant de petits garçons épileptiques que de filles, parce qu'alors , les différences de tempérament , qui caractérisent les deux sexes, sont bien moins marquées que dans un âge plus avancé , quand elles ont été augmentées par la différence de l'éducation , qui devient très-sensible dès la première année , & qui va chaque année en augmentant ; aussi je suis convaincu que la différence entre le nombre des malades épileptiques de l'un & de l'autre sexe, se trouve vraie dès l'âge de sept ans.

§. 13. Quoique tous les hommes puissent, sans doute, devenir épileptiques, s'ils se trouvent exposés à l'action d'une cause assez forte pour donner à leur cerveau cette disposition que j'ai appelée cause prédisposante, il y en a peu, comme je l'ai dit, chez qui elle existe; mais malheureusement, quand elle a été formée, elle se détruit difficilement, & la plus petite cause suffit pour la mettre en jeu. La personne la mieux organisée aura été exposée souvent, sans en ressentir aucun mauvais effet, à des impressions dont je parlerai dans la suite, & qui ont souvent fait naître l'épilepsie chez d'autres; enfin une nouvelle impression ou plus forte par elle-même, ou plus forte par rapport à lui (car il est important de faire cette différence), lui donne un premier accès d'épilepsie : dès ce moment, ce cerveau, si bien constitué auparavant, a acquis cette funeste disposition; & désormais la plus légère cause, les impressions les plus foibles, que le malade n'auroit pas même apperçu auparavant, vont renouveler tous les jours les accès. Mr. VAN SWIETEN a vu un enfant si fort effrayé par un grand chien qui

lui falta dessus, qu'il prit sur le champ un accès d'épilepsie, qui se renouvelloit dans la suite toutes les fois qu'il voyoit ou qu'il entendoit aboyer un grand chien (l); & le même observateur vit une jeune fille de dix ans, très-saine, & née de parens très-sains, qui ayant été chatouillée vivement sous la plante des pieds, par quelques-unes de ses compagnes, pendant que d'autres la tenoient, pour qu'elle ne pût pas se soustraire à ce badinage, prit sur le champ une véritable attaque d'épilepsie, qui se reproduisoit ensuite très-aisément; la simple menace de la chatouiller, la plus légère colere, une peur, un peu trop de tension d'esprit, ramenoient dans le moment un accès (m). Mr. ROBIN ON, célèbre Médecin Anglois, avoit déjà fait, plus de vingt ans auparavant, une observation parfaitement semblable, mais plus fâcheuse, puisque la jeune personne mourut sur le champ dans le premier accès (n).

(l) § 1075. T. 3. p. 415. *

(m) Ibid. §. 1074 p. 402.

(n) *A New system of the spleen vapours.*
&c. Lond. 1729. p. 148.

J'ai été consulté, au mois d'Octobre 1769, par un maçon qui, voyageant de nuit, il y a quatre ans, dans le tems où tout le peuple de l'Europe s'occupoit de la fameuse hyene du Gevaudan, rencontra un gros chien qui couroit dans un sentier étroit; il se crut saisi par cet animal, arriva tremblant chez lui, & eut le lendemain un accès terrible d'épilepsie, qui depuis lors est revenu plusieurs fois, & a toujours commencé par une violente crampe dans l'une ou l'autre des mains, qui monte jusqu'à la gorge, redescend au cœur, & quand elle y est, lui ôte la connoissance. Je n'ai point vu d'épilepsie plus fâcheuse que celle d'une dame extrêmement aimable, qui avoit joui de la plus parfaite santé jusques à l'âge de vingt-quatre ans; effraïée, à cette époque, par le propos infolent & indécent d'un fou, elle eut, deux heures après, un violent accès d'épilepsie; il en revint trois autres la nuit suivante; & quoi qu'on consulta d'abord de très-bons médecins, le mal alla toujours en empirant: elle n'eut plus un seul jour de libre, & elle a traîné pendant plusieurs années la vie du monde la plus triste.

L'on a une multitude d'observations semblables, qui servent à établir, comme une vérité démontrée par les faits, que la peur est la cause la plus ordinaire de cette maladie ; cette cause agit même si fortement, que j'ai vu en 1752 un maçon, âgé de 21 ans, fort robuste, qu'une peur en songe jeta dans cette maladie : il rêva qu'un taureau le poursuivoit ; ce songe le réveilla dans une agitation prodigieuse, avec délire ; & au bout d'un quart-d'heure, il tomba dans une forte attaque d'épilepsie ; je le vis le lendemain matin : il étoit encore agité, & en me récitant son état, il prit un second accès : il en eut, dans la même semaine, deux autres ; tous furent précédés & suivis d'un sentiment de frayeur ; mais depuis lors il n'en a plus eu. Un exemple encore plus frappant du pouvoir de la peur, c'est celui de cette servante de Leipzig, dont parle LANGIUS, qui, déliant une courroye nouée de trois nœuds, s'imagina, en dénouant le troisième, qu'ils étoient peut-être l'ouvrage d'une sorcière ; ce qui fit une si forte impression sur elle, qu'elle tomba bientôt dans un accès d'épilepsie,

suivi de plusieurs autres, dont LANGIUS la guérit (o). L'impression que fait la vue d'un épileptique est si forte, qu'elle donne souvent cette maladie ; & ces observations sont fréquentes.

Une jeune demoiselle regardoit deux domestiques , qui se colloient pour essayer leurs forces ; ils tombèrent dans un réservoir ; la frayeur lui occasionna un accès d'épilepsie , que la moindre frayeur renouvelloit (p).

Ces observations sont bien opposées à celle que je tiens de la personne même qui en a été le sujet : elle entendit parler , au commencement de sa grossesse , d'un pauvre épileptique ; sur le champ elle désira de le voir dans l'accès ; l'occasion lui procura ce spectacle ; elle le

(o) Chr. Joh. LANGIUS, *Disputatio de morbo caduco*. J'ai vu une thèse soutenue à Giesse , en 1713 , de *epilepsia à terrore orta*, dans laquelle on trouve le cas d'une paysanne de 22 ans , qui , ayant été effrayée la nuit , en gardant les bêtes par un jeune homme déguisé d'une façon hideuse , tomba sur le champ dans des accès d'épilepsie très-violens.

(p) PEIROUX, *Observations Medicinales*, p. 85.

contempla avec délices & sans la moindre émotion.

§. 14. Des cas semblables sont si fréquens ; il est si ordinaire de voir un premier accès produit d'abord accidentellement , laisser le germe d'une maladie habituelle , qu'il seroit superflu d'en citer un plus grand nombre d'exemples ; ceux-là suffisent pour prouver que quand l'irritation communiquée aux nerfs , a été assez forte pour jeter le cerveau en convulsion , cette première attaque le laisse disposé à rentrer ensuite dans le même état avec facilité ; des milliers de faits le démontrent : mais quel est précisément le changement qui s'est fait alors dans le cerveau ? en quoi diffère le cerveau qui a acquis cette disposition , de celui qui ne l'a pas ? Voilà ce que nous ne saurons sans doute jamais.

Nous comprenons les convulsions des muscles : c'est leur action forte & involontaire, quand les esprits animaux y sont portés par l'action irrégulière du cerveau ; mais nous ne comprenons point la convulsion du cerveau ; & les conjectures qu'on peut faire là-dessus me paroissent à moi-même si

incertaines , que je crois inutile de les hasarder.

ARTICLE III.

Division des causes déterminantes.

§. 15. Quand une fois la disposition dans le cerveau existe , elle est mise en action par une foule de causes différentes , qui sont ce que j'ai appelé plus haut , causes déterminantes ou procatactiques : on peut les diviser en morales & en physiques.

Les morales sont les passions fortes ou les chocs que l'ame éprouve , & les fortes contensions de l'esprit , ou les efforts que l'ame fait dans un travail soutenu , ou dans une longue méditation ; efforts dont j'ai fait connoître les influences funestes sur les nerfs dans un autre ouvrage (q) , où l'on trouvera plusieurs faits liés à la matière que je traite ici , mais que je crois superflu de rappeler tous ; je me bor-

(q) *De la santé des Gens de Lettres.*
Lausanne , chez Grasset & Compagnie 1783.
§. 10. p. 34. &c.

nerai à un seul, c'est celui de ce jeune Grammairien dont parle GALIEN, qui étoit attaqué d'épilepsie toutes les fois qu'il enseignoit avec action, ou qu'il méditoit profondément (r); & j'ai sous les yeux un mémoire à consulter d'un homme de vingt huit ans, qui a détruit la santé la plus robuste par l'étude & par les débauches, qui ayant eu un premier accès d'épilepsie, il y a deux ans, à la suite d'un violent chagrin, est sûr qu'elle se renouvelle toutes les fois qu'il se laisse aller à travailler avec attention après le repas, ou toutes les fois qu'entraîné par son goût, il se livre à la versification.

La peur est sans contredit la cause qui produit le plus souvent l'épilepsie, & celle qui la renouvelle le plus ordinairement; mais la colere & le chagrin produisent aussi le même effet: j'ai vu deux femmes que le chagrin de mariages malheureux a conduit à cette maladie; & une autre qui, ayant eu une première attaque après une vivacité dans une couche, il y a quinze ans, en a eu dès lors trois autres, après trois cha-

(r) *De locis affect.* L. 5. Cap. 6. Chart. T. 7. p. 492.

grins très-vifs : ces trois accès ont été très-forts.

§. 16. Les causes physiques tirent leurs divisions de l'endroit où elles ont leur siège, & c'est cette division qui a donné lieu à celle de l'épilepsie en idiopathique & sympathique. L'idiopathique est celle dont la cause déterminante réside dans le cerveau même ; la sympathique est celle qui est produite par une irritation, qui, ayant son siège hors du cerveau, commence par irriter les nerfs dans cette partie ; ils transmettent cette irritation au cerveau, & quand elle y est parvenue, le malade tombe dans l'accès. Cette division de l'épilepsie en idiopathique & en sympathique a été connue très-anciennement ; l'on voit déjà dans HIPPOCRATE, des convulsions qui attaquoient singulièrement la tête, & qui avoient évidemment leur cause première dans l'estomac, puisque des vomissemens bilieux les soulageoient sur le champ (1). A R E T É E est positif sur cet article : Chez les uns, dit-il, le

(1) *Epidemicor.* L. 7. Cap. 96. FOES. p. 1233.

siège du mal est dans la tête ; chez les autres, il commence par des nerfs fort éloignés (t). GALIEN a indiqué trois différentes épilepsies : le cerveau, dit-il, est affecté dans toutes, mais dans la première, la cause de l'irritation se produit dans le cerveau même ; dans la seconde, elle vient de l'estomac ; dans la troisième, qui est la plus rare, de quelques unes des parties extérieures du corps (u). ALEXANDRE de Tralles a adopté la division de GALIEN (x), qui a été suivie ensuite assez généralement ; mais elle n'est pas complète, & les observateurs ont vu l'épilepsie naître de plusieurs autres organes. Les parties de la génération sont celles qui, après l'estomac, contribuent le plus souvent à produire cette maladie, & il n'y en a peut être aucune où elle ne puisse avoir son siège ; mais pour plus d'ordre, on peut diviser les épi-

(t) *De causis & signis acutor. morb.* L. 1. C. 5 p. 2.

(u) *De locis affectis.* Lib. 3. Cap. 11. CHARTER. T. 7 p. 443.

(x) ALEXANDRI Tralliani Medici Libri duodecim. Basileæ, 1556. L. 1. C. 15. p. 62. & suiv.

lepsies sympathiques en celles qui ont leur siege dans quelque partie interne, & celles qui l'ont dans quelque partie externe.

ARTICLE IV.

*Des Epilepsies sympathiques, qui ont leur
siege dans quelque partie interne.*

§. 17. Le siege le plus fréquent des épilepsies sympathiques de la premiere classe, c'est l'estomac : si l'on se rappelle que j'ai dit, Ch. 3. §. 116 & 117, en faisant l'histoire des nerfs, que l'estomac est un des viscères qui en a le plus, & qu'il les tire de la paire vague & de l'intercostale, qui ont de si grandes influences sur toute la machine, on comprendra aisément comment l'irritation de l'estomac produit l'épilepsie; & si l'on réfléchit combien de causes peuvent l'irriter, on ne sera pas surpris que les épilepsies viennent si souvent de cette cause. H I P P O C R A T E avoit déjà vu & indiqué que l'irritation de l'estomac pouvoit produire cette maladie, qui étoit très-souvent

souvent causée par une bile noire (y), & Mr. BOERHAAVE confirme son observation par celle d'une Juive, chez qui il observa une épilepsie affreuse, produite par cette même bile (z). GALIEN parle par-tout de cette influence de l'estomac sur le cerveau ; on voit naître, dit-il, des délires & des convulsions, quand le principe des nerfs est affecté par un vice de l'estomac (a). Il parle ailleurs d'un jeune homme qui avoit de fortes convulsions, dont il fut délivré dès qu'il eût vomé une bile âcre (b) ; dans un autre endroit, il dit avoir vu des gens qui, par le vice de l'estomac, prenoient une attaque d'épilepsie, s'ils ne digéroient pas bien (c) ; & en rapportant en détail l'histoire du grammairien, dont j'ai déjà parlé, que la méditation jettoit dans l'épilepsie, & qui éprouvoit le même accident,

(y) *Epidemic. Lib. 6. Ch. 54. FOES. p. 1201.*

(z) *Prælect. de morb. nervor. p. 443.*

(a) *Comment. ad Aph. Hippocr. L. 7. Aph. 10. CHARTER. T. 9. Part. 2. p. 295.*

(b) *Ibid. L. 5. Aph. 1. 195.*

(c) *De locis affect. L. 5. Ch. 6. CHARTER. T. 7. p. 493.*

s'il jeûnoit trop long-tems, on voit évidemment que le siege de son mal étoit dans l'estomac ; cette observation mérite bien d'être rapportée toute entiere.

» Un jeune Grammairien éprouvoit
» une attaque d'épilepsie toutes les
» fois qu'il pensoit fortement, qu'il
» enseignoit avec contension, qu'il
» jeûnoit un peu long-tems, ou qu'il
» se fâchoit. Je soupçonnai, dit GA-
» lien, que l'ouverture supérieure de
» l'estomac, qui est une partie si sen-
» sible, étoit le siege du mal, & que
» le cerveau & tous les nerfs étoient
» affectés par sympathie. Je lui ordon-
» nai donc d'employer tous les moyens
» qui pouvoient lui procurer une bon-
» ne digestion, & de prendre toutes
» les trois heures, un peu de pain
» sec, s'il n'avoit pas soif, & s'il avoit
» soif, arrosé d'un peu de vin délayé
» (d) & légèrement astringent, qui
» ne porte point à la tête & fortifie lé-
» gèrement l'estomac. Le soulagement
» qu'il reçut en observant cette façon
» de vivre, me prouva que ma con-
» jecture sur la cause de son mal étoit

(d) Κεχρομερον.

» vraie (e). Quand GALIEN se fut assuré de la cause du mal, il dirigea sa cure en conséquence (je la rapporterai plus bas), & il guérit parfaitement son malade.

§. 18. Depuis lui, plusieurs médecins ont donné d'autres observations d'épilepsie, produites par la même cause. VALLERIO LA, médecin d'Avignon, dans le seizième siècle, cite l'exemple d'une femme chez qui un vice de l'estomac produisit l'épilepsie la plus violente (f). On trouve dans les Consultes de FERNEL (g), l'état d'une femme de vingt-trois ans, dont l'épilepsie dépendoit évidemment de l'estomac. FORESTUS rapporte une observation semblable (h). L'on trouve dans un des recueils de Théophile BONNET, celle

(e) *De locis affect.* L. 5. Chap. 6. CHARTER. T. 7. p. 493.

(f) *Observ.* L. 3. Obs. 7.

(g) *Consil.* 7. *Oper. omn.* p. 668. On trouve aussi une épilepsie dont la cause étoit l'estomac, dans ZACUTUS Lusitanus *Prax. med. admir.* L. 1. Obs. 21. & dans plusieurs autres Observateurs; il seroit trop long & inutile de les recueillir toutes.

(h) *Lib.* 10. Obs. 64.

d'un homme de trente ans , dont le mal avoit le même siege (i); & WOODWART nous a conservé le cas d'un chirurgien sujet à l'épilepsie , qui , à la fin de chaque accès , souffroit de vives douleurs d'estomac , & avoit des vomissemens de bile âcre & écumeuse ; si ces vomissemens n'avoient pas lieu , il retomboit dans un second accès aussi violent que le premier (k).

Il y a des sujets dont l'orifice supérieur de l'estomac est si sensible , qu'une bien plus légère cause peut produire le même mal ; Mr. BOERHAAVE enseignoit à ses disciples que les eaux de Spa , si salutaires d'ailleurs dans cette maladie , bues en trop grande quantité à la fois , ou bues trop froides , l'avoient fréquemment occasionnée (l) ; j'ai vu moi-même plusieurs épileptiques , dont le mal n'étoit jamais reproduit , que quand il s'étoit formé dans l'estomac un amas de matieres capables de l'irriter assez pour occasionner la convulsion ; & j'ai eu , il

(i) *Medicin. septentrion. Lib. 1. Sect. 14. Cap. 1. T. 1. p. 105.*

(k) WOODWART *Select. cases in physik. p. 313.*

(l) *Prælect. de morb. nervor. p. 818.*

Y a quelques mois, un malade qui a un ulcere cancreux à l'orifice supérieur de ce viscere, & qui avoit éprouvé plusieurs accès d'épilepsie toutes les fois que de mauvais conseils l'avoient engagé à prendre des remedes irritans; une dose un peu forte de baume de Canada, qui n'est qu'une térébenthine, & quelques tasses d'infusion vulnéraire par dessus, lui avoient procuré trois accès dans deux heures; le mauvais effet de ce remede, dont on lui avoit promis des merveilles, fut ce qui le décida à venir me consulter.

§. 19. L'on peut placer ici les accès occasionnés par les remedes violens, ou par les poisons, déjà connus par HIPPOCRATE, & dont on voit fréquemment des exemples; c'est la crainte de cet effet, qui avoit engagé les anciens à prendre tant de précautions avant que de donner l'hellebore (m). On trouve dans WEPFER (n) des épilepsies affreuses produites par la racine de la

(m) Voyez SCHULZE, *Disput. de Helleborifinis veterum*. Hall. 1717.

(n) *Cicuta aquatica histor. & noxa Commentar*, &c. Basileæ, 1679. p. 6. &c.

ciguë aquatique ; de dix enfans qui en avoient mangé , huit furent attaqués d'épilepsie ; & les auteurs qui ont décrit les effets des poisons , en fournissent plusieurs exemples , par lesquels on voit évidemment que l'épilepsie étoit l'effet de l'irritation de l'estomac , puisque le cadavre ne montrait de vice que dans cette partie.

C'est encore à cette espèce d'épilepsie qu'appartiennent celles qui sont produites par des excès d'alimens indigestibles pour l'estomac qui les reçoit. HILDESHEIM en a vu une attaque occasionnée chez une jeune fille par un excès de fruits & de lait (o). SENNERT , une autre après l'usage des champignons , aliment toujours dangereux , & qu'on devoit proscrire (p). FORESTUS parle d'un étudiant , qui , après avoir mangé des anguilles , en eut plusieurs accès , jusqu'à ce qu'il les eût rendues (q) ; & DOLÆUS rapporte le triste cas d'un jeune homme , qu'un excès de

(o) *Spicileg.* p. 599.

(p) *Praxis medic.* L. 6. p. 300.

(q) *Observat.* L. 10. Obs. 57. Schol.

compôte de choux jetta dans une épilepsie qui le tua promptement (r).

§. 20. Les intestins peuvent aussi contenir la cause du mal, & c'est là où je la trouve le plus souvent chez les enfans depuis l'âge de cinq ans jusques à celui de dix ou douze. Elle peut s'y trouver à tout âge, mais c'est celui où elle y est le plus ordinairement, parce que c'est celui d'un mauvais régime, sur-tout pour les enfans d'un bas ordre. On m'en amene souvent qui ont des accès plus ou moins fréquens & plus ou moins forts, avec un visage pâle, bouffi, des yeux cassés, de l'abattement, de la tristesse. un très-gros ventre, quelquefois une légère atteinte de nouûre, & qui, sans châte, sans frayeur, sans avoir eu de maladie, sont tombés dans cette maladie à l'âge de cinq ou six ans; je ne crains point alors d'assurer que les embarras du bas-ventre, sur-tout des intestins & du mésentere, sont la cause du mal; je les traite en conséquence, & ils guérissent presque tous.

Ces embarras nuisent de deux façons : premierement la nutrition se fai-

(r) *Encyclop. médic.* Lib. 1. Cap. 9. p. 127.

fant moins bien, le genre nerveux s'affoiblit, comme je l'ai expliqué ailleurs; en second lieu, les matieres corrompues irritant, quand il a acquis cette disposition à la mobilité, les accès sont l'effet de cette irritation.

TULP rapporte le cas d'une femme attaquée d'une épilepsie cruelle, par la fréquence, la force & la durée des accès, dont il attribue la premiere cause, & à ce qu'il paroît avec raison, à une longue constipation, suivie d'obstructions & de la formation d'humeurs putrides & irritantes, dans la rate, le pancréas, le mésentere, les intestins, qui produisoient un sentiment de douleur & de chaleur dans les côtés & dans les lombes; à mesure qu'on en procuroit l'évacuation, la maladie diminuoit, & enfin elle finit entierement (5). PECHLIN assure même que l'irritation produite par les gonflemens flatueux des intestins, est suffisante pour produire l'Épilepsie chez les enfans, & croit s'en être convaincu par trois cas, suivis de l'ouverture du cadavre, dans lequel

(1) *Observ. médic.* Liv. 1. Ch. 11.

il n'y avoit de vice qu'une distension prodigieuse des intestins (t).

§. 21. Quand les vers se joignent à la saburre, ils augmentent considérablement l'irritation, & l'expérience journalière apprend qu'on doit les regarder comme une des causes les plus ordinaires de cette maladie, parmi les jeunes gens; elle se trouve même chez les adultes: BARTHOLIN traita une femme épileptique, qui avoit des accès très-forts, & mauvais visage, avec tout le corps bouffi; les anti-épileptiques ne lui faisoient aucun bien; il lui donna plusieurs fois ses pillules mercurielles, qui lui firent rendre beaucoup de vers, & les accès cessèrent (u). M. STAHL fut consulté pour un enfant de six ans, dont l'accès qui revenoit périodiquement tous les jours, environ les six heures du soir, commençoit toujours par un sentiment douloureux dans le bas-ventre, & qui ne guérit que quand

(t) Liv. 2. Obs. 29. pag. 282.

(u) Centur. 4. Obs. 7. & Cent. 6. Obs. 20. Il rapporte l'histoire d'un jeune homme, chez lequel il paroît que cette maladie étoit entretenue par les ascarides.

L'usage des vermifuges lui eût fait rendre une grande quantité d'ascarides (x). Mr. HEISTER rapporte l'exemple d'une jeune fille , attaquée fortement de l'épilepsie , & qui avoit des vers ; elle avoit pris inutilement un grand nombre de remèdes ; il la guérit de l'épilepsie en la guérissant des vers, par le mercure crud & le kina (y). PECHLIN cite un jeune homme de vingt-quatre ans, & une fille de onze , attaqués l'un & l'autre d'une épilepsie produite par la même cause (z) ; & on lit dans une dissertation assez récente , l'histoire d'une autre maladie de la même espèce , produite par le ver solitaire , & guérie par l'huile d'amandes amères , & celle de térébenthine (a). Mais les épilepsies vermineuses les plus fâcheuses , sont celles dont parle WEPFER , qui étoient produites par le ver plat ; l'une est celle d'une fille de trois ans , qui fut , pendant plusieurs mois ,

(x) *Theor. medic.* p. 1018.

(y) *Compend. medicin. pract.* Cap. 14.

§. 55.

(z) *L. 2. Obs.* 29. p. 285.

(a) *De MELLE de vi vitali*, §. 107. Leyde.

épileptique, avec des douleurs & des cris presque continuels, & qui fut guérie après avoir rendu spontanément trois aunes de ce ver; l'autre, celle d'une fille, qui, à l'âge de sept ans, commença à être cataleptique pendant trois ans, ensuite épileptique, avec des paroxysmes si fréquens, qu'elle tomba dans une imbécillité totale & une perte de mémoire absolue, de façon qu'elle ne reconnoissoit pas sa mere, mangeoit ses excréments, &c. ; elle rendit du ver solitaire, & les convulsions cessèrent; trois jours après, elle reconnut sa mere, & lui demanda d'où elle venoit; peu-à-peu, elle reprit toutes ses facultés & toute sa santé (b).

L'on voit dans l'histoire d'une épidémie vermineuse, décrite par M. *van den BOSCH*, le cas d'un enfant de six ans, que les vers jetterent dans une fièvre lente, qui le tua, & qui étoit accompagnée de fréquens accès d'épilepsie (c).

L'on a remarqué que les épileptiques

(b) *Ephemerid. Cur. nat. dec. an. 2. & sepulchret. T. 1. p. 304.*

(c) *Historia constitut. epidem. verminor. 8°. 1769. p. 132.*

des observations semblables de MM. SIGWART & BINGERT (d).

§. 22. Les autres organes renfermés dans le bas-ventre, peuvent aussi être le siège de cette cruelle maladie : Mr. FABRICIUS, célèbre professeur à Helmstad, cite l'exemple d'une femme sujette à de fréquens accès d'épilepsie, qui n'avoient d'autre cause que deux-cents calculs dans la vésicule du fiel ; & cet habile médecin ajoute qu'il est aisé de comprendre comment ils pouvoient produire cet effet (e). Mr. JENSIUS, médecin Danois, rapporte un cas qui est bien analogue : “ Le ma-
 „ lade, dit-il, a sans doute des pier-
 „ res dans la vésicule du fiel ; il tombe
 „ de tems en tems dans des agitations
 „ convulsives, où le côté droit du
 „ tronc, le pied & le bras droit sont
 „ secoués plus de cent fois dans une
 „ heure, & cela ne finit que lorsque
 „ le sommeil le saisit ; ce qui se fait

(d) HANNES, *Epistola de puero epilept. foliis aurantiorum sanato*, Vesalia. 1766.

(e) Ph. Conr. FABRICII *propempticon ad Dissert.* J. B. HOFMANNI. *Helmstad.* 1751. p. 6.

„ attendre quelquefois plusieurs jours
 „ de suite (f). ”

Mr. CHOMEL avoit aussi donné l'histoire des convulsions atroces qui dépendoient d'une cause semblable : le côté droit étoit le plus affecté ; les douleurs dans les membres convulsés étoient excessives (ce qui n'est point un caractère d'épilepsie) la vue étoit le seul sens que la malade perdit dans les violens accès , & tout l'accès se terminoit par un évanouissement complet ; au sortir duquel la malade , qui avoit été conduite à cet état par de longs chagrins , ne conservoit ordinairement aucune idée de ce qui s'étoit passé & de toutes ses souffrances ; c'est sans doute ce symptôme qui a déterminé l'auteur à regarder la maladie comme épileptique : “ On reconnut ,
 „ dit-il , que c'étoit une épilepsie , que
 „ causoit l'acreté de la bile arrêtée dans
 „ le foie ”. Cet arrêt de la bile avoit aussi

(f) *Mercuré Danois* , Août 1758. page 99. Mr JENSIUS ajoute que le musc a toujours calmé ces convulsions ; elles diminuoient dès la première ou la seconde prise.

occasionné une jaunisse, qui fut guérie par une sueur abondante. Les convulsions internes étoient si violentes, qu'elles occasionnoient souvent un vomissement, d'autres fois l'évacuation d'une grande abondance de sérosité sanguinolente, tantôt par le bout du sein droit, tantôt par le nombril. Le moindre chagrin lui caufoit des évanouissemens épileptiques; les lavemens & les plus légers purgatifs lui donnoient des convulsions (g).

On voit déjà, dans HIPPOCRATE, de violens spasmes, qu'il attribue à l'irritation de la bile, & qui ne cessent que quand le malade en avoit vomé (h); & Mr. MORGAGNI nous a conservé l'histoire d'un de ses malades, qui eut le premier accès d'épilepsie après des douleurs dans l'hypochondre droit, qui se dissipèrent ensuite par des selles bilieuses; les accès suivans, qui furent plus légers, étoient toujours précédés par le sentiment

(g) *Histoire de l'Académie des Sciences.* 1732. Art. 7. p. 49.

(h) *Epidem. Lib. 7. Chap. 96. F O E S.* p. 1233.

d'une fumée qui montoit de cette partie, où le malade sentoît habituellement un gonflement, que les alimens, & sur-tout les boiffons, augmentoient aisément (i).

§. 23. L'irritation part auffi quelquefois de la rate : HOLLIER cite le cas d'un moine Parisien, chez qui ce viscere souffrit beaucoup dans une maladie aiguë ; quoique le malade se rétablit, la rate ne fut pas entièrement remife, & elle devint le siege d'une humeur âcre, qui se reproduisant de tems en tems, agacoit les nerfs, qui, irritant à leur tour le cerveau, jetoient le malade dans une attaque d'épilepsie (k) ; une rate squirreuse, & qui commençoit à devenir livide, fut le seul vice qu'on trouva dans le cadavre d'un jeune Prince Allemand, mort d'épilepsie (l) ; & l'on trouve dans les observations de TULP, celle d'un jeune homme

(i) *De sedib. & causis morbor.* L. 1. Art. 9. §. 7.

(k) *Opera omnia*, Chap. 16. SCHOLI, p. 105.

(l) *Sepulchr. anat.* Lib. 1. Sectio. 12. Obs. 42.

que des douleurs de rate jettèrent dans une épilepsie très-forte, & dans un tel bouleversement d'idées, qu'il se croyoit un grand empereur ; l'accès partoît toujours de la rate, & il suffisoit de comprimer extérieurement cette partie, pour le faire naître ; tout ce qui heurtoit ses idées folles lui en donnoit un sur-le-champ (m).

§. 24. Les reins & la vessie, siege de tant de maladies, sont souvent irrités au point de produire des accès d'épilepsie forts & violens. TH. BARTHOLIN rapporte que B. SILVATICUS avoit vu, en Autriche, un Prince à qui le calcul des reins & de la vessie occasionnoit des attaques d'épilepsie, & qui étoit fi's d'une mere à qui la même cause avoit occasionné les mêmes accès (n) ; & Mr. BRENDÉL a vu deux enfans, l'un de deux jours, l'autre de huit, qui périrent dans des attaques de convulsions, en rendant de petits calets ; le cadavre de l'un en fit voir plusieurs dans les reins ; celui

(m) *Observ. med.* Liv. 1. Ch. 9.

(n) *Sepulchr. anatom.* Tom. 1. p. 228.

de l'autre, un dans l'uretere droit (o).

L'on trouve, dans les observations de LA MOTHE, deux cas qui prouvent évidemment que cette maladie peut dépendre du calcul des reins; dans l'un, une jeune fille de dix à onze ans avoit de forts accès d'épilepsie, pour lesquels on la purgea plusieurs fois, & on lui fit prendre quantité de lavemens diversément composés. " Étant un jour sur la chaise
" percée, dit le sage chirurgien de
" Valogne, pour en rendre un, elle
" fut saisie en notre présence d'un
" si violent accès, que nous étions
" tous ensemble très-embarrassés à
" la contenir, tant les convulsions
" étoient fortes, se renversant tout le
" corps en arriere, de sorte qu'elle en
" formoit une espece de cercle, faisant
" toucher sa tête à ses talons; & comme à la sortie de ces convulsions,
" elle se remit sur sa chaise, nous fûmes
" surpris d'entendre tomber dans
" le bassin quelque chose qui faisoit du
" bruit, ce qui nous donna occasion

(o) *De calculi natalibus.* Opuscul. p. 59.

„ d'examiner ce que ce pouvoit être ;
 „ nous trouvâmes cinq pierres , dont
 „ la plus petite étoit comme un pois ,
 „ & la seconde le double ; depuis
 „ que la nature se fut déchargée de
 „ ces corps étrangers , cette jeune de-
 „ moiselle a joui d'une santé parfai-
 „ te (p)”. La seconde ne fut pas si
 „ heureuse : c'étoit une jeune fille de
 „ douze ans , qui fut attaquée subite-
 „ ment d'un accès épileptique très-vio-
 „ lent , avec évacuation involontaire
 „ d'urine ; les accès , d'abord courts &
 „ éloignés , devinrent plus longs , plus
 „ fréquens , & la tuerent au bout de
 „ deux ans. LA MOTHE l'ouvrit ; “ le
 „ cerveau & tous les autres viscères
 „ étoient en très-bon état , excepté le
 „ rein droit , dans le bassinnet duquel on
 „ trouva une pierre triangulaire du poids
 „ de cinq gros , qui par l'irritation qu'elle
 „ caufoit à l'entrée de l'uretère (q) ,

(p) LA MOTTE, *Traité complet de Chi-
 rurgie*, Obs. 174. Tom. 2. p. 419. Ce violent
 accès avoit été produit par le passage des
 pierres le long des uretères ; la malade les
 rendit , dès qu'elles furent dans la vessie.

(q) Ibid. Obs. 173. p. 416.

» étoit la seule cause assignable de la
 » maladie ».

Mr. PEREBOCM , célèbre médecin de Horn , a donné l'histoire d'une fille de trente ans , attaquée très-fréquemment de défaillances , suivies de convulsions horribles , avec des douleurs dans le bas ventre , que rien ne soulagea pendant plusieurs années , & qui fut totalement rétablie bientôt après avoir rendu une quantité étonnante de matieres calculeuses , mêlées de plusieurs petites pierres angulaires (r) ; & je suis porté à attribuer à la même cause l'épilepsie d'un malade , âgé de cinquante-cinq ans , qui me consulta il y a un an ; il avoit rendu , depuis plusieurs années , beaucoup de gravier , & n'en rendoit plus depuis quinze mois ; mais depuis ce tems-là , il avoit un peu de maux de reins , quelquefois des coliques assez vives , de l'engourdissement à la jambe gauche dans les mauvais tems ; & il avoit essuyé sept accès d'épilepsie , maladie qui auparavant lui étoit absolument

(r) *Nova acta curios. nat.* Tom. 1. Obs.
 2. p. 20.

inconnue , & qu'on ne pouvoit attribuer à aucun accident externe , à aucun excès , à aucun chagrin ; je ne lui conseillai que des bains tiedes & de l'eau de chaux : quatre mois après , il me marqua qu'il se portoit bien , & qu'il n'avoit plus eu d'accès ; depuis ce tems-là , je n'ai pas reçu de ses nouvelles.

L'on peut voir dans le chapitre du tetanos , qu'une pierre dans la vessie produisoit cette maladie dans quelques attitudes du malade : il ne faut pas une irritation plus forte pour produire l'épilepsie ; & j'ai vu un jeune homme qu'un abcès dans cette partie jetta dans une légère léthargie , qui dura deux jours , pendant lesquels il eut trois accès de véritable épilepsie ; l'une & l'autre maladie cessèrent , quand l'abcès eût crevé.

§. 25. Mais les viscères qui renferment le plus souvent la cause de l'épilepsie , ce sont les organes de la génération , tant chez les hommes que chez les femmes. L'on a remarqué , de tout tems , l'espece de conformité qu'il y a entre l'épilepsie & l'acte des plaisirs de l'amour ; il y a dans l'un & l'autre des convulsions dans l'accès & de l'abat-

tement après ; quelques anciens ont même appelé le coït, une courte épilepsie ; plusieurs modernes ont adopté leur idée , à laquelle on ne peut pas se refuser ; & je devrois donner à cet article une étendue proportionnée à son importance , si je ne l'avois pas déjà traitée fort au long dans un autre ouvrage [s], dont je me bornerai presque à donner ici un extrait.

Il est prouvé par les faits les mieux attestés , 1°. que les excès vénériens jettent dans l'épilepsie les personnes les plus robustes , & qui n'en avoient jamais été atteintes ; l'observation que je rapporte d'après mon ami M. ZIMMERMANN , qui fait si bien observer , est décisive à cet égard [t]. 2°. Que souvent l'acte vénérien est suivi immédiatement d'un accès épileptique ; GALIEN [u] , VAN HEERS [x] , DIDIER ,

[s] *L'Onanisme*, Sect. 2. p. 24. Sect. 4. pag. 46. &c. Sect. 11. pag. 230. &c.

[t] *Onanisme*, page 24.

[u] *De locis affect.* L. 5. Chap. 6. C'est le Grammairien dont j'ai déjà parlé.

[x] *Observ. medic.* Obs. 18.

Mr. VAN SWIETEN [y], en citent des exemples sur des hommes, & Mr. HOFMANN en fournit un d'une femme. Mr. DE SAUVAGES nous a conservé celui d'un homme qui, dans chaque acte, étoit saisi d'un accès d'épilepsie; ils étoient courts & passagers dans les commencemens, mais successivement ils devinrent très-longs & très-allarmans [z]; & l'on a plusieurs observations de gens morts dans l'acte même.

J'ai été consulté par une femme qui, plusieurs années avant son mariage, avoit été sujette à de ces petits accès, tels que ceux dont j'ai parlé §. 5, pag. 17. 18., si légers qu'on ne les soupçonnoit pas même d'être une branche d'épilepsie; mais quelques jours après son mariage, ils devinrent très-forts & très-violens: le Docteur COLE vit une femme qui, sans accidens, au moins il n'en cite aucun, fut attaquée de cette

[y] §. 1075. Tom. 3. pag. 412.

[z] Class. 9. Art. 31. N°. 6. Tom. 2. 4to. p. 409.

[a] HALLER, *Elementa physiolog.* Lib. 27. Sect. 3. §. 12. Tom. 7. pag. 567.

maladie, pour la première fois, trois jours après son mariage (b); & je vois actuellement un malade qui, s'étant épuisé, est depuis deux ans dans le cas d'éprouver, après chaque acte vénérien, un accès de convulsions atroces, qui dure au moins quatre heures, quelquefois sept, huit, neuf, avec délire, quelquefois perte totale de connoissance pendant une partie de l'accès. Les débauchés en ce genre tombent fréquemment dans cette maladie, sur-tout s'ils se livrent aussi à des excès en vin ou en liqueurs, auxquels la nécessité de réparer leurs forces, les conduit aisément. J'ai vu de ces infortunés qui avoient entièrement détruit leur santé, accablés sous la foiblesse, les maux vénériens, & l'épilepsie, m'offrir un spectacle d'autant plus digne de pitié, qu'il reste bien peu d'espérance de les soulager; les forces détruites, les digestions ruinées, les nerfs entièrement irrités, le sang absolument gâté, formant une complication

(b) *Philosophic. transact.* N°. 174. p. 115.

cation difficile à vaincre par les meilleurs secours de l'art, qui dans ces cas cruels, ne trouve aucune ressource dans la nature.

§. 26. Une troisième vérité, aussi bien prouvée que les premières, c'est que, si les excès vénériens jettent dans l'épilepsie, & si les actes en rappellent les accès, ou les rendent sur le champ mortels, une continence excessive peut aussi les produire. Le tempérament a ses besoins, plus ou moins forts, chez les différens individus; il y en a, pour qui les plaisirs de l'amour en font un indispensable; s'ils en sont privés, ils peuvent tomber dans les maladies les plus fâcheuses, & sur-tout dans les maux de nerfs; le désir continuels les affoiblit, comme font toutes les autres passions fortes, & l'humeur retenue & corrompue les irrite puissamment; ce qui produit l'épilepsie: j'en ai recueilli plusieurs exemples dans l'ouvrage que j'ai déjà cité (c); il est inutile de les rappeler ici.

§. 27. Outre ces espèces d'épilepsies qu'on pourroit appeller vénériennes,

(c) Pag. 130.

il y en a d'autres qui dépendent des mêmes organes , mais qui ont une cause bien différente ; ce sont celles qui sont produites chez les femmes , par la grossesse , l'accouchement , ou les suites de couches.

La conception opère un changement prompt & marqué chez beaucoup de femmes : j'en ai connu qui éprouvoient dès le premier moment une façon d'être si différente , qu'elles ne pouvoient pas s'y méprendre pendant vingt quatre heures , & l'on trouve tous les observateurs remplis des phénomènes produits dans tout le corps par les changemens arrivés dans l'uterus ; celui de la grossesse est un des plus considérables , aussi son influence sur l'économie animale est très-marquée , & parmi les différens symptômes qu'elle occasionne , l'épilepsie est malheureusement trop fréquente. FERNEL avoit vu plusieurs femmes qui étoient sujettes à l'épilepsie toutes les fois qu'elles étoient enceintes , & qui en étoient absolument guéries , dès qu'elles avoient accouché (d). JACKIN a vu la même

[d] *Patholog. Lib. 5. Cap. 3. Oper. omnia Vol. pag. 408.*

chose (e). JACORIUS compte aussi l'épilepsie parmi les maladies qui sont une suite de la grossesse (f) ; & SCHENCKIUS rapporte le cas d'une femme illustre & très-séconde, qui, dans toutes ses grossesses, étoit sujette à de violens accès d'épilepsie, dans lesquels il l'avoit souvent soignée, mais que la plus légère cause rappelloit, & qui lui avoit souvent procuré des fausses couches, dans la plupart desquelles les enfans étoient morts (g).

L'on a vû dans plusieurs recueils d'anecdotes, que la duchesse de BEAUFORT qui étoit enceinte, ayant eu un premier accès d'épilepsie, dont elle revint, en prit bientôt après, au moment où elle écrivoit à Henri IV, un second dans lequel elle mourut. L'on en trouve plusieurs exemples dans les auteurs qui ont écrit sur les accouchemens,

[e] Leon. JACCHINI *Commentar. in novum librum RHASIS*, Basilea 1574. Cap. 74. pag. 132.

[f] Magni HIPPOCRATIS, *Coaca præfagia cum Commentar.* HOLLERII & JACOTTII, fol. Lugd. 1576 L. 4. Sect. 2. Aph. 24. pag. 675.

[g] Pag. 120.

& on lit dans le Commerce Littéraire de Nuremberg (*h*), l'observation d'une femme, qui, sans aucune cause apparente, eut le huitième mois, dans peu d'heures, plusieurs attaques d'épilepsie très-fortes.

Je connois deux femmes, dont l'une en a eu, dans trois grossesses, un accès presque toutes les semaines, jusques à ce qu'elle eût senti l'enfant; la seconde en avoit eu un presque tous les mois dans les deux premières grossesses; en lui ordonnant des saignées fréquentes & des demi-bains tièdes dans la troisième, je les réduisis à deux; à l'aide des mêmes secours, ils ont manqué dans la quatrième, & dans une cinquième, sans rien faire, elle n'en a eu aucun ressentiment.

L'uterus est-il autrement affecté dans la grossesse d'un garçon, que dans celle d'une fille, & si cela est, quelle en est la cause? Je ne déciderai point de la vérité du fait; je ne le crois point vrai généralement; mais il peut l'être dans plusieurs cas, & je connois un

[*h*] *Commerc. Litter. ann.* 1741. hebdom. 49. pag. 313.

assez grand nombre de femmes, qui, dès le premier mois, sont sûres si elles portent un garçon ou une fille; elles se trouvent dans un état différent : & on lit dans LA MORTE, une observation assez singulière; c'est celle d'une femme, qui, de huit grossesses, cinq de filles & trois de garçons, eut toujours plusieurs accès d'épilepsie dans celles de garçons, & aucun dans celles de filles (i). Je connois plusieurs femmes qui ont eu plusieurs grossesses & ont heureusement accouché à terme des filles, mais se sont toujours blessées des garçons, ce qui dépend apparemment, aussi bien que l'observation précédente, du plus grand volume de ceux-ci au même terme; l'utérus est plus fortement irrité, parce que son extension est moins lente.

Si la grossesse produit l'épilepsie, elle peut aussi, je ne dirai pas la guérir, je ne l'ai pas vû, mais la suspendre, Je vois une femme, qui, sujette à des accès qui ne lui laissoient jamais plus de deux mois de libre, n'en a eu qu'un

[i] *Chirurg. complet. Obs.* 176, Tome 2, pag. 422.

très-léger pendant toute la grossesse : ils sont revenus avec au moins autant de fréquence après la couche ; & j'en ai vu une autre qui n'en avoit point eu pendant la même époque , mais ils sont revenus trois mois après , aussi forts & peut-être plus fréquens. Il me semble qu'il est aisé de comprendre qu'une cause qui change assez fortement l'état du genre nerveux chez une personne forte & robuste , pour la jeter dans cette maladie , peut très-bien changer assez sensiblement la condition des nerfs dérangés , pour suspendre l'effet de ce dérangement ; mais comme la grossesse , loin de fortifier les nerfs , les affoiblit , l'on ne doit point espérer qu'elle en emporte la cause , à moins qu'elle ne dépendit d'un vice d'obstruction & d'engorgement dans l'uterus , auquel les filles opilées sont souvent sujettes , qui leur donne quelquefois des accès d'épilepsie , & que le mariage ou la grossesse dissipent.

Ayant été consulté , il y a trois ans , par un jeune homme , sur l'état d'une personne avec laquelle il étoit promis , & qui , très-bien portante d'ailleurs , étoit sujette à l'approche de ses regles , toujours peu abondantes , à des coli-

ques si violentes, qu'elles la jettoient presque toujours dans des convulsions, & que trois fois elles lui avoient procuré une véritable attaque d'épilepsie; j'osai lui promettre, que bien loin que le mariage aggravat cet état, il lui feroit vraisemblablement beaucoup de bien, & l'événement a justifié ma promesse; la première couche a fait disparoitre les coliques, & par là même l'épilepsie.

§. 28. Si le changement que la grossesse produit dans la matrice est capable de produire l'épilepsie, il n'est pas étonnant que cette maladie soit le résultat fréquent de l'état violent dans lequel cet organe se trouve au moment de l'accouchement; aussi les accès d'épilepsie sont très-fréquens, & quelquefois mortels à cette époque; l'on en trouve plusieurs exemples dans MAURICEAU (k), dans LA MOTTE (l) & dans la plu-

(k) *Observations sur la grossesse & l'accouchement*, Tom. 2. Obs. 3. 36. 51. 86. 90. 156. 194. &c. Il est vrai qu'il ne distingue pas assez exactement les cas où il y a eu véritable épilepsie, de ceux où il n'y a eu que de simples convulsions.

(l) *Traité des accouchemens*, &c. Liv. 3. Chap. 12, pag. 307. &c.

part des autres accoucheurs. Mr. PEREBOOM, que j'ai déjà cité, en parlant de l'épilepsie produite par le calcul, rapporte dans le même endroit l'observation de sa propre femme, qui fut attaquée pendant les douleurs de l'enfantement, des convulsions les plus horribles, avec perte absolue des sens internes & externes, & une hémiplegie passagère à la fin de l'accès (m); elle accoucha d'un enfant mort & se rétablit fort bien. Je fus appelé, il y a plusieurs années, pour une femme qui en avoit eu, à ce qu'on croyoit, plus de vingt accès depuis trois heures, elle en eut trois bien caractérisés en ma présence; une forte saignée décida l'accouchement & termina l'épilepsie : une autre fut moins heureuse, le travail duroit depuis vingt quatre heures, elle avoit eu souvent du délire & trois accès d'épilepsie pendant ce tems-là; elle fut saisie, au moment même du passage de l'enfant, par un quatrieme, qui finit par une syncope mortelle.

(m) *Nova Acta Curios. Nat.* Tom. 3. p. 20.
Cette observation est très-intéressante, mais trop longue pour être insérée ici.

§. 29. Après l'accouchement, plusieurs accidens peuvent encore jeter dans l'épilepsie, & cela n'est que trop ordinaire; les peurs, le chagrin, la colere, produisent assez certainement cet effet; mais au lieu que les épilepsies qui sont l'effet de la grossesse & celles qui sont l'effet du travail, se dissipent ordinairement, dès que ces circonstances ont passé, pour ne plus reparoitre, celle qui naît dans le tems des suites de couche est souvent très-rebelle, quelquefois incurable.

§. 30. Les accès de suffocation hystérique dont on a si long-tems placé la cause dans l'uterus, ressemblent quelquefois beaucoup aux attaques d'épilepsies, & on en avoit fait une espece d'épilepsie particuliere, qui appartient à cette classe (n); mais outre que ces

(n) *Barthol. DE MOOR Pathologia cerebri delineatio practica*, 4to. *Amstelod.* 1704. Il compte six especes d'épilepsies, dont il fait autant de chapitres; 1°. *Epilepsia propria*; 2°. *febrilis*; 3°. *pedissequa dolorum, purgationum, vulnerum & ulcerum*; 4°. *pedissequa repletionis & hemorrhagiae*; 5°. *hysterica*; 6°. *hypocondriaca*, mais ces deux dernieres, il en convient lui-même, sont la même maladie & ne sont point l'épilepsie.

accès n'ont point les caractères véritables de l'épilepsie, il s'en faut beaucoup que leur cause première soit toujours dans l'uterus; ainsi je n'en parlerai point ici.

§. 31. Le siège de l'épilepsie est quelquefois dans la poitrine, & comme cet organe est souvent un réservoir de matières purulentes, il n'est pas surprenant que, soit par l'irritation qu'elles occasionnent, soit par leur repompe-ment & leur transport sur l'origine des nerfs, elles produisent des convulsions, il l'est peut-être davantage, que leur siège ne soit pas plus souvent dans le poulmon, ou que cette espèce ait échappé aux observateurs, qui en parlent très peu.

L'on ne trouve dans le *sepulchretum* qu'un seul cas dans lequel l'observateur ait jugé que le mal dépendoit d'un vice de la poitrine; c'est celui d'un jeune homme, qui eut quelques accès dans la maladie dont il mourut, & duquel on trouva le cerveau très-sain, & le poulmon droit noir comme de l'encre; c'est de cette partie, ajoute l'auteur, qu'étoient nés le délire & les ac-

cès d'épilepsie (o); mais en lisant attentivement l'observation, on n'en est pas aussi convaincu que lui. Mr. VAN SWIETEN nous apprend qu'il a vu une attaque d'épilepsie mortelle, produite par résorption du pus d'une vomique (p); & Mr. DE HAEN a donné ces belles observations dont j'ai parlé ailleurs, par lesquelles il a prouvé que la suppuration du poulmon procuroit quelquefois des accès de spasmes & de paralysie (q). J'ai vu un homme, âgé de près de cinquante ans, qui vint mourir ici phrétique; les crachats se supprimèrent dès qu'il fut à l'auberge; & autant que je pus en juger, parce que la route qu'il avoit fait rapidement, avoit occasionné une phlogose générale dans le poulmon; quand je le vis, deux heures après son arrivée, il avoit une fièvre très-forte, une grande angoisse & un mal de tête si violent, qu'il portoit un peu de trouble dans ses idées; une saignée, des parfums d'eau chaude avec un peu de vinaigre, & la boisson abondante

(o) *Sepulchret. Anatomic. L. 1. Sect 12. Obs. 34. Tom. 1. p. 286.*

(p) § 1075. p. 419.

(q) *Ratio Medendi. Part. 3. Ch. 2.*

d'une infusion pectorale, dissipèrent la fièvre & le mal de tête, en rétablissant les crachats; ils se supprimerent quatre jours après, sans qu'il me fut possible d'en assigner la cause; le malade rêva pendant près de vingt-quatre heures, & eut trois accès convulsifs, que je ne vis point, mais que les assistans jugèrent épileptiques; je pus rétablir une seconde fois les crachats, les accidens cessèrent; mais au bout de quelques jours, la matière resorbée se jeta sur les intestins, & il périt d'une diarrhée.

Que'ques années auparavant, une jeune femme m'avoit offert un spectacle à peu-près semblable, elle étoit dans une étisie désespérée, on voulut essayer le lierre grimant, qui est un astringent, dont l'effet fut de supprimer les crachats; elle tomba dans des douleurs de tête inouïes, pendant quatre jours, puis dans une léthargie entremêlée de convulsions; elle mourut le neuvième, & rendit une grande quantité de pus par les narines.



ARTICLE V.

Des épilepsies sympathiques qui ont leur siége dans les parties extérieures.

§. 32. Voilà beaucoup d'observations sur les différentes épilepsies sympathiques, produites par les vices des viscères : je vais parcourir celles qui dépendent de la lésion de quelques parties extérieures ; & pour suivre l'ordre anatomique, j'indiquerai d'abord celle dont parle FERNEL, qui avoit son siége au sommet de la tête ; c'est de là que partoît le mal, & on le renouvelloit en pressant cette partie (r). DOVINET rapporte l'exemple d'un homme, chez qui l'accès étoit toujours présagé par un chatouillement de la levre supérieure ; il sentoît cette espece de sensation monter le long des nerfs, & quand elle parvenoit au cerveau, il tomboit épileptique (s). J. C. BRUNNER en vit une qui commençoit par la nuque, & qu'il guérit en brulant du *moxa* sur cette partie (t), & l'on peut ranger sous cette

(r) *Ibid.* § de abd't. morbor. caus. L. 2.

(s) SCHENCKIUS, p. 118.

(t) WEPFER de cicut. aquat. p. 97.

classe l'observation de FABRI *de Hilden*, qui vit une jeune fille de dix ans, dans l'oreille de laquelle il entra un petit globe de verre de la grosseur d'un petit pois, qu'on chercha inutilement à en retirer; les efforts n'aboutirent qu'à irriter davantage; elle éprouva d'abord des douleurs d'oreille, de tête, des engourdissemens du même côté; ces accidens diminuerent peu à-peu, les douleurs d'oreille passèrent entièrement, & cette cessation de douleurs fut cause qu'on ne pensa pas même à attribuer à cette cause l'épilepsie qui survint au bout de quelque tems, & pour laquelle on employa inutilement une quantité de remèdes; enfin FABRI ayant été consulté & instruit de l'introduction du globe de verre & de tous les symptômes qui avoient paru depuis ce tems-là, n'hésita pas à attribuer l'épilepsie à la même cause; il parvint à extraire ce corps, & l'épilepsie fut bientôt guérie (u).

§. 33. DONAT voyoit une religieuse, qui éprouvoit une légère douleur au sein; si elle augmentoit; la malade sentoit comme monter une espèce de vapeur, qui, quand elle parvenoit au

[u] Cent. Obs. 4.

cerveau, la jettoit dans l'épilepsie; quelquefois cette partie s'ulceroit & donnoit une espèce d'ichorosité; aussi long-tems qu'elle couloit, la malade étoit fort bien (x) & n'avoit aucun accès.

§. 34. HOLLIER rapporte plusieurs cas d'épilepsie, qui partoient des extrémités supérieures; chez un jeune homme le mal commençoit par l'articulation de l'épaule, tout le bras étoit saisi par un fort tremblement, les mâchoires se ferroient & l'accès survenoit: chez un autre, âgé de quinze ans, l'engourdissement de la main droite étoit le premier symptôme; les trois premiers doigts se contractoient fortement, le bras se tordoit, le corps se ployoit, & il tomboit sans sentiment. Il parle dans le même endroit d'un autre dont le mal commençoit par le petit doigt de la main gauche, la main entroit en convulsion, le mal montoit, le malade tomboit d'abord dans une forte palpitation & ensuite dans l'accès; enfin il rapporte une quatrième observation d'un Ecois dont le mal commençoit par un tremblement du bras droit, le mal se portoit

[x] *Hist. mirabil.* L. 2. Ch. 4. Voyez SCHENK. *ibid.*

à la mamelle & de-là à la tête (y). L'on trouve dans les observateurs un grand nombre d'exemples semblables (z), qu'il seroit superflu d'accumuler ici; mais j'ai sous les yeux un mémoire à consulter, pour un malade attaqué depuis l'âge de 22 ans, & qui en a actuellement plus de 40, dans lequel je vois un fait semblable, qui a cependant quelque chose d'assez singulier pour m'engager à le citer dans les termes même du mémoire. " Mon mal a toujours été conf-
 „ tamment attaché à la main droite, par
 „ où l'accès a toujours commencé; au
 „ commencement, j'étois presque sans
 „ connoissance aussi-tôt que je sentoie le
 „ mal; j'ai eu ensuite le secret de l'arrê-
 „ ter souvent, par le moyen d'un tour-
 „ niquet attaché à mon bras droit, & que
 „ j'ai toujours le tems de serrer avant
 „ d'être sans connoissance. Une autre in-
 „ commodité, c'est que je sens dans la
 „ journée, & régulièrement le soir, au
 „ moment de m'endormir, un mal de
 „ neif toujours attaché à la main droite,
 „ dont je suis soulagé par des lavemens”.

[y] *De morb. intern.* Ch. 16. Schol. p. 105.

[z] Voyez SCHENK. *Ibid.* PLATER.
Observat. 24.

§. 35. Les extrémités inférieures sont aussi très-souvent le siège de la cause de l'épilepsie. GALIEN en cite deux exemples, chez deux jeunes gens ; le mal commençoit par la jambe, & montoit comme un vent froid le long des cuisses, du dos, de la nuque, jusqu'à la tête, & dès qu'il y étoit parvenu, ils tomboient dans l'accès (a). ALEXANDRE de Tralles traita un lecteur, chez qui le mal commençoit par le dessus du pied, & montoit aussi comme un vent froid jusques à la tête (b). L'on a guéri un épileptique, en ouvrant une tumeur qui s'étoit formée à la cuisse, & en emportant la partie d'os qui s'étoit cariée (c) ; & j'ai été consulté, il y a quelques années par un cordonnier, robuste, sage, âgé de trente & quelques années, qui depuis trois ans, avoit deux ou trois fois par mois de fortes attaques d'épilepsie, qui commençoient toujours par la partie intérieure de la cuisse ; cette partie éprouvoit d'abord deux ou trois rudes

(a) *De Locis affect.* L. 3. Cap. 11. CHARTER, T. VII, p. 444.

(b) Lib. 1. Cap. 15. p. 73.

(c) VAN SWIETEN, p. 419.

secouffes, bientôt le mal montoit avec une rapidité étonnante, & il tomboit dans l'accès. Cette observation rappelle celle des naturalistes, qui ont remarqué que le chardonneret étoit quelquefois sujet à l'épilepsie, quand il se logeoit un petit ver dans une de ses cuisses (d). L'on trouve dans SCHENK, que j'ai déjà si souvent cité, le cas d'un homme dont le mal commençoit par le dos du pied, il montoit jusqu'à l'estomac, & dans cet instant l'accès se déclaroit (e); il parvint à en arrêter la marche, en se coubant fortement en avant. PUERARI, médecin Genevois, du siècle dernier, nous a conservé, dans son édition du *Tréor pratique de BURNET*, une observation qui méritoit en effet d'être connue. " Un artisan, dit-il, ayant eu un
 „ ulcere à la jambe, qu'on traita mal &
 „ qu'on ferma trop vite, il tomba dans
 „ l'épilepsie, qui commençoit toujours
 „ par le sentiment d'un vent froid, qui
 „ partoit de la cicatrice; s'il pouvoit faire
 „ une forte ligature au-dessous du ge-
 „ nou à tems, il arrêtoit par-là l'accès;

(d) HALLER *Physiol.* L. X. Sect. VII, §. 16.

(e) VAN SWIETEN. p. 119.

„ mais dès que ce sentiment avoit passé
 „ le genou, l'accès étoit déclaré (f)“.
 On a vû un autre malade dont l'accès
 commençoit aussi par ce sentiment de
 froid à une jambe, qui se portant à la
 tête, occasionnoit des accès que SAL-
 MUTH prévint, en lui conseillant une
 ligature qui ne manqua jamais de pro-
 duire son effet (g). Mr. RAULIN parle
 aussi d'un homme d'environ trente ans,
 „ à qui il survenoit fréquemment des
 „ mouvemens convulsifs. avec froid à la
 „ plante des pieds; ils suivoient tout
 „ le corps, jusques au gosier, où ils se
 „ fixoient, en y faisant une compression
 „ suffocante, il en perdoit totalement
 „ la parole, & portoit à tout instant la
 „ main à la partie supérieure de la poi-
 „ trine. pour indiquer l'endroit où il
 „ souffroit (h)“. Cette espece est si fré-
 quente, qu'il y a peu de medecins, je
 pense, qui n'aient eu occasion d'en voir.

[f] *Thesaur. Medicin. Practic.* 12. Gene-
 va. 1676. T. 2. p. 463.

[g] Philip. SALMUTH *Observ.* Cent. 1.
 150.

[h] *Traité des affections vaporeuses du*
sexe, p. 43.

BONNET rapporte dans son SEPULCHRETUM, une observation qui a du rapport, mais qui est cependant un peu différente, & pour la marche & pour l'effet, puisque le mal n'étoit pas dans les commencemens une véritable épilepsie: il vit à Neuchâtel, en 1656, un homme de cinquante ans, à qui il survenoit de tems en tems un gonflement subit dans l'aîne gauche, comme un bubonocèle, d'où il partoît un sentiment de fourmillement qui se portoit lentement jusques à la plante du pied; dès qu'il y étoit parvenu, il remontoit rapidement au cerveau, & occasionnoit de fortes convulsions du côté gauche qui intéressoient un peu la langue, ce qui le faisoit balbutier, mais point le cerveau; il se refusoit au caustic que BONNET vouloit qu'il appliquât sur l'aîne, & aux cauterés qu'il vouloit faire ouvrir dans l'intérieur de la cuisse & à la jambe; & de tous les conseils qu'il lui donna, il ne suivit que celui de faire une forte ligature au-dessus ou au dessous du genou, dès qu'il sentoît le commencement de l'accès, ce qui réussit toujours à l'écarter; mais un soir la ligature n'ayant pas été faite à tems, l'accès

fut si violent qu'il le tua (i). J'ai vû un malade dont l'accès commençoit toujours par la partie moyenne antérieure de la cuisse. Mais parmi toutes les observations de cette classe, il y en a peu qui méritent au tant d'attention que celle que rapporte le docteur SHORT, de la société royale de Londres, dans les Essais d'Edimbourg (k); on la retrouvera ici toute entière avec plaisir.

„ Au mois de Juillet de l'année
 „ 1720, une femme âgée d'environ
 „ trente huit ans, vint me consulter;
 „ elle étoit attaquée depuis douze ans
 „ d'épilepsie, dont les acces pendant
 „ ce tems-là, n'étoient revenus qu'une
 „ fois par mois; ils revenoient pour
 „ lors quatre ou cinq fois par jour,
 „ & duroient chaque fois une heure
 „ ou une heure & demie; ce qui la
 „ rendoit triste, stupide, & incapable
 „ d'avoir l'œil sur son ménage & de
 „ prendre soin de sa famille. Telles
 „ étoient les circonstances où se trou-

[i] *Sepulchret. anatomic. L. 1. Scđ. 12.*
 append T. 1. p. 291.

[k] *Essais Et Observations de Médecine,*
 Tom. 4. Art. 27. pag. 525.

„ voit réduit son mari, qui, par affection pour elle, avoit pris & suivi les avis de tous ceux qu'il avoit pû consulter.

„ On avoit essayé toutes les especes d'évacuations; on avoit employé tous les remèdes tirés de la classe des anti-épileptiques, des cephaliques, & plusieurs autres, le tout inutilement; la maladie empira de plus en plus : ses accès commençoient toujours par la jambe, aux environs de la partie inférieure des muscles jumeaux, & dans l'instant la tête se trouvoit prise, & la malade se laissoit tomber; la bouche paroissoit alors couverte d'écume, & la malade faisoit des contorsions terribles des lèvres, du col & des extrémités.

„ Dans le tems que je l'interrogeois, il lui survint un accès qui la renversa par terre; je lui examinai la jambe, & je n'y apperçus aucun gonflement, ni dureté, ni relâchement, ni rougeur, qui rendit l'endroit ci-dessus désigné, différent de celui de l'autre jambe: je soupçonnai cependant que la cause de sa maladie devoit se trouver à cet endroit, puis-

„ que c'étoit toujours par lui que com-
 „ mençoit l'accès; c'est pourquoi je
 „ lui enfonçai tout de suite un scalpel
 „ environ deux pouces, & je sentis
 „ un petit corps dur que je séparai des
 „ muscles, & que je tirai ensuite avec
 „ des pinces; c'étoit une substance dure
 „ & cartilagineuse, ou un ganglion de
 „ la grosseur d'un très-gros pois, qui
 „ étoit situé sur un nerf que je coupai;
 „ la malade revint sur le champ de son
 „ accès, se mit à crier qu'elle se portoit
 „ bien, & n'a jamais eu depuis aucune
 „ attaque; elle reprit bientôt ses pre-
 „ mières forces, tant de l'esprit que du
 „ corps.“

Je finirai cet article par deux autres observations, qui ont aussi leur mérite; elles sont insérées dans le Dictionnaire universel de médecine. Une jeune dame, dit l'auteur, étoit sujette à de fréquens accès d'une maladie convulsive & extraordinaire, contre lesquels tous les remèdes avoient été inutiles; elle s'adressa enfin à un célèbre médecin d'Oxford, qui lui dit, que ces accès étoient causés par la dislocation d'un os sesamoïde, de la première phalange du gros orteil, & que

l'amputation de ce doigt l'en délivreroit infailliblement (1) La malade suivit son avis; on lui coupa le gros orteil, & elle recouvra parfaitement sa santé (m). L'observation suivante est celle d'un fermier, auprès de qui,
Mr.

(1) Le médecin devina apparemment la cause de la maladie d'après ses symptômes, que Mr. JAMES ignoroit; n'ayant jamais vû, ni la maladie, ni le médecin; mais le fait n'en est pas moins certain.

(m) LA MOTTE avoit déjà conseillé en 1698, l'amputation du petit doigt de la main gauche à un malade chez qui l'accès commençoit toujours par une douleur très-vive dans cette partie qui se portoit au cerveau avec tant de rapidité qu'on n'avoit point le tems de faire une ligature; mais le malade ne voulut point y consentir, & LA MOTTE le perdit de vue. *Chirurgie compl. Obs.* 177. T. 2. page 427. & avant LA MOTTE, OLAUS BORRICHIOUS avoit regardé l'amputation du pouce carié du pied, comme le seul moyen de guérir une épilepsie, qui commençoit toujours par un mouvement inquietant dans cette partie, qui montoit & se portoit à la tête, mais qu'on pouvoit arrêter par une forte ligature, avant qu'il eût passé le genou. *Sepulchret.* T. 1. p. 294.

Mr. JAMES fut appelé en 1737. Il avoit passé le jour & la nuit sur son lit, sans oser remuer, parce qu'il étoit sûr d'avoir des mouvemens convulsifs aussitôt qu'il remuoit le pied; quelques jours auparavant, en traversant un chemin mauvais & dur, il avoit fait un faux pas, & s'étoit fait mal au gros orteil gauche; au bout de quelques jours, il eut des mouvemens convulsifs, qui revenoient toutes les fois qu'il remuoit, ce qu'il ne pouvoit faire sans ressentir des douleurs violentes; ces accès approchoient beaucoup de ceux de l'épilepsie, excepté qu'il ne rendoit pas de l'écume par la bouche, & que les convulsions commençoient par le pied malade, se communiquoient ensuite à la jambe, & lui causoient une sensation très-douloureuse dans la tête, suivie de convulsions par tout le corps; maladie à laquelle il n'avoit jamais été sujet: les remèdes furent inutiles; il mourut au bout d'une semaine, sans avoir voulu me laisser examiner son orteil avec autant de soin que je l'aurois souhaité [n].

[n] *Dictionn. univers. de Médec.* T. I.
art. *Albadara.* p. 364.

Je finirai par rappeler ici une observation déjà placée ailleurs, & qui renferme en quelque façon toutes celles de cet article; c'est celle de cette femme dont parle SALIUS DIVERSUS, *de affect. pericul.* p. 43. qu'on ne pouvoit toucher dans aucun endroit de la peau avec une aiguille ou un autre instrument piquant, sans lui occasionner un accès d'épilepsie.

ARTICLE V. I.

Réflexions sur les épilepsies sympathiques.

§. 36. Je ne m'étendrai pas plus long-tems sur les épilepsies sympathiques; l'on trouvera peut-être même déjà cet article trop long, & l'on jugera que j'ai réuni un trop grand nombre d'observations; mais si l'on veut bien faire attention, & cette remarque servira pour la plupart des chapitres de cet ouvrage, que l'on n'apprend à bien connoître une maladie qu'en observant toutes les variétés, qu'il est important de bien connoître celle-ci, & que rien n'avanceroit autant la médecine que

de trouver réunies dans un ordre convenable , toutes les bonnes observations connues sur une maladie , on fera porté à me pardonner ces longueurs , qui m'ont coûté un travail auquel la seule persuasion d'être utile , pouvoit m'engager. Je dois passer actuellement aux épilepsies qui ont leur siége dans le cerveau , & à celles dont la cause réside dans les parties qui l'enveloppent : je commencerai par celles-ci ; mais je dirai un mot auparavant de l'idée de quelques médecins , qui ont nié les épilepsies sympathiques.

§. 37. CH. PISON , médecin de Pont-à-Mousson , au commencement du siècle dernier , est le premier qui ait pensé qu'elles n'avoient pas leur siége dans les parties où elles paroissent l'avoir , comme le pied , la jambe , la main , &c. ; mais que toutes étoient originaires du cerveau ; & que si le mal commençoit par ces parties , c'étoit parce qu'elles se ressentoient plus facilement , & plus tôt que les autres , de l'affection du cerveau [o]. WILLIS

[o] *Dè morbis à colluv. serosa. Sect. 2. Part. 2. Cap. 7. p. 140.*

ICO DE L'ÉPILEPSIE.

embrassa le même système [p]. De MOOR, plus de quatre - vingt ans après, adopta la même idée, & l'établit comme un système à lui, sans nommer PISON; il posa pour principe, que toutes ces épilepsies, qu'on croyoit dépendre de l'irritation d'un organe qui se communiquoit au cerveau, dépendoient uniquement de celle du cerveau communiquée à cet organe, avant que les autres s'en ressentissent, & qu'ainsi toute épilepsie étoit idiopathique [q]; & Mr. DE SAUVAGES même ne paroît pas éloigné de ce système [r]. Mais il ne faut qu'examiner impartialement les observations que j'ai rapportées, pour se convaincre de sa futilité, & s'assurer que c'est très-souvent une irritation externe, qui produit l'épilepsie. Celle que Mr. SHORT guérit, en enlevant le petit corps dur qui irritoit le

[p] *De morbis convulsiv.*

[q] *Morbus caducus omnis mihi est Idiopathicus. Patholog. cerebr. Cap. 13. p. 423.*

[r] *Nosolog. method. Class. 4. No. 19. T. 1. 4to. p. 580.*

nerf tibial postérieur ; celle que le médecin d'Oxford guérit en amputant le gros orteil ; celle que M. JAMES observa après la luxation de ce même orteil ; la plupart des autres dont j'ai parlé dans le même endroit, qui, comme on l'a vu, ou comme on le verra plus bas, ont été guéries par l'application d'un cautere sur l'endroit d'où partoît le mal, ou éloignées par une ligature, n'avoient-elles pas évidemment leur siége dans cette partie ? Il n'est pas même possible d'en douter ; & si PISON a formé le système que je combats, on voit évidemment que c'est parce qu'il n'avoit pas fait attention à ces guérisons par le cautere, ou à ces observations dans lesquelles l'altération de la partie est évidente ; il ne paroît avoir eu cette idée que d'après les observations D'HOLLIER, dans lesquelles on ne trouve en effet, ni guérison par les applications, ni marque sensible d'altération dans la partie : “ Puisque HOL-
 „ LIER, dit-il, ne marque point
 „ qu'il eut aucune altération dans ces
 „ parties, pourquoi croire que c'est
 „ d'elles que venoit l'irritation ? N'é-

„ toient-elles pas plutôt les premières
„ à recevoir celles qui naissent dans
„ le cerveau ? ” Raison très-foible, puisqu’une humeur très-âcre peut exister dans une partie, sans y produire aucun changement qui tombe sous les sens, & qu’on n’en peut souvent découvrir aucun dans les cerveaux les plus épileptiques. Cependant il est très-plausible que l’idée de PISON est vraie quelquefois, & que, dans quelques cas, si les accès commencent par une partie, ce n’est pas parce qu’elle est le siège de l’irritation, mais parce que les nerfs qui s’y distribuent, sont irrités avant les autres; tel étoit, par exemple, à ce que je crois, le cas d’un jeune homme dont il est parlé §. 5., qui, avec des marques d’un cerveau mal organisé, avoit eu, dès son enfance, des mouvemens convulsifs d’un bras, qui, enfin dégénérèrent en épilepsie terrible, & qui n’étoient sans doute point produits par un vice particulier dans le bras, mais par un vice qui n’attaqua d’abord que l’origine des nerfs brachiaux, & qui ensuite gagna tout le cerveau; mais ces cas sont rares, & ne prouvent point la non-existence des épilepsies sym-

pathiques, dont WEFFER, qui a si bien connu les maux de nerfs, a jugé qu'on ne pouvoit pas nier la vérité : *Il est évident*, dit-il, *qu'il y a des épilepsies sans aucun vice dans le cerveau* ; & il en donne deux preuves : l'une, c'est qu'une piquûre de nerf, une morsure d'animaux, du lait aigri dans l'estomac, des poisons, des vers, la produisent chez les personnes qui ont le cerveau le mieux constitué : la seconde, c'est qu'on la guérit souvent par des applications sur la partie malade, sans aucun remède propre à agir sur le cerveau. J'ai vu, ajoute-t-il, un jeune paysan guéri d'une épilepsie très-violente, par l'application d'un vésicatoire sur tout le dos du pied, qui étoit la partie où le mal commençoit [s] ; & Mr. BOERHAAVE a bien vu cette différence que j'ai assignée plus haut : „ L'accès commence, dit-il, souvent „ par un mouvement qui se porte de „ puis les extrémités au cerveau : si

[s] *De cicut. aquat.* p. 97. M. MORGAGNE prouve aussi qu'on ne peut pas refuser d'admettre cette espèce d'épilepsie. *De sedib. & caus. morb.* L. 1. Epit. 9. §. 3.

„ la cause réside dans cette extrémité ,
 „ la ligature arrête l'accès, mais elle
 „ est inutile , si ce mouvement est l'ef-
 „ fet d'une cause qui agit sur le cerveau
 „ même [1]”. Je passe maintenant aux
 épilepsies qui ont leur siège dans les en-
 veloppes de ce viscere.

ARTICLE VII.

Des épilepsies Idiopathiques.

§. 38. L'on pourroit parler ici de ces épilepsies qui sont la suite des plaies, des meurtrissures, & des fractures de la tête; mais outre que l'épilepsie est un des accidens qui arrivent le plus rarement dans ces cas-là, comme LA MOTHE l'a déjà remarqué, j'ai dit tout ce que j'ai à dire là-dessus, en parlant des nerfs dans les cas chirurgicaux; ainsi il n'est question ici que de celles qui résultent de quelque vice spontané de l'intérieur du crâne & du cerveau même.

La première cause d'épilepsie qui se présente, c'est l'intropression des os du

[1] *De morbis nervorum*, p. 844.

crâne qui compriment alors le cerveau & déterminent les accès ; BORETIUS vit un enfant de dix semaines, qu'un pli grossier de son béguin fortement ferré par une mere imprudente , jetta dans des accès qui cessèrent, dès qu'il en eût fait éloigner la cause [u] , & il cite l'observation d'un jeune homme que les mauvais traitemens d'un précepteur avoient rendu épileptique , & dont il trouva que la cause du mal étoit une intropression du crâne , produite apparemment par les coups de bâtons qu'il avoit reçu sur la tête dans son enfance [x].

L'on peut placer ici une observation de Mr. POTEAU, célèbre chirurgien de Lyon, que je rapporterai en entier.

„ Un jeune homme de trentè ans ,
 „ ayant reçu un coup au sommet de la
 „ tête, la playe ne put être cicatrisée
 „ que dans un an ; aussi tôt que la ci-
 „ catrice fut parfaite , le malade fut
 „ attaqué d'accès d'épilepsie qui deve-
 „ noient toujours plus fréquents : ayant

[u] BORETIUS *de epilepsia ex depressione cranii. Regiom* 1725. §. 7.

[x] Ibid. §. 19. *Collect. pract.* HALLER. T. I.

„ resté un an dans cet état, il vint me
 „ consulter ; je rouvris la cicatrice par
 „ le moyen d'une pierre à cautere ;
 „ depuis ce jour-là, les accès ne repa-
 „ rurent plus, il y eut une légère ex-
 „ foliation, & je conseillai au malade
 „ d'entretenir cette plaie ouverte, par
 „ le moyen d'un pois : le chirurgien,
 „ à qui j'avois confié le pansément de
 „ ce malade, ayant essayé de laisser fer-
 „ mer la cicatrice, l'épilepsie reparut :
 „ elle disparut de nouveau par la se-
 „ conde application du caustique [y]”.

§. 39. On trouve dans les *Consultes*
 de ZECCHIUS, médecin de SIXTE-
 QUINT, le cas d'un homme qui souf-
 frit long-tems d'une douleur de tête,
 suivie d'une noire mélancolie & enfin
 de l'épilepsie, quelque tems avant sa
 mort ; dans le crâne duquel on trouva
 une partie assez considérable de la ta-
 ble intérieure de la partie supérieure de
 l'occipital, dans l'endroit même qui
 avoit été le siege de la douleur [z] ; &
 l'intropression d'une portion de cette

‘ [y] *Mélanges de Chirurgie* par M. CL.
 POTEAU. Lyon, 1760. p. 85.

[z] Voyez *sepulchret.* L. I. Sect. 12.
 Obs. 2. Tom. I. pag. 272.

même table interne d'un des os parietaux chez un enfant, fut la seule cause qu'on pût assigner à l'épilepsie dont il mourut [a].

§. 40. FERNEL trouva dans le cerveau d'un philosophe mort épileptique avec de longues douleurs au sommet de la tête, une humeur putride épanchée entre la dure-mère & le crâne dans cette même partie [b]; & RUMLER ouvrit le cadavre d'un jeune homme qui avoit été épileptique, & mourut après un long assoupissement, dans le cerveau duquel il trouva la dure-mère rongée par des ulcères qui avoient infecté le cerveau, dont toutes les sinuosités étoient pleines de sang [c].

§. 41. Outre les vices des os du crâne, il se forme quelquefois dans les membranes des concrétions osseuses, qui, par leur irritation sur le cerveau, produisent cette cruelle maladie; un homme dont le mal avoit commencé par une perte totale de connoissance, qui entraîna une chute de cheval, con-

[a] Ibid. Obs. 32. p. 285.

[b] Ibid. Obs. 18. p. 280.

[c] Ibid. Obs. 4. p. 24.

ferva de grands maux de tête & mourut épileptique six ans après ; il avoit dans la partie antérieure du sinus frontal , un os assez considérable & très-pointu , qui enflamma & corrompit les membranes [*d*]. LA MOTHE rapporte une observation très-intéressante d'une autre épilepsie qui dépendoit de la même cause. Un jeune homme de neuf ans fut attaqué d'un accès des plus violens qui dura dix-huit ou vingt-heures , ne cessa que par la saignée & l'émétique , & lui laissa une perte presque entière de mémoire qui ne revint que lentement , & de véritables accès d'épilepsie, dont les retours étoient fort éloignés dans les commencemens , mais devinrent de plus en plus fréquens , à mesure qu'il avançoit en âge , & arrivoient toujours la nuit ; il rendoit involontairement les urines pendant l'accès , & elles se suppri-

[*d*] *Sépulchr. Obs.* 27. Le même Collecteur rapporte ailleurs , *Medicin. septentrion.* [*L. I. T. I. p. 113.*] une autre observation d'Antoine de POZZIS , qui trouva au milieu du cerveau d'un Officier épileptique , un os assez considérable , qui avoit presque la figure d'une étoile.

moient pendant le jour , ce qui lui étoit fort incommodé ; il mourut au bout de vingt ans , d'une autre maladie qui se joignit à celle-ci ; & je trouvai , dit ce chirurgien , en ouvrant la tête , qu'à l'angle-interne de la dure-mere , à l'endroit où elle se replie pour former la faux ; il y avoit plusieurs petits os , qui y étoient comme plantés ou enracinés , desquels il sortoit une portion , qui sembloit y être mise exprès , pour empêcher que la pie-mere n'approchât de la faux , avec une quantité d'autres petites lames osseuses , que je jugeai être la cause du mal. [e].

§. 42. En 1734 , Mr. HUNAUD communiqua à l'académie , l'histoire d'un homme âgé de trente-cinq à quarante ans , sujet depuis bien des années à des accès épileptiques , dans le cada-

[e] *Traité complet de Chirurgie* , T. II. p. 397. Obs. 171. Cette même observation se trouve dans les *Mémoires de l'académie royale* , année 1711 , avec quelques détails de plus ; on y voit , entr'autres , que quand il eût repris la mémoire , il eut la passion de l'étude , mais que toute application lui donnoit un violent mal de tête , & des accès , qu'il devint très-mélancolique & qu'il mourut étique.

vre duquel il trouva plusieurs os pointus, attachés au côté du sinus longitudinal, & qui irritoient la pie-mère & le cerveau. Mr. BOERHAAVE avoit ouvert avec Mr. RAU, le cadavre d'un épileptique, dans lequel il trouva aussi la faux hérissée de pointes osseuses, qui occasionnoient un accès d'épilepsie toutes les fois que le sang se portoit à la tête [f]; & j'ai cité plus haut §. 3. l'observation d'un homme qui, après avoir été épileptique, devint hydrophobe, & dont la dure-mère étoit garnie de sept excroissances squirro-calculeuses, causes de la maladie & de la mort [g]. Un corps étranger introduit dans le cerveau, produit les mêmes maux que ces concrétions qui s'y forment; Mr. DIDIER vit à Montpellier un soldat qui avoit un accès d'épilepsie toutes les fois qu'il se couchoit à la renverse, & dont le mal dépendoit d'une balle qui

[f] *Praxis medica.* T. V. p. 36.

[g] *Journal. de Méd.* T. XIV p. 319.
Mr. MECKEL a aussi vu de violentes convulsions produites par un os très-aigu, long d'un pouce, attaché à la partie inférieure de la dure-mère. *Recherches sur les causes de la folie.* Obs. 14.

étant restée dans la partie antérieure du crâne, comprimoit le cerveau, quand il étoit dans cette attitude [*b*].

§. 43. Une humeur plus ou moins épaisse, épanchée entre les méninges & le cerveau, est aussi quelquefois la cause de l'épilepsie. Mr. DRELINCOURT trouva chez un vieux soldat ivrogne, sujet depuis long-tems à cette maladie, avec des pesanteurs de tête, un engourdissement des sens, souvent des accès de folie passagere, tous les sinus remplis d'une gelée jaune & épaisse, également épanchée sous la dure-mere, sur tout le cerveau dont elle remplissoit toutes les sinuosités, & avoit l'épaisseur d'un petit doigt [*i*]. Mr. POUPART trouva aussi sous la dure-mere d'un jeune homme de dix-sept ans, qui avoit eu pendant longtems des accès qui revenoient plusieurs fois par semaine, & qui étoit fort stupide, avec le visage plombé, une grande quantité d'une gelée dure, si intimément attachée à la dure-mere, qu'on avoit peine

[*h*] DIDIER, *patholog* pag 316.

[*i*] *S pulchret*. L. I. Sect. XII. addition.
Obs. 8. T. I. pag. 296.

à l'en séparer [k]; & *Ger.* BLAISE difféquant le cerveau d'une femme épileptique, trouva tous les sinus engorgés d'une matiere gelatineuse, si épaisse qu'elle avoit la consistance des polipes [l].

L'on a l'observation d'un enfant mort rachitique, asthmatique & épileptique, chez qui l'épilepsie pouvoit bien naturellement être imputée à une pierre ou concrétion calculeuse qu'on trouva dans la partie postérieure de la tête, entre la dure-mere & la pie-mere, & qui avoit peut-être pris son premier germe, lors d'une chute que l'enfant avoit fait à l'âge de dix ans, & qui avoit été l'origine de tous ses maux [m].

Cette observation me rappelle celle d'une jeune fille, qui jusques à l'âge de huit ans, avoit été très-bien faite, & d'un très-aimable caractère; à cet âge, elle eut une frayeur, sa santé s'altéra, son caractère devint d'abord tracassier, ensuite méchant, sa taille se contrefit, & à l'âge de seize ans, elle étoit tout-à-fait défigurée: à celui de neuf, elle eut

[k] *Mémoire de l'Acad.* 1705.

[l] *Sepulchret.* *ibid.* Obs. 24. p. 283.

[m] *Sepulchret.* *ibid.* Obs. 9. p. 276.

une défaillance ; quelques semaines après, un véritable accès d'épilepsie, quelques mois ensuite, un autre, puis successivement ils devinrent très-fréquens ; il paroît que la frayeur altéra l'organisation du cerveau, le caractère en fut changé, la nutrition à laquelle les nerfs sont si nécessaires fut dérangée ; & la jeune fille devint rachitique ; enfin elle tomba dans une véritable épilepsie, dans laquelle elle a trainé pendant plus de vingt ans une vie très-misérable.

§. 44. La cause de l'épilepsie réside aussi souvent dans le cerveau, ou pour parler plus exactement, l'on a souvent trouvé dans le cerveau même des épileptiques, la seule lésion sensible à laquelle on peut attribuer la maladie, quoiqu'il ne soit point démontré qu'elle en fut toujours la cause, comme je le prouverai ensuite.

L'une des lésions observées le plus fréquemment dans les cerveaux des épileptiques, c'est une grande quantité de sérosité plus ou moins âcre, plus ou moins liquide, plus ou moins limpide, qui inondoit les sinus, & paroïsoit même dans quelque cas abreuver toute la substance du cerveau. BONNET

difféqua une femme, qui, à la suite d'une colique, étoit devenue paralytique, & ensuite épileptique, dont la substance même du cerveau, les ventricules & la moëlle épiniere étoient remplis d'eau [n]; & RIVIÈRE ayant difféqué le cadavre d'un enfant de sept ans, qui avoit été sujet à des maux de tête, & à des accès d'épilepsie qui le tuerent, ne trouva d'autre vice que de l'eau dans le cerveau & les ventricules [o]. GAVASSETTI en trouva beaucoup dans le cerveau du Cardinal COMMANDONI qui, après avoir eu soixante accès dans vingt-quatre heures, mourut de foiblesse [p].

§. 45. Outre l'eau épanchée dans les ventricules, on a trouvé quelquefois des hydatides dans les vaisseaux du plexus choroïde. Le docteur RHÖETUS en cite deux exemples; l'un est

[n] Ibid. Obs. 12. pag. 277. Voyez aussi les Obs. 7. 8. 10. 13. 15. 17: dans cette dernière, il cite l'observation de FERNEL qui trouva dans le cerveau une liqueur très-puante.

[o] *Observat. Cent. 1. Obs. 37. Oper. medic. univers. fol. Genevæ, 1717. p. 473.*

[p] MORGAGNI, *de sedib. & causis. Ep. 9. §. 3. pag. 68.*

celui d'une femme de soixante ans, qui étoit depuis long-tems sujette à l'épilepsie; & qui mourut dans un accès; en ouvrant le crâne, on trouva une grande quantité de lymphe extravasée entre la dure-mere & le cerveau & dans les ventricules antérieurs; le plexus choroïde étoit garni d'une multitude de petites vessies pleines d'une eau claire; l'autre, aussi d'une vieille femme, qui avoit également des sérosités épanchées sous la pie-mere & dans les ventricules, mais dont le plexus choroïde étoit encore plus altéré, il avoit la forme d'une grappe, & la couleur des hydatides étoit celle des perles [*q*].

VALSALVA disséqua un épileptique âgé de soixante ans, qu'un accès de cette maladie emporta pendant le cours d'une fièvre; outre l'eau qu'on trouva entre la dure & la pie-mere & dans les sinus, les glandes du plexus choroïde en étoient gorgées [*r*], c'est-à-dire qu'il étoit aussi hidatique; vice dont on trouve encore d'autres exemples, mais toujours combinés avec cet épan-

[*q*] *Philosoph'ic. transact.* Num. 399, pag. 315.

[*r*] MORGAGNI *ibid.* §. 2.

chement général dans tout le cerveau , qu'on voit dans les trois cas que je viens de citer.

§. 46. Non-seulement le cerveau est quelquefois inondé d'eau , ou d'une humeur gélatineuse , mais sa propre substance devient quelquefois gelée ; Mr. MORGAGNI vit une femme sujette depuis deux ans à l'épilepsie , dont l'intérieur du crâne , les méninges , le cerveau étoient extrêmement sains , à cela près , que le tiers antérieur de l'hémisphère gauche du cerveau étoit beaucoup plus affaibli que le côté opposé ; cet affaiblissement venoit de son extrême mollesse dans cette partie ; mollesse très-sensible déjà dans la substance corticale , mais sur-tout dans la médullaire qui n'étoit qu'une gelée [5]. Le même observateur ayant ouvert le cadavre d'un homme sujet à la même maladie qui enfin l'emporta , ne trouva d'autre vice dans le cerveau , si l'on en excepte une légère dilatation de l'artère basillaire de nulle importance , qu'un amollissement total des couches des nerfs optiques qui ressembloient à une

[5] Ibid. §. 16.

espece de gelée noire à demi corrompue [t]; & il rappelle une observation analogue de MARCHETIS, qui avoit aussi vu un ramollissement considérable, dans une partie du cerveau d'un épileptique.

§. 47. La même maladie dépend fréquemment des causes les plus opposées, & l'on a souvent trouvé dans le cerveau des épileptiques, des tumeurs dures & même des squirres. PLATERUS parle d'un jeune homme dont le mal commença par un mal de tête qui ne l'abandonna plus, une insomnie opiniâtre, une foiblesse dans les facultés, enfin de fréquens accès convulsifs, & qui mourut étique; dans le cerveau duquel, il trouva, vers sa partie antérieure, une tumeur plus grosse qu'un œuf de poule, qui avoit la forme d'une pomme de pin, & dont la substance ressembloit à du blanc d'œuf durci, mais étoit beaucoup plus grosse [u]. FANTON dit que les ouvertures des cadavres ont souvent fait voir dans le cerveau même, des causes d'épilepsie qu'on

[t] MORGAGNI, *ibid.* §. 18.

[u] Felic. PLATERI, *Observat. Basilea*, 1680. L. I. p. 103.

croyoit trouver dans les méninges, & il cite un homme d'un âge mûr, qui ayant été épileptique pendant plusieurs années, avec une forte douleur habituelle autour du crâne, mourut apoplectique à la suite de quelques forts accès: le crâne étoit fortement attaché à la dure-mère qui étoit très-saine, aussi bien que les autres membranes & tout le cerveau, excepté le corps calleux où l'on trouva une tumeur dure plus grosse qu'une noix [x]. Mr. MORGAGNI nous a conservé une observation de Mr. WALTHIERI qui parle d'un homme dont le mal commença par une douleur de la partie antérieure de la tête avec de la pesanteur, ensuite perte d'odorat, & des accès d'épilepsie qui le fatiguèrent beaucoup pendant deux ans, au bout desquels il mourut, & dans le cerveau duquel on trouva la partie antérieure du cerveau, calleuse & très adhé-

[x] Joh. FANTONI, *Animadvers. in Opusc. PACCHIONI, Animadvers.* 22. FANTONI *Opuscula Medica*, 4to. Geneva 1738, page 37. PACCHIONI lui-même avoit trouvé une partie de la substance corticale squirreuse, dans un cardinal épileptique.

rente à la dure-mère [y] ; & Mr. MORGAGNI rappelle une observation de Mr. *A. KAAUW* BOERHAAVE , qui en disséquant le cerveau d'un soldat de marine , sujet depuis long-tems à l'épilepsie , dont un accès plus fort que les autres le tua , trouva que non-seulement en général , la substance corticale étoit endurcie , mais que dans plusieurs endroits elle étoit squirreuse , & dans d'autres calleuses.

§. 48. L'on peut joindre aux observations précédentes , comme leur étant analogue , celle que rapporte RHODIUS dans ses observations [z]. L'on ne doit point être surpris , dit-il , que cette maladie soit quelquefois incurable , si l'on fait attention aux causes qui la produisent ; un malade qui s'étoit rendu à Padoue , attiré par la réputation de J. PRÆVOT , s'en retourna sans avoir été soulagé ; & étant mort , peu de tems après son retour dans sa patrie , on trouva dans un des sinus du cerveau , une tumeur charnue , qui occasionnoit la maladie , en comprimant le cerveau , & qui avoit rendu tous les

[y] MORGAGNI *ibid.* §. 25 & 26.

[z] *Centur. 1. Observat. 55. Sepulchret. pag. 283.*

remèdes inutiles. P. BORELLI trouva aussi les ventricules pleins d'une matière semblable à de la graisse [a], & cette cause n'étoit pas moins incurable que la précédente.

§. 49. Les abcès produisent aussi quelquefois l'épilepsie; BAUHIN en trouva un dans le lobe droit du cerveau d'un jeune homme, qui étoit en même tems mélancolique & paralytique [b]; & Olaus BORRICHIVS en cite un autre exemple; c'est celui d'un jeune homme sujet à une petite toux sèche avec des maux de dents, chez qui les accès d'épilepsie étoient horribles, dont les yeux devenoient un peu saillans & rouges, & qui avoit des maux de tête, avec une disposition à l'assoupissement; il mourut de langueur, & l'on trouva dans le milieu du lobe droit du cerveau, un abcès plus grand qu'un œuf de poule, plein d'un pus blanc, mais très-fétide [c].

§. 50.

[a] BORELLI Cent. 2. Obs. 78.

[b] Voyez *Sepulchret.* Sect. 15. Obs. 18. pag. 371.

[c] Ibid. Sect. 12. additum. Observ. 5. pag. 293.

§. 60. Mr. CLOSSY à qui l'on doit un petit ouvrage utile sur les ouvertures des cadavres, rapporte une observation intéressante. Un homme de trente ans avoit, dit-il, des accès d'épilepsie qui revenoient plusieurs fois par jour depuis trois ans ; en examinant sa tête, il découvrit une tumeur sur le parietal gauche, qui y étoit restée depuis un coup qu'il y avoit reçu, & qui étoit l'époque du commencement des accès [d] ; ayant ouvert les tégumens, il trouva que c'étoit une tumeur osseuse, à laquelle on appliqua le trépan, l'os étoit spongieux, plein de pus & fortement attaché à la dure-mère, le malade mourut peu de jours après, léthargique, & l'ayant ouvert, on trouva la dure-mère garnie intérieurement de plusieurs petits abcès. [e], & l'on

[d] Cette épilepsie produite par un coup sur l'os parietal, en rappelle une de LANGIUS qui vit & guérit une jeune fille qui reçut à la temple un coup de poing d'un fou, qui lui occasionna plusieurs accès. LANGIUS *Epistol.* Tom. I. Ep. 10.

[e] *Observations taken from dissection of morbid. bodies, Sect. 1. Obs. 9 pag. 17.*

retrouve de semblables observations dans plusieurs observateurs, mais il seroit inutile d'en recueillir un plus grand nombre.

ARTICLE VIII.

Des causes qui déterminent le sang à la tête.

§. 51. Je viens de faire une longue énumération des causes de l'épilepsie, qui ont un siége fixe dans quelques parties du corps, & qui paroissent tenir au vice des solides, mais elles ne sont pas les seules; souvent cette maladie est produite uniquement par le vice des humeurs, qui irritent le cerveau, ou par leur quantité ou par leur âcreté. HIPPOCRATE a déjà rangé la plethore parmi les causes les plus fréquentes de cette maladie, & il n'y a aucun médecin qui n'ait eu bien des occasions de s'en convaincre. Une plethore très-forte peut irriter assez le cerveau le plus sain, pour produire un accès, & faire naître cette disposition épileptique dont j'ai parlé plus haut, qui étant une fois formée, se renouvelle alors.

par une plethore bien moins considérable ; & l'on verra dans la suite de ce chapitre , combien les saignées sont utiles dans cette maladie , en diminuant la plethore , qui est si bien attestée par tous les observateurs , & par toutes les observations.

DRELINCOURT, professeur à Leyde , parle d'un jeune homme fort , robuste & très-sanguin , qui , jouant à la paume , au sortir d'un diner fort abondant , fut attaqué d'une épilepsie violente , qui , récidivant après quelques momens de calme , le tua au bout de quelques heures. Au premier coup - d'œil , dit-il , le cadavre nous offrit un spectacle horrible ; le visage , le col , la poitrine , étoient livides , le sang couloit de la bouche & du nez , & quand j'ouvris le cerveau , je trouvai les arteres des membranes , & celles du cerveau , gorgées d'un sang noir & épais , dont une partie même avoit crevé ses vaisseaux & s'étoit épanchée (f). WEPFER ouvrit le

(f) *Sepulchret. ib. additam.* Observ 6. pag. 294. L'exercice violent de la paume , contribua sans doute beaucoup à cet accident.

cadavre d'un garçon boulanger , sujet pendant quelque temps à la catalepsie, ensuite épileptique , qui périt dans un accès violent , & dont les vaisseaux des membranes , du cerveau , & du plexus choroïde étoient excessivement engorgés ; il y avoit outre cela près d'une livre de sang épanché ; excepté la tension des vaisseaux du cerveau , on ne trouva , ni dans l'un ni dans l'autre de ces cadavres , aucun autre vice dans ce viscere qui put être regardé comme cause de la maladie (g). Le cuisinier & le porte - faix dont parle Mr. MORGAGNI , emportés l'un & l'autre par un accès d'épilepsie , ne laisserent non plus appercevoir aucun autre vice dans la tête qu'un très-grand engorgement des vaisseaux (h). Le docteur JOHNSTONE en ouvrant le cadavre d'un jeune homme de dix ans , mort aussi dans l'accès , trouva les vaisseaux de la pie - mere , du cerveau & du plexus choroïde , prodigieusement pleins & plus distendus de sang qu'il ne les avoit jamais vus

(g) WEPFER , pag. 303.

(h) Epist. 9. §. 12. & 14.

dans d'autres dissections ; en coupant la substance du cerveau, il en couloit des gouttes de sang beaucoup plus abondamment qu'à l'ordinaire (i) ; & Mr. MECKEL, qui a ouvert tant de cerveaux , déclare positivement qu'il ne l'a jamais trouvé engorgé d'autant de sang, que dans le cadavre d'un épileptique mort à l'hôpital des fous, à Berlin (k).

§. 52. J'ai vû un homme fort & robuste, âgé de quarante - quatre ans, sujet à l'épilepsie depuis sept ans, & qui avoit sept ou huit accès toutes les années, chez lequel l'examen le plus attentif, pendant onze mois, ne me laissa soupçonner aucune cause possible d'épilepsie idiopathique & sympathique, que la plethore ; à l'aide des saignées & du régime , il fut six mois sans accès ; après avoir beaucoup marché , & beaucoup bu de vin, dont il ne fai-

(i) *Medical. observat. and inquiries*, vol. 2. N°. 6. pag. 115. Il trouva aussi une hydatide de la grosseur d'une balle de pistolet, adhérente au plexus choroïde.

(k) *Recherches Anatomico - physiologiques sur les causes de la folie. Mémoires de Berlin*, 1760. Observ. 10.

soit presque plus d'usage ; un jour de St. Jacques, il prit un accès en entrant au lit ; l'accès de convulsion fut violent, mais court, il dégénéra en apoplexie, & le malade mourut au bout de cinq heures ; le sang ruisseloit presque par le nez, la bouche, les oreilles ; il avoit le visage & le col plutôt noirs que livides ; & il me paroît qu'il n'est pas possible de se refuser à croire que la plethore étoit la seule cause du mal ; il a diminué, quand on l'a diminuée par les saignées & le régime ; & quand, après cette diminution, la masse du sang a tout-à-coup été augmentée & raréfiée par beaucoup de vin, & déterminée au cerveau par la chaleur du soleil, elle a produit une attaque mortelle. Cette observation me rappelle un étranger qui me fit consulter depuis Montpellier, au mois de Mars 1768, & dont le mémoire, qui offre des faits rares & intéressans, ne sera pas déplacé ici, on y verra les mauvais effets de tout ce qui augmente la raréfaction des humeurs & les détermine à la tête.

Dès les premiers mois de son enfance, le malade, qui a actuellement

trente ans, avoit eu des cauteres au col, apparemment pour remédier à quelques accès convulsifs, ces premiers furent fermés, & quelques années après, on en fit un au bras, qui a subsisté jusques à l'âge de dix-huit ans; à cette époque, le malade alla à l'Université; pendant qu'il y fut & les années suivantes, pendant près de dix ans, il eut à essuyer quelques chagrins, des contradictions, peut-être il buvoit trop, & il fut obligé d'embrasser un genre de vie qui lui déplut. En entrant dans sa trentième année, il a été attaqué des accès qu'on va décrire.

Au mois de Mars 1767, étant à souper, l'on s'apperçût que sa bouche étoit de travers & ses yeux hagards, il fit tout-à-coup une violente contorsion, avec une espece de rugissement, & il alloit tomber à terre quand on le soutint; le visage devint fort rouge, il écuma beaucoup de la bouche, il fut plus d'une demi-heure dans de très-grandes convulsions, & toute la nuit dans un état de stupeur & d'assoupissement; ensuite il se remit jusques au 10^e. de Mai, qu'il eut vraisemblablement un accès pendant la nuit, puisque sa langue avoit été mor-

due & qu'il étoit ensanglanté; on lui donna le matin un émétique, & il resta fort malade tout le 10^e.; le 11^e. il parut bien, mais le soir, après avoir fait un tour de promenade, il parut tout-à-coup stupide & hébété, on le fit asseoir un instant sur la porte de sa maison; quand on voulut le faire entrer, il tourna la tête de côté, & perdit toute connoissance, il resta plus de deux heures dans cet état, regardant continuellement ses mains; tout-à-coup, il entra dans un accès beaucoup plus fort que le premier, qui dura plus d'une heure, & dès cet instant, il fut pendant dix jours, sans connoissance & sans mémoire.

Le 26 Juillet, étant à Bagnières, il but les eaux de bon matin, se baigna à neuf heures, se remit au lit & se relevant à onze heures & demi, il se sentit mal, se plaignit du froid, son nez & ses pieds avoient le froid d'un cadavre; après s'être échauffé, il entra au lit, & resta *tout hébété*, jusques à six heures du soir, qu'il se trouva bien & se releva; les jours suivans il fut fort abattu.

Le 3 Août il se portoit bien & étoit fort gai, il l'est ordinairement avant

l'attaque; peut-être qu'alors comme dans une légère fièvre, ou dans un premier degré d'ivresse, le commencement d'engorgement dans le cerveau produit cette gayeté malade, qui est un léger délire; mais à neuf heures du soir, on s'aperçut que la parole lui manquoit, il voulut se coucher, demanda avec peine à boire, perdit entièrement la parole & fut fou & phrénétique toute la nuit; le lendemain à huit heures du matin, il commença à se remettre, en pleurant prodigieusement, sans recouvrer cependant la parole jusqu'à quatre heures du soir.

Le 12 Septembre, étant à Cauterets, où il avoit pris pendant quatre jours les bains les plus chauds, il monta à cheval à six heures du matin, pour aller à Bareges; il faisoit fort chaud, le soleil étoit fort ardent, & il eut un mouvement de colere très-vif; une demi-heure après son arrivée à Bareges, il perdit entièrement la parole; mais prit du papier, un crayon, & écrivit, je me porte bien, mais je ne puis parler; bientôt il perdit la connoissance & resta ainsi quelques jours sans parole & sans connoissance, la bouche toujours ou-

verte & les yeux hagards ; alors il reconnut un peu la personne qui le soignoit toujours ; mais ses sens & sa mémoire n'étoient point dans leur affiette ; il quitta Bareges le 29 sans aucune présence d'esprit, abattu & assoupi ; peu-à-peu , il revint à son état naturel.

Le 25 Novembre , environ neuf heures du soir , il eut une courte attaque d'épilepsie , mais il fut pendant deux heures & demi sans parole & sans connoissance.

On ne détaille point les autres accès , l'on ajoute seulement , que dans la première attaque , il eut des marques très-rouges au front & dessus le nez , qui ne se dissipèrent parfaitement qu'au bout d'un mois ; il est aussi à observer , qu'il a toujours les mains & les pieds extrêmement froids.

Ce sentiment de froid aux extrémités , est assez commun à toutes les personnes sujettes aux maux de nerfs ; je l'ai sur-tout remarqué très-souvent chez les épileptiques , qui sont toujours d'autant mieux , qu'ils l'éprouvent moins , & il n'y a point de médecin qui n'ait pu observer , que souvent l'affoiblissement des jambes , chez les

vieillards, est un présage d'apoplexie ; cet affoiblissement , est aussi bien que le sentiment de froid , l'effet de la compression des nerfs à leur origine. J'examinerai plus bas, quel doit être l'effet des bains sur le malade dont je viens de parler , & je donnerai le traitement que je lui conseillai.

§. 53. Chez un grand nombre d'autres épileptiques , j'ai vu également les preuves les plus marquées de la plethore , & je réitere que c'est une des causes les plus fréquentes ; mais lors même qu'elle n'est pas la seule , elle devient très-fréquemment la cause occasionnelle qui détermine l'action de la cause prédisposante , comme on le verra dans la suite de ce chapitre. J'ai vu un jeune homme de trente ans , qui étoit sujet à cette maladie , depuis trois ans , & chez qui tous les accès étoient suivis d'une hémorragie , ou d'abord après ou dans l'espace de trente-six heures , elle ne manquoit pas une fois sur dix accès.

§. 54. C'est en augmentant la plethore que la suppression des hémorragies habituelles , occasionne cette maladie : on voit cela se voir assez sou-

vent chez les jeunes personnes du sexe , à qui cette suppression , si elles ont les nerfs sensibles , donne quelquefois des accidens d'une violence étonnante ; d'autres fois leur procure des convulsions simples , non épileptiques , qui sont moins fâcheuses , mais bien plus douloureuses. J'ai vu cette suppression occasionner des accès d'épilepsie fréquens & irréguliers , & j'ai encore sous les yeux une personne de vingt-trois ans , qui n'ayant point ses regles depuis dix-sept mois , a eu depuis treize , un accès de véritable épilepsie , précisément à toutes les époques où elles devoient revenir. Le premier arriva après un usage assez long d'emmenagogues chauds , dont elle a malheureusement continué l'usage trop long-tems ; je les ai absolument supprimés , & j'attends avec confiance , son rétablissement , d'une cure bien différente.

Quand la suppression se joint à une épilepsie qui dépend d'une autre cause , elle l'aggrave constamment ; & quoiqu'en guérissant la suppression , on ne guérisse point l'épilepsie , on ne peut cependant point espérer de guérir l'épi-

lepsie, aussi long-tems que la suppression durera.

Avant que de quitter cet article , je crois devoir faire observer , que la suppression des règles occasionne l'épilepsie , non - seulement en produisant une plethore , mais aussi en ce que l'engorgement de l'uterus est un vice qui devient un principe d'irritation , & rentre dans la classe des épilepsies sympathiques dont j'ai parlé §. 26 & 27.

L'on trouve dans le Journal de médecine (1), l'histoire d'une fille de vingt & un ans , dont les regles se supprimèrent au printems ; elle essuya fréquemment des douleurs de tête , des saignemens de nez , des éblouissemens , des vertiges , des maux de gorge passagers ; huit jours avant la St. Jean , elle sentit pendant quelques minutes , sa vue s'affoiblir ; les objets lui parurent tourner ; elle saigna du nez , & tomba dans un accès d'épilepsie ; ils revinrent constamment tous les jours , & même deux fois par jour , très-forts , & ils duroient toujours au moins un quart d'heure , jusqu'à ce que Mr.

(1) Tom. 30. p. 449.

DU BOUEIX, son médecin, eût commencé à lui donner des remèdes, qui la soulagerent d'abord, & la guériront radicalement, en rappelant les règles.

§. 55. Les épilepsies sont plus rarement une suite de la suppression des hémorroïdes que des règles; & il y en a plusieurs raisons; la première, c'est que les hémorroïdes sont une évacuation malade, bien moins essentielle par-là même que les règles; elles sont une habitude de santé dérangée; les règles, un caractère de bonne santé; la seconde, c'est que les hémorroïdes attaquent plus souvent les hommes, qui, comme je l'ai dit, sont moins sujets à l'épilepsie que les femmes; la troisième, c'est que les suppressions d'hémorroïdes sont plus ordinaires chez les hommes d'un certain âge, peu convulsibles, & les suppressions des règles chez les jeunes filles, qui le sont beaucoup. On voit cependant des épilepsies hémorroïdaires, si l'on peut leur donner ce nom. ZACUTUS *Lusitanus* en cite un exemple, chez une femme hémorroïdaire dès long-tems, que les hémorroïdes supprimées rendirent épileptique,

& que leur cours, rétabli par l'application des sangsues, guérit (*m*). RHODIUS cite une épilepsie guérie par le flux des hémorrhoïdes (*n*). J'en ai vu une chez un jeune homme de quinze ans, occasionnée par la suppression d'une hémorragie des narines, qu'il éprouvoit très-fréquemment & très-abondamment, il la supprima totalement par l'application d'une eau, qu'un vieux domestique lui donna ; quelques semaines après ; il prit de violens maux de tête, & au bout de trois mois, des accès d'épilepsie très-forts, qui revenoient à peu-près tous les quinze-jours, & qui, joints aux maux de tête continus, & à une petite fièvre, avoient si fort affoibli ses facultés & son corps, que quand je le vis, je jugeai qu'il n'avoit guere que quelques semaines à vivre.

HIPPOCRATE compte l'épilepsie parmi les maladies du printems (*o*), & j'ai observé moi-même que plusieurs épileptiques sont plus mal dans cette saison ; on peut regarder cela

(*m*) *Prax. admir.* L. 1. Obs. 25.

(*n*) *Observat.* Cent. 1. Obs. 65.

(*o*) *Aphor.* L. 3. Aph. 20.

cela comme un effet de la plethore; qui existe presque toujours à cette époque. Les humeurs s'accumulent pendant l'hiver, par l'inaction & la nature des alimens; la chaleur les raréfie au printems, & le cerveau étant irrité par la quantité & par l'âcreté, les accès redoublent.

§. 56. Quelquefois l'épilepsie est occasionnée par la plethore des vaisseaux de la tête, sans que le malade ait trop de sang; mais il se forme une plethore particuliere dans cet organe, comme cela arrive souvent dans d'autres, & cette plethore particuliere peut dépendre de plusieurs causes, que j'examinerai ailleurs en parlant de la difficulté qu'il y a à la détruire; mais on en trouve dans les *Actes* des savans de Leipzig, une bien singuliere, indiquée par Mr. SPON (p). Un homme de quarante-deux ans menoit depuis longtems une vie valétudinaire; & depuis trois ans, il étoit sujet à de fréquens accès d'épilepsie, & avoit eu une hydropisie de poitrine; enfin, au mois

(n) *Act. Eruditor. Lips. ann. 1682. & Sepulchret. p. 299.*

de Juillet 1682, il eut six accès depuis six heures du matin jusqu'à midi ; le premier lui fit perdre la parole, qu'il ne recouvra plus, le dernier le tua ; on trouva le lobe droit du cerveau enflammé & beaucoup de sang épanché, & les veines jugulaires internes, en grande partie obstruées par une humeur durcie ; cet embarras, gênant le retour du sang, produisit des accès d'épilepsie, qui de légers & rares dans les commencemens, dit SPON, augmentèrent à mesure que l'obstruction fit des progrès. Il n'est pas vraisemblable qu'HIPPOCRATE se soit instruit par la dissection de l'obstruction des veines jugulaires, mais il avoit bien connu ces plethores particulières des différens organes, & avoit bien vû, que l'épilepsie pouvoit en être l'effet. *L'épilepsie se forme, dit-il, lorsque les veines s'obstruent de différentes façons, & que le mouvement du sang étant gêné, il traverse plus difficilement certains vaisseaux, ou s'y arrête (q).*

§. 57. L'on comprend par le para-

(q) *De Flatibus*, FORS, Tom. 1. p. 300.

graphie précédent, que tout ce qui peut augmenter la quantité de sang, ou le déterminer à se porter plus abondamment à la tête, doit occasionner l'épilepsie, & cela n'est que trop vérifié par l'événement. BRASSAVOLUS, médecin de Ferrare, nous a conservé, dans ses commentaires sur HIPPOCRATE, l'observation d'un malade, que l'usage du vin de Crète rendit épileptique, & qui en eut plusieurs accès en très-peu de tems. J'ai vu un homme de vingt-trois ans, que le seul excès de vin avoit jeté dès l'âge de vingt ans, dans un tremblement général; à vingt-deux ans, il fut épileptique; à vingt-trois, quand je le vis, il avoit un accès d'épilepsie à-peu-près toutes les semaines; il étoit presque paralytique de la cuisse & de la jambe gauche, & il devenoit rapidement imbécille.

A R T I C L E I X.

Des Epilepsies occasionnées par l'âcreté des humeurs.

§. 58. Une humeur âcre qui se porte sur les nerfs, est encore une cause très-

fréquente d'épilepsie , soit qu'elle soit produite par quelque évacuation naturelle dérangée , ou par quelque évacuation malade , devenue habituelle , supprimée trop promptement. Il est très-fréquent de voir dans les armées , des soldats qui deviennent épileptiques , uniquement pour avoir arrêté tout-à-coup la transpiration , en se couchant sur un terrain humide , après des marches qui les ont échauffés (r).

§. 59. La suppression d'une diarrhée âcre produit aussi le même effet ; un soldat Hanovrien avoit des douleurs piquantes autour des hypocondres , avec un léger gonflement , qui se terminèrent au bout de quelques jours par une diarrhée séreuse ; la crainte d'une dysenterie épidémique , qui régnoit alors en ville , fit qu'il l'arrêta d'abord ; les hypocondres se gonflèrent de nouveau , & il sentoît une espèce de vapeur qui en partoît , & qui montant au cerveau , lui occasionnoit quelquefois dix forts accès d'épilepsie , tous les jours. L'accès ne l'attaquoit jamais à

(r) MONRO *account of diseases most frequent in the british military hospitals*, p. 237.

jeun , quoiqu'il éprouvât des mal-aises & des angoisses, mais ordinairement d'abord après avoir mangé ; cette espèce de vapeur le rendoit d'abord chancelant , lui donnoit des vertiges , & enfin le faisoit tomber , avec l'idée qu'il étoit renversé par un spectre (s).

§. 60. Une salivation mercurielle , arrêtée tout-à-coup par le froid , a aussi produit une épilepsie ; & l'on n'en fera point surpris , en faisant attention à l'âcreté de cette salive , qui enflamme , ulcère , gangrène , & à la sensibilité du genre nerveux dans le même tems.

§. 61. L'urine même supprimée , produit cette maladie ; mais alors elle est mortelle en peu d'heures , & ce n'est jamais l'épilepsie qu'on a à traiter. HEURNIUS en rapporte un exemple ; un militaire , dit-il , n'avoit point uriné depuis deux jours ; quand on me demanda , il avoit un tremblement général , un léger délire , & de l'embarras dans la langue , il tomba bientôt après dans l'épilepsie , & l'accès ,

(s) *Medicin. sept. de epileps.* Cap. 31.
T. I. p. 20.

qui fut très-violent & très-long, l'emporta le lendemain (t). Cette épilepsie est aisée à comprendre, en faisant attention que les iscuries se terminent presque toutes par un dépôt sur le cerveau; ces humeurs urineuses retenues dans la masse du sang, se déposent sur quelques parties, le dépôt se fait peu à-peu, l'irritation augmente par degré, enfin, il parvient à ce point qui tue. J'ai vu la marche de ce dépôt de la façon la plus marquée, & en même tems la plus cruelle pour le malade; c'étoit un vieillard presque octogenaire qui, sujet depuis plusieurs années à plusieurs maux, fut enfin attaqué en 1765, d'une iscurie qui dura quatorze jours, sans aucun accident considérable; le quinzième au matin, le malade se plaignit d'une douleur à la base de la langue, qui me fit sur-le-champ prévoir ce qui arriveroit; la douleur alla en augmentant, & au bout de quatre ou cinq heures, la langue commença à enfler, & la déglutition à devenir douloureuse; dès ce moment, je vis d'heu-

(t) *De morbis qui in singulis partib. capit. insid. sueverunt.* Leid. 1594. 410.
Cap. 22. p. 234.

re en heure les progrès du gonflement de la langue ; la déglutition devint bientôt impossible , les douleurs étoient atroces , la respiration extrêmement difficile ; enfin sa langue engorgée au suprême degré , sortoit de la bouche , & remplissant toute sa capacité , étouffa cruellement le malade. La même chose se passe dans le cerveau ; mais la mort est bien plus douce ; les malades tombent ordinairement dans l'assoupissement , & le cas dont parle HEURNIUS est rare.

C'est à l'acreté des humeurs qu'on doit attribuer ces épilepsies , qui sans aucune cause apparente , & sans qu'il y ait réellement aucun vice essentiel palpable dans l'organisation , attaquent souvent les sujets cacochimes , chez qui les humeurs sont dans un état , ou de crudité , ou de dissolution , ou de putridité , ou d'acrescence.

L'on doit encore rapporter ici les épilepsies qui attaquent souvent les enfans , avant l'éruption , dans les maladies dans lesquelles il doit s'en faire une , comme dans la rougeole , la fièvre miliaire , la fièvre écarlatine , & sur-tout la petite vérole ; le venin

qui occasionne la maladie irritant le genre nerveux , au moment où il a acquis tout son développement , & n'est pas encore déposé à la peau , produit ces accès d'épilepsie si effrayans pour les parens , & si peu pour le médecin , qui fait qu'ils vont finir , au moment où il aura paru quelques boutons , & qui ne les craint jamais , quand il est sûr du bon état du sujet , & qu'ils ne dépendent que de la cause que je viens de leur assigner.

§. 62. Mais de toutes les causes de cette classe , c'est-à-dire des humeurs âcres , retenues , qui produisent l'épilepsie , il n'y en a pas d'aussi fréquentes que la suppression de quelque écoulement maladif , devenu habituel , ou de quelque maladie de la peau repercutée ; tous les Observateurs sont si remplis de ces exemples , qu'il seroit inutile d'en citer beaucoup.

Une femme de septante ans , étoit sujette depuis dix-huit ans , à une évacuation périodique , qui paroïsoit ulcéreuse ; il se formoit tous les trois ou quatre mois un ulcère fardide sur l'aile du nez , qui jettoit pendant trois jours une grande quantité d'une hu-

meur très-âcre ; au bout de ce tems-là il se cicatrifioit , & la femme se portoit parfaitement bien.

Ennuyée de la longueur de ce mal , elle appliqua sur l'ulcère , dans le tems qu'il étoit en suppuration , par le conseil d'un charlatan , l'onguent de diampompholix , qui tarit l'écoulement , & avant les vingt-quatre heures révolues , elle fut atteinte d'une douleur de tete atroce , & d'un violent accès d'épilepsie ; elle en eut plusieurs autres pendant six mois , & resta pendant tout ce tems-là , dans une imbécillité presque totale ; elle ne fut guérie que quand on eût établi aux jambes l'écoulement de deux cauterres (u).

Un pere & un fils , qui avoient la galle , l'ayant fait passer , en se frottant sans préparation , avec un onguent composé de résine , de sel , de jaune d'œuf & de suc de limon , le pere en fut quitte pour des mouvemens convulsifs dans le bras droit , qui passèrent peu à peu sans rien faire , mais l'enfant tomba dans une véritable épilepsie ,

(u) ZACUT. LUSIT. *Præx. admir.* Lib. 1. Obs. 29.

lepsie qu'il conserva pendant plusieurs années, & dont TRINCAVELLI le guérit (x). J'ai été consulté par un malade, âgé de vingt-sept ans, qui étant tourmenté depuis plusieurs mois par une galle qui avoit extrêmement altéré sa santé, la fit passer en se frottant le creux de la main avec cet onguent ordinaire, composé de soufre, d'huile & de jaune d'œufs; trois semaines après, il eut de grands maux de tête qui détruisirent ses forces, & huit jours ensuite un accès d'épilepsie, qui étoit revenu treize fois dans l'espace de cinq mois, quand il me consulta. Le mauvais usage établi en Suède, de repercuter la teigne par l'application de l'eau froide, y rend l'épilepsie fréquente (y).

§. 63. L'on pourroit placer parmi les épilepsies produites par l'âcreté, celles dont parle DOVINET, qui rapporte que SILVIUS vit deux enfans épileptiques, dont la maladie étoit causée par le trop grand & trop long usage des poireaux, dont ils avoient presque-

(x) SCHENCK. p. 120.

(y) CARTHEUSER. *Pathologia*. Cap. de epilepsia. T. I.

ment vécu ; il les guérit par une purgation , & en leur interdisant l'usage de cet aliment (2).

Je vois dans une thèse soutenue à Wittemberg , qu'en donnant de grosses doses de poivre à un malade pour le guérir de la fièvre tierce , on le rendit épileptique (a) , & Mr. MANGOLT , professeur à Erfort , rappelle le cas d'un homme qu'aucun remède ne soulageoit ; enfin ses amis ayant remarqué que quand il prenoit beaucoup de sel , ses accès étoient fort augmentés ; il s'en deshabituait peu-à-peu , & cette seule privation le guérit absolument (b).

A R T I C L E X.

Questions sur les causes de l'Épilepsie.

§. 64. Il n'y a point de causes de l'épilepsie qu'on ne puisse ranger sous

(2) SCHENCK. p. 117.

(a) BOEHMER & TITIUS, *de exanthematum different. & origine Wittemberg* 1766. p. 7.

(b) MANGOLT *programma de epilepsia nonnullis speciebus. Erford* 1764.

quelqu'une des classes que j'ai indiquées, & il seroit inutile d'en spécifier un plus grand nombre ; mais l'article des causes n'est cependant pas encore épuisé, & il reste plusieurs questions à faire sur cet important objet.

La première qui se présente, c'est si toutes les épilepsies dépendent de quelque'une des causes que j'ai assignées, si l'on pourroit montrer dans tous les cadavres la cause du mal ? Je réponds qu'il s'en faut beaucoup. L'on a souvent ouvert des cadavres de gens épileptiques dont tous les viscères, & surtout le cerveau, étoient absolument sains ; l'on en trouve plusieurs exemples dans les observateurs, & j'ai examiné moi-même, avec le plus grand soin, en 1765, le cadavre d'un jeune homme de dix-huit ans, mort en très-peu de jours, d'une maladie aiguë qui n'avoit point affecté sa tête, & je ne crois pas qu'on puisse trouver un cerveau plus sain ; il avoit cependant des accès très-fréquens & très-forts, & dans le dernier mois avant sa mort, il en avoit eu neuf ; je donnai la plus grande attention aux corps calleux, au plexus choroïde, aux ventricules, aux

parties qui couvrent la glande pinéale & la selle du turc, que je me rappellois être celles où WEPFER avoit cru que résidoit la cause du mal, chez un malade dont il nous a conservé l'histoire (c); je trouvai tout également en bon état, & je ne vis rien à quoi l'on put attribuer avec la plus légère plausibilité la cause du mal; quelle étoit-elle donc? c'étoit uniquement cette cause proëgumene, cette disposition épileptique du cerveau, qui est bien sans doute un vice dans son organisation, mais un vice qui échappe à nos sens, que nous n'appercevrons jamais, & qui est mis en action par ces *causes accidentelles* dont je parlerai bientôt. Pour bien juger du cerveau d'un épileptique, il ne faut pas qu'il soit mort dans l'accès, parce qu'il produit toujours dans ce viscere un désordre sensible, qui empêche de bien juger de son état.

§. 65. Une seconde question, c'est si les vices de conformation que l'on a trouvés dans les cerveaux épileptiques, ou dans les parties d'où l'accès partoît, & que l'on a assigné comme les causes
(c) *De morb. capit. Obs. 129. p. 587.*

de la maladie, l'étoient réellement toujours ? Cela paroît fans conteste pour un grand nombre ; & si l'on se rappelle toutes celles que j'ai indiquées, on s'en convaincra aisément. Des petits os, ou une tumeur graisseuse dans les sinus, un squirre dans le plexus choroïde, sont aussi certainement les causes idiopathiques du mal des épileptiques chez lesquels on les trouva, que le ganglion que le docteur SHORT enleva, & après l'extirpation duquel la maladie cessa, l'étoit de l'épilepsie sympathique, à laquelle cette malade étoit sujette ; & l'on peut en dire autant de plusieurs autres causes ; mais on peut aussi le nier de quelques-unes, & peut-être toujours des épanchemens de sérosité. M. MORGAGNI, en rapportant les observations dans lesquelles cette sérosité étoit la cause apparente, a déjà douté qu'elle fût la cause réelle ; il est même à présumer qu'il ne l'a pas cru ; quand on examine la chose avec quelqu'attention, cela est absolument improbable, & je suis fortement persuadé que cette eau épanchée est toujours l'effet, & non pas la cause de l'accès ; mais elle contribue sans doute à

produire cet assoupissement & cet affaïssement qui en est si ordinairement la suite. WEPFER a cru, il est vrai, que la sérosité étoit une cause fréquente, parce, dit-il, qu'il n'y a que cette humeur qui puisse s'épancher & se résorber si promptement; la résorption est facile en effet, & voilà pourquoi on peut avoir tant d'accès sans danger; mais quelle est la cause de l'épanchement avant l'accès? Cet épanchement est toujours maladif; il suppose donc une lésion dans les fonctions & une lésion de la même nature que celle qui forme les hydropisies dans les autres parties du corps; de toutes ces lésions, il n'y en a qu'une de passagère, c'est un spasme qui empêche la résorption par les veines absorbantes; c'est donc la seule qu'on puisse admettre dans ce cas comme cause de l'épanchement; ainsi supposer l'épanchement cause de l'accès, c'est supposer une convulsion dans le cerveau comme cause de la convulsion qui va suivre, c'est supposer un accès avant l'accès, c'est faire par-là même la supposition la plus gratuite & la moins soutenable; l'eau épanchée n'est donc point la cause de

l'accès; mais il est à présumer qu'il s'en fait très-souvent un épanchement pendant l'accès, & cela paroît assez naturel, si l'on se rappelle ce que j'ai dit sur l'état du cerveau dans ce tems-là, pendant lequel le mouvement est absolument intercepté dans les veines nerveuses; ce qui rend très-probable qu'il cesse peut-être aussi, ou du moins se ralentit considérablement dans les veines lymphatiques, qui dans une grande partie du cerveau sont vraisemblablement continues aux veines nerveuses. Le même spasme, plus long ou plus fort, & étendu aux veines sanguines, est sans doute l'une des causes de ces épanchemens considérables de sang, dont on a vu plus haut des exemples.

Quand l'accès est long & fort, l'épanchement peut être assez considérable pour produire ou la mort, ou d'autres accidens auxquels je reviendrai dans la suite. J'ai souvent été porté à croire qu'il étoit la cause d'un désempoir hypochondriaque dans lequel une femme épileptique, d'ailleurs très-gaye, étoit toujours plongée pendant les deux ou trois premières heures après l'accès;

ses pleurs & ses sanglots ne tarissoient point ; ils étoient absolument involontaires ; ce n'étoit point l'affliction morale qui y avoit part ; quelquefois même la malade n'étoit pas assez parfaitement rendue à elle-même pour être susceptible de cette affliction.

L'on demandera si je crois qu'un épanchement sereux ne puisse cependant jamais occasionner cette maladie ? Je suis fort éloigné de le croire ; je pense au contraire que, quand par une cause quelconque, il s'est fait un épanchement de sérosité dans le cerveau, si elle n'est pas repompée, & qu'en croupissant elle vienne à s'altérer & à acquérir de l'âcreté, elle peut aisément produire des accès d'épilepsie ; je crois même que c'est ce qui les produit dans d'anciennes maladies de la tête, peu de tems avant la mort ; & c'est dans ces cas où le cerveau a souvent offert, sans abcès, une sanie putride & corrosive, & un dépérissement avec lequel on est étonné que le malade ait pu vivre si long-tems.

§. 66. Une troisieme question, & elle est bien importante, c'est de savoir pourquoi la cause existant tou-

jours, les accès sont quelquefois si éloignés, ou plutôt ne sont pas dans certains cas continuels; ou, ce qui revient presqu'au même, pourquoi un accès produit par une tumeur, par exemple, résidente dans le cerveau, cesse, & ne continue pas jusques à la mort? La réponse est fondée sur la variabilité presque continuelle de l'état de la machine humaine. La disposition épileptique, ce que j'ai appelé la cause proëgumene, est existante; il y a outre cela une cause occasionnelle bien caractérisée dans le cerveau même, ou ailleurs; cependant le malade n'a point d'accès; d'où vient cette suspension? De ce que ces deux causes, la proëgumene & l'occasionnelle ont besoin elles-mêmes d'être mises en jeu par un autre ordre de causes, que j'appelle les causes accidentelles. Ces causes sont extrêmement variées; on peut cependant les diviser en quelques classes principales qui renfermeront toutes les autres: ces classes sont; 1°. Les morales. 2°. Celles qui augmentent la quantité ou le mouvement du sang. 3°. Celles qui irritent le genre nerveux par leur âcreté. 4°. Celles qui déterminent plus particulie-

rement l'irritation sur la cause occasionnelle.

ARTICLE XI.

Des causes occasionnelles.

§. 67. Dans la première classe des causes morales, je comprends toutes les passions fortes, qui affectant vivement le genre nerveux, portent le trouble dans le cerveau même, & déterminent un accès. On a vu qu'elles opéroient cet effet sans qu'il en eût jamais existé, & qu'elles donnoient au cerveau cette disposition proëgumene qu'il n'avoit point encore; on comprend par-là combien aisément elles doivent rappeler les accès quand la cause a acquis un certain degré de force; aussi les frayeurs, le chagrin, la colere, sont les causes qui les renouvellent le plus souvent. Une femme, à qui un violent chagrin avoit procuré un premier accès, en reprenoit un toutes les fois que quelque chose lui faisoit de la peine; la frayeur occasionnée par le cri d'un chien, donnoit toujours un accès à un enfant épileptique,

& M. BOERHAAVE parle d'un autre à qui les fervantes avoient fait peur de méchans hommes, qu'elles lui avoient peint sans doute fort laids & qui ne pouvoit pas regarder fixement les parois de sa chambre, sans avoir un accès d'épilepsie (d).

Il n'est que trop commun d'en voir, même dans les premières années de leur vie, ou plutôt principalement dans les premières années de leur vie, à qui chaque accès de colere donne un accès de convulsion; j'en ai vu plusieurs; & il n'y a pas bien long-tems qu'on m'a amené un enfant, âgé de huit ans, absolument imbécille, qui étoit né & avoit vécu jusques à l'âge de trois ans avec beaucoup d'intelligence, mais assez colérique; à trois ans & quelques mois une colere violente lui procura un accès d'épilepsie (e), & dès ce moment les plus légers dépit le renouvelloient; à six ans, on s'aperçut que ses facultés baïssoient,

(d) *De morbis nervor.* p. 803.

(e) M. de SAUVAGES vit un enfant, à qui le refus d'un aliment dont il avoit envie, donna sur le champ un accès. *Nosolog. Method.* T. 2. p. 583.

& depuis lors les accès étant devenus tous les jours plus fréquents & se reproduisant sans aucune cause sensible , l'ont jetté dans le triste état dans lequel je l'ai vu , qui heureusement ne durera pas long-tems ; il est d'une foiblesse qui paroît tenir de la paralysie & dans un véritable marasme. Deux enfans de dix ans , dont l'un se portoit bien & l'autre étoit épileptique , prirent querelle en badinant ensemble ; l'épileptique en colere , mordit l'autre à la main droite & lui fit une playe ; quatre heures après , ce dernier eut un véritable accès d'épilepsie , qui étoit sûrement l'effet de la colere plutôt que de la blessure (f).

§. 68. La seconde classe renferme toutes celles qui augmentent la quantité du sang, ou son mouvement, ou qui le déterminent à la tête ; ainsi le trop d'alimens , ou les alimens trop nourrissans , tels que les viandes succulentes , le gibier , les œufs , les jus , les coulis , les écrevisses , les truffes , les épices , le vin , le café , les li-

(f) *Commerc. Litter. Noricum. Ann.*
1731. p. 29.

queurs , forment un des genres de cette classe.

Il y a peu de Médecins qui n'aient vu des épileptiques qui ne pouvoient point boire de vin sans éprouver un accès , & il n'est pas étonnant qu'une boisson , dont l'excès peut , comme on l'a vu , produire l'épilepsie chez des sujets qui n'y ont jamais été sujets , la renouvelle chez ceux qui en sont déjà atteints. L'irritation du café sur les nerfs est telle , que tous ceux chez qui ils sont affectés , en ressentent d'une façon marquée les mauvais effets.

Les exercices longs ou violens , forment un autre genre de ces causes. La chaleur extérieure du soleil , de l'air , des appartemens , des lits , des bains , sont le troisieme. On a vu plus haut , §. 52. une observation qui prouvoit l'influence de ces causes ; & dans ce moment , 10 Juillet 1769 , je viens d'être consulté par un ouvrier en chambre , qui ayant toujours joui d'une très-bonne santé , fut attaqué il y a deux mois , après un maniement d'armes de plusieurs heures , sur une place fort chaude , d'un très-violent mal de tête auquel il n'étoit point sujet ; le mal

continua toute la nuit , & le lendemain , en se promenant pour le diffiper , il fut attaqué d'un très-violent accès d'épilepsie ; il n'en a point eu de ressentiment pendant six semaines ; mais il s'est reproduit il y a trois jours , & l'a attaqué deux fois dans la même nuit sans qu'il s'en soit apperçu ; il est très-ordinaire de voir des appartemens trop chauds produire des accès.

L'air gâté par beaucoup de gens réunis dans un endroit fermé , la trop grande variété des objets entrent dans cette classe : ce sont ces deux raisons , & peut-être l'impression d'une assemblée religieuse , sur des nerfs foibles , qui font que les épileptiques tombent souvent dans les églises. La chaleur & le bruit les font aussi tomber dans les assemblées nombreuses ; les mêmes raisons & l'odeur des alimens , les font tomber à table.

La forte contension d'esprit , tout ce qui fixe trop long-tems l'attention , un trop long travail , même des yeux , sont autant de causes qui peuvent faire un quatrième genre de cette classe , puisqu'elles déterminent une plus grande quantité de sang à la tête ; elles

nuisent aussi en irritant les nerfs.

Un cinquième genre fera des attitudes qui portent le sang dans cette partie, telles que d'être la tête baissée, de tourner long-tems; celles qui occasionnent le vertige comme une situation trop élevée, la vue d'un précipice; les efforts quelconques qui non-seulement peuvent renouveler les accès, mais qui peut-être même peuvent en produire un premier; l'observation suivante donne au moins fortement lieu de le croire.

Il y a quelques années qu'on m'amena un jeune homme de dix-huit ans, que je connoissois depuis très-long-tems, qui étoit sain, robuste, sage, & qui ayant travaillé très-péniblement pendant près de dix heures, le jour précédent, à tourner un cabestan avec beaucoup de force, fut attaqué la nuit d'un accès d'épilepsie, qui l'avoit laissé dans une si grande foiblesse qu'il ne marchoit qu'avec peine. Cette foiblesse ne m'empêcha point de lui prescrire une saignée & les autres remèdes propres à dissiper l'engorgement des vaisseaux du cerveau; il fut très-bien pendant six mois; au bout de ce

tems - là il se retrouva mal , après avoir travaillé dans la même maison aussi péniblement , & il eut deux accès dans la même nuit ; les mêmes remèdes le guérèrent pour trois mois ; il reprit alors un accès après avoir beaucoup bû & dansé ; la superstition attribua le mal à un maléfice , & l'on consulta une vieille femme pour détruire les enchantemens d'une autre. J'ignore ce qu'elle employa , mais les accès devinrent si fréquens & si forts , qu'après être tombé dans l'état le plus triste , il fut emporté par un accès au bout de quelques mois. Quelques questions que j'aye fait au pere , à la mere , au malade , je n'ai jamais pu découvrir d'autre cause que ces efforts qui déterminèrent trop de sang à la tête , & Mr. MORGAGNI rapporte une observation parfaitement analogue ; c'est celle d'un portefaix , âgé de quarante ans , qui après des travaux excessifs , tomba tout-à-coup dans des accès d'épilepsie , auxquels il n'avoit jamais été sujet ; il mourut en peu de jours , & l'on trouva les vaisseaux du cerveau fort engorgés.

A cette classe de causes qui déterminent le sang au cerveau, il faut joindre celles qui operent cet effet en le repoussant des parties externes; c'est ainsi que le froid excessif a produit cette maladie & que je l'ai vû naître chez une fille de vingt ans, d'ailleurs très-bien portante, pour s'être baignée les jambes dans un ruisseau dont l'eau étoit très-froide; elle eut plusieurs accès dans peu de jours avant que je la visse; ne pouvant accuser aucune autre cause, je me contentai de lui ordonner une saignée, parce que je trouvai son poulx assez plein, & de lui faire exposer les jambes à la vapeur d'un sceau plein d'eau chaude, trois fois par jour, jusques à ce que les jambes eussent contracté un peu d'enflure; ce remede si simple la guérit parfaitement. BENIVENIUS (g) & WEDEL (h) citent aussi des épilepsies qui étoient la suite d'un froid excessif, qui nuit de deux façons, en portant trop de sang à la tête, comme je l'ai déjà dit, & en irritant les nerfs.

(g) *De abditis morborum causis*, Cap. 49.

(h) A. C. N. Decur. 2. ann. 2. obs. 160.

§. 69. Dans la troisieme classe, celle des causes qui irritent le genre nerveux par leur âcreté, on pourroit comprendre une partie de celles que j'ai compté dans la seconde parmi les alimens, & les boissons; les poireaux, les ails, les oignons, sont de cette classe, & l'on peut y placer les alimens qui forment un foyer d'irritation dans l'estomac, ou par leur indigestibilité ou quelquefois par ydiosyncrasie. L'épilepsie qui fut produite pour avoir mangé trop d'anguilles & guérie après les avoir rendues (i) étoit d'indigestion, & c'étoit par une suite d'ydiosyncrasie qu'un autre épileptique ne pouvoit jamais manger de lentilles qu'il n'eut un accès (k). J'ai vu un malade sujet aux convulsions qui en étoit attaqué toutes les fois qu'il prenoit du chocolat ou du vin, si son estomac n'étoit pas dans ce moment en très-bon état.

§. 70. Les remedes âcres, violens, irritans, entrent aussi dans cette classe. SEGER rapporte l'observation très-détaillée d'une femme attaquée d'une colique néphrétique, à qui une de ses

(i) SCHENCKIUS pag. 117.

(k) Ibid.

voisines ordonna une cuillerée d'huile distillée de genievre ; mais elle ne l'eut pas plutôt avalée qu'elle souffrit horriblement de la tête , eut des vomissemens , des foiblesses & enfin de véritables accès d'épilepsie (1) , & SELIGER fut appelé pour une jeune fille qui souffroit toujours de violens maux de tête à l'approche de ses regles & à qui un charlatan conseilla pour les dissiper une fomentation de décoction de jusquiame , qui au bout d'une heure , jetta la malade dans un accès d'épilepsie horrible , pour lequel on le demanda (m).

Les évacuations ordinaires retenues deviennent encore un âcre qui irrite & qui par cette irritation décide les accès.

§. 71. L'on peut aussi ranger dans cette classe , toutes les causes , qui faisant une impression trop forte sur les sens , irritent assez puissamment le genre nerveux pour occasionner une attaque : des bruits forts , imprévus , aigres , produisent souvent cet effet ,

(1) *Medicin. Septent.* Liv. I. Sect. 14. Cap. 10.

(m) *Ibid.* Cap. 9.

& l'on trouve dans une très-bonne dissertation d'un Mr. BUCHNER, l'observation d'un enfant, à qui tout objet rouge donnoit certainement un accès d'épilepsie (n). Les odeurs fortes les produisent souvent, & c'est par cette raison, comme l'a remarqué Mr. BOERHAAVE, qu'on exposoit anciennement les esclaves à la vapeur du jayet, pour savoir s'ils n'étoient point sujets à cette maladie. RONDELET parle de gens qui éprouvoient un accès toutes les fois qu'ils sentoient le froid aux oreilles & le prévenoient en les tamponant avec du coton (o). Mr. CLERC parle d'un de ses parens, chez qui l'odeur du chanvre produisoit le même effet, & de deux enfans qui éprouverent le même accident pour avoir dormi dans un champ de navette en fleurs (p).

Mr. LE WACHER avoit vu une femme épileptique & attaquée du cancer, qui prévoyoit les accès d'épilepsie

(n) J. P. BUCHNER de rachitid. perfecta Argent. 1755.

(o) Method. Curand. Morbor. Lib. 1. Cap. 36, pag. 170.

(p) Medicus veri amator. pag. 139.

quelques jours à l'avance par une augmentation des douleurs du cancer ; ce qui prouve que l'accès étoit l'effet d'une augmentation d'âcreté (q) qui commençoit à agir sur l'ulcère. La sensibilité aux impressions est quelquefois si grande que les plus légères font un effet très-considérable ; & SEHUBART nous a conservé l'histoire d'un jeune homme de dix-sept ans, dont les convulsions étoient la suite d'une chute qui avoit porté sur l'hypocondre droit & avoit produit des vomissemens de sang , chez qui toutes les odeurs agréables ou fétides, renouvelloient sur-le-champ les accès ; une mie de pain fermenté, non-seulement avalée, mais simplement sentie, la plus petite dose de viandes quelconques, le bouillon de viande, tous les remèdes, un bain de jambe tiède, produisoient le même effet (r) ; il ne vécut pendant un an que de pain sans levain, de miel, de lait crud & de raisins : dès qu'il avoit avalé un morceau de pain fermenté, il étoit saisi d'un

(q) *Traité du cancer des mammelles*, pag. 175.

(r) *Medicin. Septent. Cap. II. pag. III.*

hoquet qui devenoit bientôt convulsion générale ; pendant tout le tems qu'il observa le régime qu'on vient d'indiquer, il n'eut point d'accès qui dépendissent de l'estomac, mais ils étoient produits par des causes externes.

§. 72. Les excès de veilles, ceux dans les plaisirs de l'amour sont encore des especes de stimulans qui agissent par irritation, & qui, quoique leur action soit différente de celles des médicamens ou des alimens âcres, peuvent aussi en quelque façon être rangés dans cette classe.

§. 73. Toutes les causes, comme je l'ai déjà dit, qui déterminent les accès, appartiennent à quelqu'une des classes que j'ai indiqué ; mais elles ne sont pas toujours assignables, il s'en faut beaucoup ; au contraire elles échappent presque toujours : j'ai vu les épileptiques les plus attentifs à leur état, ne pouvoir jamais assigner les causes accidentelles de l'accès, & l'on n'en fera point surpris si l'on fait attention à la prodigieuse variabilité d'état dans lequel chaque homme se trouve continuellement, sans qu'il s'en apperçoive lui-même. Le plus ou le moins d'alimens

ou de boiffons , leur qualité , les bonnes ou mauvaises digestions , le plus ou le moins d'acide ou de toute autre humeur âcre dans l'estomac , une transpiration plus ou moins régulière , toutes les autres excretions diminuées ou augmentées , le plus ou le moins de chaud aux pieds ou aux mains , un exercice plus ou moins fort , des ligatures plus ou moins ferrées , des irrégularités dans le sommeil , les vicissitudes des saisons , les mouvemens de l'ame , sont autant de causes qui changent continuellement l'état de la machine , & quelques petits que soient ces changemens , ils suffisent pour produire un accès , quand la disposition épileptique est bien forte.

§. 74. L'on comprend aisément comment les causes accidentelles qui déterminent l'accès , peuvent échapper ; mais il est plus difficile de bien comprendre comment la disposition épileptique naît tout-à-coup , sans qu'on puisse rendre raison de ce qui la produit , & cela est cependant très-fréquent. Je fus consulté il y a deux ans , par une femme , âgée de trente-trois ans , qui depuis quatre ans n'avoit eu

ni grossesse, ni maladie, ni affection d'ame, n'avoit point reçu de coup, n'avoit point fait de chute; dans la situation, le genre de vie, l'habitation, les alimens, les boissons, de laquelle il n'étoit survenu aucun changement, dont les regles étoient très-régulières, & qui après une bonne nuit, fut attaquée, tout-à-coup, à jeun, le matin dans le lit, d'un accès d'épilepsie violent. Il y avoit deux ans qu'ils duroient quand elle vint me consulter, & se reproduisoient très-fréquemment, presque toujours la nuit, sans qu'elle s'en apperçût. Depuis l'époque des accès, elle avoit pris beaucoup d'embonpoint, mais d'un embonpoint mol & sur-tout un gros ventre, & dès qu'elle se baïsoit tout le sang-lui montoit à la tête. Quelle est dans ce cas la cause qui détermina le premier accès & laissa cette disposition à de nouveaux, qui revinrent si fréquemment? Dira t-on qu'à cette époque elle a commencé à devenir plethorique, & que les vaisseaux comprimés extérieurement par l'embonpoint ont déterminé plus de sang au cerveau? Mais l'augmentation d'embonpoint n'a-voit

roit point encore commencé ? Etoit-ce un principe d'obstructions dans le bas-ventre ? Mais rien ne l'annonçoit. Etoit-ce un relâchement des fibres , amené peu-à-peu & qui préparoit l'embonpoint qui suivit ? Etoit-ce une diminution dans la transpiration ? Il ne m'est point possible de résoudre cette obscurité , qui se reproduit dans plusieurs autres cas.

J'ai sous les yeux un mémoire à consulter , pour une jeune fille de dix-neuf ans , que l'accès a pris dans le sommeil , à cinq heures du matin , sans qu'il soit possible non plus d'en assigner la cause , si ce n'est peut-être un trop grand usage des acides & surtout du sel qu'elle aimoit beaucoup , & dont elle mangeoit souvent , sans être cependant opilée , & sans que cela parut déranger sa santé , qui étoit assez bonne ; elle n'avoit eu ni frayeur , ni chagrin ; tous ses accès se ressembloient , je les ai décrits plus haut à la fin du §. 3.



ARTICLE XII.

Symptômes avant-coureurs.

§. 75. Après avoir décrit l'épilepsie, & détaillé tout ce qui a rapport à ses causes, il me reste à parler, avant que de passer au traitement des symptômes, qui annoncent l'accès des maladies dont elle a été quelquefois suivie, de quelques-unes de ses variétés, & sur-tout de ses suites & de son pronostic.

Il y a des épileptiques chez qui l'accès arrive inopinément, sans qu'aucun symptôme préliminaire les en avertisse; ce sont les plus malheureux: il y en a d'autres plus heureux qui peuvent prévoir le mal, & qui par-là, ont l'avantage de prévenir quelques-uns des accidens, dont je parlerai plus bas, auxquels un accès imprévu expose. Ces symptômes varient suivant le siège de la cause & suivant les sujets. Quand la cause a son siège dans le cerveau, les symptômes qui précèdent l'accès annoncent l'embarras de cette partie. ARETÉE est l'auteur qui les a décrits avec le plus

d'exactitude, & tous les médecins doivent lire sa description, ou plutôt ce qui nous en reste. Je rapporterai principalement ce que j'ai vu.

L'engourdissement, l'assoupissement, les tournemens de tête (s), le gonflement des yeux & sur-tout des paupières, le larmoyement, la foiblesse, le dégoût, quelquefois la tristesse, sont les symptômes que j'ai observés le plus fréquemment. ARETÉE parle des feux devant les yeux, & ils sont confirmés par plusieurs observateurs (t), des tintemens d'oreille que j'ai aussi vus, d'un sentiment de mauvaise odeur, que je n'ai jamais vu chez les épileptiques, mais plusieurs fois chez les femmes hystériques ou les hommes hypocondres, d'une grande facilité à se mettre en colere, qui est en effet assez fréquente dans cette maladie. J'ai vu une malade chez laquelle il étoit bien rare que les accès ne fussent pas annoncés au moins dix heures à l'avance,

(s) Les vertiges, dit GALIEN, sont très-voisins de l'épilepsie & la précèdent souvent. *Commentar. in Aphoris. 17. L. 3.*

(t) *Medicin. Septent. id. Ch. 6. p. 109.*

par une rougeur assez marquée au haut des narines & entre les deux sourcils; & une autre dont le mari a presque toujours prévu les accès vingt-quatre heures à l'avance, par un gonflement assez sensible des veines du front. Je connois un jeune homme, qui est guéri actuellement, mais qui tout le tems de la maladie a toujours pressenti les accès par des rêves effrayans, ou au moins par un sommeil fort agité. L'on a vu plus haut les accès présagés par des douleurs au sein, ils le sont quelquefois par des dérangemens d'estomac. PITCAIRN parle d'un malade chez lequel ils étoient constamment précédés par de très-violens maux de tête (u), & TULP d'une femme qui les prévoyoit certainement par un battement plus fréquent des artères temporales, & une rougeur du visage & des mains (x). Je traite une malade, qu'un peu d'agitation & sur-tout l'insomnie, quatre ou cinq jour à l'avance, ont souvent averti d'une prochaine attaque.

(u) *Elementa Medicin. physic. Mathematic.*
L. 2. Cap. 5.

(x) *Observ.* L. 1. Obs. 14. pag. 28.

§. 76. Quand l'épilepsie est sympathique ; l'on a vû que l'accès est toujours annoncé par ce sentiment de froid ou de chatouillement , qui monte de la partie qui est le siege du mal au cerveau , & qui donne souvent le tems d'arrêter l'accès par une ligature ; indépendamment de ce sentiment , il y a quelques malades , bien peu cependant , chez lesquels il est aisé d'appercevoir des signes de mal-être dans la partie qui est le siege du mal , quelque tems auparavant ; mais cela n'arrive gueres que quand la cause du mal est dans les viscères ; je n'ai point appris que cela ait été observé , & je ne l'ai point observé moi-même , quand elle a son siege dans les membres.

ARTICLE XIII.

*Des maladies qui précèdent l'épilepsie ,
ou qui lui succèdent.*

§. 77. L'épilepsie est le plus souvent une maladie primitive & non point la suite d'aucune autre , d'autre fois elle est précédée par d'autres & elle les remplace quand elles finissent. G. HORS-

TIUS rapporte l'observation d'un enfant de douze ans, presque imbécille & ne parlant que très-mal, qui fut attaqué d'une paralysie qui dégénéra ensuite en épilepsie; ce fut le moment où il fut consulté, & il rétablit parfaitement toutes les facultés & la santé de l'enfant (y).

L'on voit dans les mémoires des *Curieux* de la nature, l'observation d'une femme, qui ayant eu une violente frayeur, perdit tout-à-coup la vue, sans autre accident; mais vingt-quatre heures après, elle tomba dans un accès d'épilepsie qui dura deux jours, & se dissipa avec l'aveuglement (z). Mr. STAHL rapporte l'observation d'une jeune fille de neuf ans, qui depuis cinq, étoit sujette à des accès d'épilepsie très-fréquens, qui avoient succédé à un gonflement du col, qu'on avoit dissipé par des remèdes extérieurs (a); & j'ai vû aujour-

(y) *Observat. Medic. lib. quatuor lib. prior. 4to. Ulmæ 1628. L. 2. Obs. 41.*

(z) *Centur. 3. Decur. 5. & 6. Observ. 28. pag. 65.*

(a) *Theoria Medica patholog. Sect. 2. Memb. 4. pag. 1017.*

d'hui premier Septembre 1769, un jeune garçon de quinze ans, très-sujet aux convulsions la première année de sa vie, bien portant depuis lors, qui ayant été effrayé, il y a douze jours, par le bruit qu'un chat fit dans la chambre où il couchoit, peu de jours après la mort de son grand-pere, fut attaqué, le matin, deux jours après, d'une perte subite de voix, sans perte d'aucun sens, mais un délire complet & fort agité, une physionomie égarée, des yeux hagards & un gonflement livide très-considérable entre les deux fourcils; cet accès dura une heure, & est revenu hier de la même façon; le jeune homme est resté foible, pâle, intimidé; & il me paroît bien démontré, que si on ne le guérit pas, ces accès ne tarderont pas à devenir épileptiques.

WEPFER vit deux épileptiques, dont le mal avoit commencé par la catalepsie (b); chez d'autres, de longs maux de tête, quelquefois des convulsions se terminent en épilepsie,

(b) *De Morb. capit. Observat.* 125. 126. pag. 573. 578.

& ces premiers maux disparoissent ; mais je n'ai jamais vu l'hystérie ou les vapeurs dégénérer en cette maladie ; je suis même convaincu que cela est très-rare , & ANDRÉE, médecin anglois , qui établit que cela est très-fréquent , s'est assurément trompé (c). Ce qui peut l'avoir induit en erreur , c'est que quelquefois les accès complets d'épilepsie , sont précédés long-tems à l'avance par des accès imparfaits dont les premiers ne paroissent qu'une attaque de vapeur ; ils sont assez éloignés , peu-à-peu ils se rapprochent & deviennent plus forts ; on craint qu'ils ne dégénèrent en apoplexie ; mais au bout de quelque tems ils sont véritable accès d'épilepsie. Il me paroît important d'être prévenu de cette observation , que j'ai réitéré plusieurs fois ; elle peut servir à prévenir le mal , en réglant sa cure en conséquence. Si dans l'idée que ces premiers accès ne sont que des vapeurs , on les néglige ou on les traite comme on traite ordinairement les vapeurs , le mal fait des progrès rapides & peut devenir épilepsie incurable.

(c) *On hysterics fits. pag. 27.*

§. 78. Si l'épilepsie est quelquefois la suite d'autres maladies , il arrive aussi qu'elle les devance & disparoit quand d'autres arrivent. HIPPOCRATE a déjà averti que l'épilepsie se guériffoit quelquefois par une douleur de cuisse , l'aveuglement , une tumeur aux seins ou aux testicules (d), & l'on comprend aisément comment cela peut avoir lieu quand cette maladie est occasionnée par une humeur âcre qui irritoit le cerveau , & cesse de l'irriter en se déposant ailleurs. WINCLER parle d'un homme scorbutique , qui eut pendant quelque tems des accès d'épilepsie , qui cessèrent quand l'humeur qui les produisoit changea de direction & rendit le malade aveugle (e). FABRI de Hilden , avoit déjà rapporté deux changemens d'épilepsie en aveuglement ; il est vrai que c'étoit moins l'ouvrage de la nature que celui d'un remède violent , employé par un empirique , pour la guérison de l'épilepsie , & je connois un jeune homme chez qui cette

(d) *Epid.* 2. Sect. 5. FOES. p. 1046.

(e) *Medicin. Septent.* Cap. 30. p. 119.

maladie a alterné pendant dix-huit mois avec la surdité. Un cas bien plus rare encore , c'est celui dont TULP fut le témoin. " La fille , dit-
 „ il , d'un conseiller d'Amsterdam ,
 „ étoit tourmentée par l'épilepsie , &
 „ tous les remedes lui étoient inutil-
 „ les ; mais la nature fit un effort en
 „ sa faveur , en déterminant la cause
 „ du mal sur les muscles de la gorge ;
 „ dès qu'il s'y fut formé un dépôt ,
 „ l'épilepsie disparut ; mais la malade
 „ n'avaloit que difficilement & perdit
 „ entièrement la parole pendant six
 „ mois ; au bout de ce terme , elle la
 „ recouvra & fut parfaitement gué-
 „ rie (f) ". Il rapporte dans le même
 endroit , l'exemple de deux enfans ,
 qui ne purent être guéris que quand la
 nature produisit deux ulcères à la peau
 de la tête , ce qui n'est pas rare ; &
 celui d'un orfèvre , qui fut délivré de
 cette maladie par une éruption de crou-
 tes écailleuses aux pieds , qui tomboient
 fréquemment , & il se faisoit alors un
 suintement abondant d'une humeur
 âcre , ce qui le guérit radicalement.

(f) *Obs. Medic. L. 1. Obs. 8.*

TRINCAVELLI avoit déjà rapporté l'observation d'un homme de cinquante ans, qui après avoir été malade d'épilepsie, pendant vingt-cinq ans, en guérit, en tombant dans une fièvre & une galle semblable à la lepre, qu'il eut la plus grande peine, à dissiper (g). L'on trouve dans les mémoires des curieux de la nature, un autre exemple d'une épilepsie, guérie spontanément par un ulcère qui se forma au pied (h), & le même ouvrage rapporte une autre crise plus rare; c'est la formation de trois petites tumeurs au pli du coude gauche; dès qu'elles furent formées, l'épilepsie cessa (i). Mr. HOFFMAN parle aussi d'une épilepsie guérie par l'éruption de la galle.

J'ai vu une jeune fille, de dix-sept ans, qui se porte à merveille aussi long-tems qu'elle porte une galle, qui parut la première fois après quinze jours d'usage de Valeriane; elle dura six semaines, pendant lesquelles elle

(g) *Consil. L. 1. Conf. 29.*

(h) *Decur. 3. Ann. 2. Obs. 24. p. 38.*

(i) *Ibid. 1. Ann. 3. Obs. 90. p. 146.*

suspendit le remède & n'eut point d'accès, qui revenoient dix ou douze fois par mois ; dès que l'éruption & la démangeaison eurent finis, les accès reparurent ; elle reprit de la Valeriane, la galle revint, les accès cessèrent ; j'observai cette alternative trois fois : je lui conseillai un cautère à la jambe gauche, qui étoit celle où l'éruption & la démangeaison étoient les plus fortes & des fortifiants internes ; je l'ai perdue de vue ; mais j'espère qu'elle est rétablie. Ch. PISON avoit vu cette maladie dégénérer en tetanos, & a déjà averti que souvent elle dégénéroit en apoplexie (*k*) ; mais ce changement me paroît devoir être plutôt appelé une augmentation de la maladie, c'est son dernier degré, celui par lequel elle finit ordinairement.

La fièvre quarte guérit-elle l'épilepsie ? HIPPOCRATE a dit, “ que
 „ ceux qui avoient la fièvre quarte,
 „ étoient rarement attaqués de convulsions, & que s'ils en étoient
 „ attaqués avant la fièvre, elle les en

(*k*) *De morb. a colluv. serof. Sect. 2. Part. 2. Cap. 7. p. 124.*

„délivreroit (1)”. RIVIERE est allé plus loin ; il a dit positivement ; „si la fièvre quarte attaque un épileptique & dure long-tems, elle le guérit (m)” : mais je ne connois & je n'ai fait aucune observation qui vérifie ces heureux pronostics, & pour juger ce qu'on en doit penser, il faut faire attention à ce que j'ai dit des caractères & des effets des fièvres d'accès, dans le chapitre où j'en ai traité. BALLONIUS a fait une observation sur la façon dont se termina une épilepsie, qu'il ne faut pas omettre. Un chevalier étoit fréquemment attaqué de violens accès d'épilepsie, que rien n'avoit pu guérir ; mais la nature fit pour le malade ce que l'art n'avoit pas pu faire ; elle le rendit phrénétique pendant quelque tems, peu-à-peu la phrénésie se dissipa, l'épilepsie se guérit en même tems & il se porta parfaitement bien (n). Une fièvre épidémique très-grave, guérit un enfant de dix ans, qui étoit épileptique de-

(1) *Aphor.* Liv. 5. Aph. 70.

(m) *Prax. Medic.* L. 1. Ch. 7. p. 177.

(n) *Consil. Medic.* L. 1. Conf. 33. T. 2.

182 DE L'ÉPILEPSIE.

puis trois ans , dont les accès revenoient souvent plusieurs fois par jour & qu'aucun remede n'avoit pu soulager (o).

ARTICLE XIV.

Singularité dans la marche de la maladie.

§. 79. Outre les variétés dans les accès que j'ai indiqué plus haut , il y en a d'assez singulieres dans la marche même de l'épilepsie; il est utile d'en connoître au moins quelques-unes , pour n'être pas étonné quand on en verra de semblables & exposé quelques-fois à se tromper sur le caractère de la maladie. On l'a vue revenir tous les mois régulièrement au même jour de la lune dont cela ne démontre point les chimériques influences.

Mr. BOERHAAVE connoissoit une femme, chez qui l'accès revenoit périodiquement deux fois chaque année d'une façon terrible , & dans l'entre-deux elle se portoit parfaitement

(o) A. C. N. Decur. 3. ann. 7. & 8.
p. 298.

bien (p). M. STAHL, cite le cas d'un jeune homme de dix-huit ans, qui avoit eu dans sa première enfance quelques accès d'épilepsie, dont il étoit absolument quitte; ayant été réveillé brusquement à trois heures du matin, par son maître, il en eut sur le champ un accès; c'étoit le jour avant le dernier quartier de la lune; dès-lors il en revint régulièrement tous les mois une attaque constamment à la même heure, & toujours à un jour ou deux près, à la même époque de la lunaison (q).

TULP, chez une malade dont j'ai déjà parlé, observa que le mal revenoit très-régulièrement cinq fois par jour, & que chaque accès duroit quatre heures. RAIGER vit un enfant de douze ans, qui, après bien d'autres maux, étoit paralytique du côté gauche; à ce triste état il en survint un plus triste encore, celui d'une épilepsie, qui l'attaquoit constamment à une certaine heure & qui lui ôtoit absolument le sentiment & la connoissance.

(p) *De Morb. Nervor.* p. 810.

(q) *Theoria Medica Patholôg.* Part. 2. Sect. 3. Memb. 3. p. 683.

ce, mais qui ne convulsoit que le côté paralytique, pendant tout l'accès le côté sain restoit immobile.

J'ai vû une épilepsie revenir périodiquement de deux jours l'un, à une heure fixe, & ces exemples sont connus; mais on doit les regarder comme des fièvres d'accès masquées en épilepsie, & non point comme de véritables épilepsies.

On lit dans le *Sepulchretum* de BONNET, un cas rapporté par CALDERA, d'une jeune fille, qui prenoit régulièrement à dix heures du matin, pendant quelque tems, un accès de fièvre & d'épilepsie (1); & un chirurgien anglois, vit un homme, âgé de vingt-six ans, dont l'accès commençoit par des convulsions dans les pieds, qui lui faisoient frapper des pieds contre terre, montoient insensiblement de la plante des pieds aux jambes, aux cuisses, au ventre, au dos & aux épaules, gagnoient la tête, lui ôtoient la connoissance, alors il pouvoit des cris effroyables qu'on auroit pu entendre de fort loin, & la

(1) *Sepulchret.* T. 3. p. 171.

poitrine & le ventre étoient dans des convulsions extraordinaires. Ces accès revenoient périodiquement tous les deux jours à la même heure à laquelle ceux de fièvre, qu'il avoit conservé pendant six mois, avoient accoutumé de revenir; une frayeur à son réveil avoit aussi changé la fièvre en épilepsie (s). J'aurai occasion de rapporter plus bas, en parlant du musc, un autre exemple d'un changement semblable.

§. 80. Les accès attaquent souvent dans le sommeil; il y en a deux raisons essentielles, l'une, c'est l'attitude dans laquelle on dort qui détermine plus de sang à la tête, l'autre c'est le gonflement des vaisseaux du cerveau pendant cet état, & je connois plusieurs épileptiques qui ont plus d'accès dans le sommeil, qu'éveillés; j'ai vu une femme, qui, pendant les dix-huit premiers mois, n'en avoit eu qu'endormie, & qui ne l'auroit jamais eue, sans les taches du visage & le dommage de la langue; il y a même des

(s) *Essais & observations de Médecine d'Edimbourg*, T. 6. Art. 49. pag. 138.

malades qui ne sont jamais attaqués que dans le sommeil; MUYS en cite deux exemples (t), & Mr. DE HAEN, un; son observation est trop belle, pour n'être pas rapportée en détail; mais je la renvoie à l'article où j'examinerai l'usage des anodins dans cette maladie, dont il est tems d'examiner les effets.

ARTICLE XV.

Des effets de l'épilepsie.

§. 81. ARETÉE en a déjà indiqué les principaux avec sa justesse ordinaire; l'engourdissement de l'esprit & des sens, le tintement & la pesanteur de l'ouïe, l'épaississement de la langue, l'altération des facultés, enfin l'imbécillité, la phrénésie même (u).

On peut les diviser en moraux & en physiques; les premiers sont les changemens qui arrivent dans les facultés, à mesure que leur organe souffre; les

(t) *Praxis Chirurgica rational.* Decur. 5. Observ. 5. pag. 299.

(u) *De causis diuturnor. Morbor.* Lib. 1. Cap. 4.

seconds, sont ceux qui arrivent dans les différentes parties du corps.

Les effets moraux sont ordinairement un affoiblissement général dans les facultés ; le feu de l'imagination est la première qui souffre, la mémoire diminue, la conception est moins prompte, enfin l'intelligence même s'affoiblit, & il n'est pas rare de voir des épileptiques qui tombent peu-à-peu dans une imbécillité presque totale, quand les accès sont forts & fréquens. Mr. BOERHAAVE a vû un officier réduit par l'épilepsie à l'état d'un petit enfant, & en avoir toute la pu^{er}lanimité (x) ; & si l'on fait attention à l'état violent dans lequel est le cerveau pendant l'accès, on ne sera pas surpris que leur répétition l'altère, & que les facultés, dont l'exercice dépend de son organisation, s'alterent aussi. Un seul accès d'apoplexie prive souvent de toutes les facultés pour le reste de la vie : un accès d'épilepsie est quelquefois un état plus violent pour le cerveau qu'une apoplexie ; il peut opérer les mêmes effets, & c'est ce qui arrive.

(x) *De Morbis Nervor.* pag. 811.

§. 82. On a vu plus haut l'observation rapportée par LA MOTTE, d'un enfant, à qui un seul accès ôta la mémoire ; je n'ai vu aucun épileptique, quand les accès ne sont pas excessivement éloignés, qui ne se plaignit que la sienne s'affoiblissoit, & il y en a un grand nombre, qui après l'accès, restent dans un état d'étourdissement & d'un léger délire, qui dure souvent quelques heures. FABIVS COLUMNA, savant Napolitain, & qui s'étoit guéri lui-même de l'épilepsie, passa plusieurs des dernières années de sa vie, (il est vrai qu'il parvint à une vieillesse avancée) dans une si grande perte de mémoire qu'il ne connoissoit plus les lettres. Les accès qu'il avoit eu étant jeune, avoient-ils laissé de la foiblesse dans son cerveau, ou reprit-il sur la fin de sa vie de nouveaux accès, comme l'a soupçonné depuis peu l'auteur italien des vies de quelques grands hommes ?

§. 83. Mr. BAADER a vu un homme, âgé de plus de cinquante ans, à qui le premier accès d'épilepsie, qui l'attaqua sans aucune cause apparente, fit non-seulement perdre totalement la

mémoire , mais le laissa entièrement fou ; il vécut quelques mois dans cet état , ayant de fréquens accès & mourut hydropique. On trouva beaucoup d'hydatides à la surface interne de la dure-mere , beaucoup de glandes engorgées dans les sinus , une lymphe visqueuse épanchée sur la pie-mere , & les vaisseaux du plexus choroïde gorgés d'une sérosité jaune (1).

§. 84. Ces dérangemens sont encore plus faciles dans l'enfance ; & parmi les fous , il y en a plusieurs qui le sont par une suite d'accès d'épilepsie dans les premiers mois de leur vie.

„ J'ai vu dans les hôpitaux , dit
 „ Mr. VAN SWIETEN , plusieurs
 „ infortunés , qui étoient fous dès leur
 „ première enfance , & tous ceux dont
 „ j'ai pu savoir exactement l'histoire
 „ par leurs parens , avoient eu auparavant des accès d'épilepsie (2)”.
 Quand on est habitué à observer les enfans & qu'on s'est exercé à juger de leurs facultés , par leur physionomie ,

(1) BAADER , *Observat. Medicin. incisionibus cadaverum illustrata* , Observ. 48. pag. 233.

(2) VAN SWIETEN §. 1047. pag. 425.

on peut prévoir dès les premières semaines de leur vie, si les accès de convulsions n'ont point vicié leur organisation ; l'ensemble de leurs traits, leurs yeux sur-tout, la grosseur des veines temporales, leurs gestes, leur façon de têter, ont des caractères différens de ceux de l'enfant bien organisé ; il n'est pas possible de décrire nettement ces différences, mais elles n'en sont pas moins sensibles, & j'ai déjà eu plusieurs fois le chagrin de voir vérifier par l'événement le pronostic que j'avois fait pour quelques enfans, dont j'avois remarqué la lésion des facultés avant le tems de leur développement.

§. 85. L'on m'a amené, il y a deux ans, en 1767, un enfant âgé de onze ans, qui étoit né foible, mais qui s'étoit fortifié en nourrice, & qui, à dix-huit mois, avoit toute la force, la connoissance & l'intelligence qu'on peut avoir à cet âge ; quand je l'ai vu, sa mémoire, son intelligence, son langage, étoient ceux d'un enfant de deux ans, qui ne seroit pas fort avancé, il ne peut pas même fixer son attention ; cet état cruel est la suite d'un coup de

pistolet , qu'un homme yvre tira à ses oreilles , à l'âge de dix-huit mois.

» Dès cet instant il eut des mouve-
» mens convulsifs , qui devinrent suc-
» cessivement plus forts ; il oublia les
» mots qu'il savoit , prit un air égaré
» & une vivacité qui le faisoit courir
» sans-cesse , sans but , sans dessein.
» Les mouvemens convulsifs étoient
» de deux sortes ; il en avoit de très-
» légers dans la tête & les bras , qui ne
» s'appercevoient qu'avec peine ; on en
» comptoit quelquefois dix ou douze
» de suite , & il n'en restoit aucune
» impression ; les autres étoient plus
» marqués , l'enfant en avoit vingt ,
» trente , jusques à quarante par
» jour ; il les sentoit venir , s'arrê-
» toit , levoit la main & regardoit
» fixement dedans ; si le mouvement
» convulsif ne venoit pas d'abord ,
» l'enfant frappoit du pied & se met-
» toit à courir. Les mouvemens étoient
» plus ou moins forts ; dans les plus
» légers , qui faisoient le plus grand
» nombre , il ne faisoit que ployer le
» corps & baisser un moment la tête ;
» dans les plus forts , il tomboit par
» terre , & de ceux-ci il en avoit dix

„ ou douze par jour , dans le nombre
 „ desquels on en comptoit deux ou
 „ trois où l'enfant restoit par terre une
 „ minute ou deux , avec des convul-
 „ sions dans tout le corps & en faisant
 „ de grands cris. Dès que cet accident
 „ étoit fini , l'enfant devenoit excessi-
 „ vement pâle & s'assoupissoit pour
 „ quelques momens (a). Cet état dura
 „ jusqu'à l'âge de trois ans , & pen-
 „ dant tout ce tems-là l'enfant dormit
 „ peu , étoit dans une agitation con-
 „ tinuelle , faisoit souvent des cris &
 „ mangeoit beaucoup”. La façon dont
 il guérit , quoiqu'étrangere à cet arti-
 cle , est assez intéressante pour mériter
 d'être rapportée. “ A l'âge de trois ans ,
 „ en tombant , il mit le derriere , nud ,
 „ dans un brasier & se brûla considé-
 „ rablement ; il est à présumer qu'il
 „ eut beaucoup de peur & de douleur ,
 „ ce qui fit une révolution chez lui ;
 „ car dès ce moment les convulsions
 „ cessèrent totalement ”.

§. 86. Tous les enfans à qui l'épilepsie

(a) Ces derniers accès étoient évidemment
 des accès d'épilepsie complets ; les autres
 étoient des accès d'épilepsie imparfaits.

lepsie fait perdre les facultés, ne sont pas aussi malheureux, & il y en a plusieurs qui les recouvrent; l'observation suivante en est un exemple & je ne crains point de la rapporter toute entière. On m'amena le 14 Mai 1767, d'une ville voisine, un enfant de six ans qui depuis six mois avoit eu quatre accès d'épilepsie; il y avoit quinze jours qu'il avoit eu le dernier qui avoit duré trois heures, & après lequel il étoit survenu de la fièvre pour laquelle on lui avoit tiré six onces de sang; cette saignée calma la fièvre, mais l'accès lui avoit laissé une perte totale de connoissance & de mémoire; il ne reconnoissoit pas même son pere & sa mere, & il mangeoit beaucoup; son air cacochime, la couleur de ses yeux, la dilatation de la prunelle, son gros ventre me firent soupçonner des vers ou au moins beaucoup de cacochilie dans les premières voyes; je lui ordonnai du tartre émetique dans de l'eau pour en prendre de petites doses de tems en tems (a), la première

(b) ʒ. Tartar. emetici gr. xxx.
 Sirup. capill. vener. ʒi. aquæ fontan. ʒvi.

lui fit vomir dix fois de la bile , les suivantes ne le firent point vomir & ne le purgerent point , mais il rendit quatorze très gros vers , la connoissance revint après l'effet de la première prise, mais la mémoire ne revenoit pas bien ; j'ordonnai de grands vésicatoires aux jambes , elle revint au bout de quelques jours , depuis lors je n'en ai pas oui reparler.

§. 87. Les désordres physiques peuvent se ranger sous deux classes ; ceux qui sont l'effet de la force avec laquelle le sang est poussé vers le cerveau & de la difficulté avec laquelle il en revient comme en général de la difficulté, qu'il a à passer dans le genre veineux , & ceux qui dépendent des violents mouvemens convulsifs, en tant qu'ils peuvent opérer des effets mécaniques très forts. Si l'on se rappelle ce que j'ai dit plus haut §. 2. & 3. en décrivant l'accès, & ensuite §. 51. en parlant de l'ouverture des cadavres, on comprendra aisément que dans tous les accès de quelque cause qu'ils viennent, les vaisseaux externes & inter-

f. pot. pour en prendre une grande cueillerée à café quatre fois par jour de 3 en 3 heures.

nes de la tête sont engorgés par beaucoup de sang, que l'effet le moins fâcheux qui puisse en resulter est un affoiblissement de ces vaisseaux, & une diminution de leur action; cela arrive constamment à toutes les fibres animales qui sont souvent tendues; par là même peu à peu ces vaisseaux doivent rester plus dilatés, & l'on peut s'en convaincre sur les externes; il est constant que quand les accès d'épilepsie sont fréquents, ils grossissent les traits, changent la physionomie, & défigurent les plus jolis visages, comme ARETÉE l'avoit déjà très bien vu; les paupières inférieures sur-tout restent d'abord gonflées & ensuite pendantes, le nez & les lèvres grossissent, les veines frontales & temporales restent plus apparentes; c'est un gonflement semblable des vaisseaux internes qui produit les altérations morales dont j'ai parlé dans le §. précédent. L'élaboration & la distribution des esprits animaux se faisant moins bien, les fonctions tombent peu à peu dans une espèce de langueur; & les épileptiques sont sujets aux vertiges; Mr. BOERHAAVE avoit connu un épi-

leptique qui vivoit comme dans un tremblement de terre continuel, rien ne lui paroïsoit stable (c) ; ils ont moins d'activité, moins de force, & les esprits animaux acquérant trop de mobilité, ils sont susceptibles de toutes les émotions, irascibles, difficiles à vivre ; souvent ils tombent dans la cacochimie ; j'ai vû une femme que des accès répétés très souvent pendant dix mois, avoient jetté dans un anasarque général ; quelquefois ils tombent dans l'hydropisie ascite ; les enfans ont ordinairement mauvais visage & paroissent cachectiques ; tous ces accidents sont une suite bien naturelle de l'influence des esprits animaux sur toutes les fonctions.

Quand l'accès est fort ou long, il peut occasionner des ruptures de vaisseaux sanguins, une véritable apoplexie comme on l'a déjà dit ; moins longs & moins violents, ils produisent quelquefois des épanchemens sereux dont j'ai déjà parlé plus haut & auxquels j'ai attribué quelques uns des effets qu'on observe quelquefois après

(c) *De morb. nervor.* p. 811.

les accès. Mr. RITTER dans une belle observation, qu'il a donné fort en détail, parle d'un accès qu'éprouva sa malade, jeune fille de treize ans, plus fort que les autres, qui la laissa sans voix, sourde, aveugle de l'œil droit, & légèrement paralytique du côté gauche : cette paralysie se dissipa peu à peu par des frictions avec des linges chauds. La cécité & la surdité durèrent trente-deux jours & furent guéries par un autre accès ; l'aphonie dura neuf mois, & fut dissipée par une fièvre catharrale (d). Je vois assez souvent des enfans de la campagne paralytiques ou d'un bras ou d'une jambe ou de toutes les deux, & j'ai presque toujours lieu de croire après l'examen le plus attentif que ces paralysies sont l'effet d'une attaque d'épilepsie.

§. 88. Ce n'est pas seulement dans le cerveau que les épanchemens ont lieu, ils se font dans d'autres parties avec la même force ; le Dr. SHORT a vu un accès si terrible que le ventri-

(d) *Nova Acta Curios. Natur.* Tom. 3.
Obs. 80. p. 392.

cule gauche du cœur creva & tout le sang s'épancha dans le péricarde & dans la poitrine (e). J'ai été consulté au mois d'Avril 1764 par un habile Chirurgien d'une ville voisine, pour un enfant à la mammelle, qui après un accès d'épilepsie, l'unique qu'il ait eu, se trouva avoir perdu la vue; en l'examinant on trouva une cataracte très épaisse sur les deux yeux; & au mois de Juin 1766 on m'a amené un enfant de sept ans qui, étant aussi à la mammelle, avoit eu un accès d'épilepsie pendant la nuit qui détermina une si grande quantité de sang à la tête que plusieurs vaisseaux du visage crevèrent & laissèrent couler le sang de toutes parts; le dépôt sur les yeux fut tel que l'enfant resta aveugle pendant six semaines. Les convulsions occasionnées par le poison chez les animaux produisent souvent une apoplexie par épanchement de sang (f). La même extravasation peut s'étendre quelquefois par tout le

(e) *Medical Observat. and. inquir.*
Tom. 2. p. 119.

(f) W E P F E R, de *Cicut. aquat.*
p. 248.

corps , quand le spasme des muscles est si général & si fort qu'il y intercepte la circulation & oblige les vaisseaux à se vider dans la tunique cellulaire ; Mr. BOERHAAVE fut témoin d'un spectacle bien singulier dans ce genre & il eut bien de la peine à persuader aux parents qu'il étoit naturel. Un enfant mourut dans un violent paroxisme ; tout son corps devint aussi noir que celui d'un nègre , excepté dans une partie du bas ventre , sur laquelle la main avoit été fortement appliquée par une convulsion , & où elle avoit empêché l'extravasation de s'étendre , ce qui lui avoit conservé sa blancheur naturelle (g).

§. 89. Il arrive souvent dans le paroxisme des hémorragies considérables, sans que l'accès en paroisse diminuer ; & BOHN , l'un des plus grands Médecins du commencement de ce siècle, a vu un épileptique chez qui chaque accès d'épilepsie procuroit un accès d'hémoptisie abondante. (h). L'action

(g) VANSWIETEN Tom. 3. p. 427.
§. 1077.

(h) *De hamoptysi.* §. 23.

du spasme chez les épileptiques y produit, mais fort rarement cet effet assez singulier (*i*), remarqué dans d'autres cas, de donner une couleur verte à la bile. Tous ces phénomènes observés font juger qu'il y en a beaucoup d'autres de même genre qui ne l'ont point été encore, mais qui n'en sont pas moins réels; & il suffit de savoir qu'il se fait des épanchemens, & que les sécrétions sont troublées, pour comprendre qu'il doit aussi se faire des épanchemens dans les organes intérieurs, & que ces épanchemens peuvent devenir le germe de maladies de langueur, différentes de l'épilepsie, dont on ne découvre jamais la première cause; l'on doit même placer ici une remarque bien judicieuse de Mr. CLOSSY, c'est que non seulement le spasme produit un épanchement, mais qu'en faisant perdre aux vaisseaux leur élasticité, il diminue la force de resorption, laisse croupir les humeurs & peut produire la gangrène (*k*), que

(*i*) Mr. BOERHAAVE, *l'a vu fréquemment.* p. 816.

(*k*) *Observations taken from the dissections.* p. 79.

LANCISI a vu en effet se former à une main d'abord après quelques accès d'épilepsie & faire des progrès si rapides qu'il fallut nécessairement amputer le bras (1).

§. 90. Je ne dois pas omettre un autre effet, sur lequel Mr. BOERHAAVE a beaucoup insisté, que j'ai vu, mais que je n'ai pas trouvé constamment chez ceux chez qui les accès étoient cependant assez fréquents, c'est un poulx grand & plein qu'il attribue à la dilatation des artères. Les artères, dit-il, se dilatent au dessus des muscles, parce que la forte contraction du muscle empêchant le sang d'y entrer, cette résistance force le tronc de l'artère à se dilater, & si cela se répète souvent, la dilatation symétrique du système artériel se déränge, les artères acquièrent une disposition anévrismatique dans quelques endroits & leur contraction devenant par-là plus foible, il peut en resulter plusieurs dérangemens singuliers (m). Cette remarque de Mr. BOERHAAVE rap-

(1) *De motu cordis & anevrismatibus.*
Propos. 53. p. 291.

(m) *De morbis Nervor.* p. 812.

pelle une observation, qu'il n'ignoroit pas sans doute, c'est celle d'une maladie terrible de nerfs, décrite par le Docteur J. B. GIRALDI dans une lettre au Dr. SBARACCA qui produisit un anevrisme du bas ventre (n). L'on voit aussi dans l'ouvrage de Mr. LANCISI que l'épileptique à qui un accès procura une gangrène à la main, mourut deux ans après d'un anevrisme ou d'une dilatation très considérable de la veine cave, de l'oreillette droite & du ventricule du même côté; cette maladie n'étoit-elle point comme celle du malade du Dr. GIRALDI une suite de l'épilepsie? Cet effet ne feroit pas difficile à comprendre.

§. 91. Outre tous ces désordres, il y en a encore d'un autre genre, ce sont ceux qui sont la suite des mouvemens violents que les muscles impriment aux os, & c'est à ce genre qu'appartiennent les morsures de la langue, les brisemens de dents, dont j'ai parlé plus haut, & les luxations qui ne sont malheureusement point si rares;

(n) MANGETI, *Bibliotheca Anatom.*
Tom. 1. p. 7.

J'ai vu un enfant de six semaines à qui un premier accès de convulsion luxa & déranga absolument le poignet qui resta vraisemblablement paralysé, car au bout de quatre jours, il étoit dans le marasme ; une seconde convulsion l'emporta le cinquième. De violentes convulsions occasionnées à l'âge de trois ans par l'éruption des grosses dents, laissèrent Mr. le Duc DU MAINE boiteux (o).

Les fractures des os sont un autre accident de la même espèce, & dont les Mémoires des Curieux de la Nature fournissent un exemple bien effrayant, c'est celui d'un enfant qui fut attaqué de l'épilepsie à l'âge de trois ans ; les accès devinrent toujours plus forts, & à l'âge de sept ans, ils furent tels que la force de la convulsion cassa l'os de l'épaule, celui de la cuisse à son col, & le tibia dans son milieu (p).

§. 92. L'on pourroit mettre pour quatrième ordre des suites que l'épi-

(o) *Souvenirs de Madame de CAULUS.*

P. 42.

(p) LIEUTAUD, *Anatomia.* Tom. 2.

P. 851.

lepsie occasionne les accidents qui sont produits par la chute contre des corps durs ou dans des endroits dangereux. Il arrive fréquemment que ces infortunés tombent sur leur tête, sur leur visage, & s'ils sont seuls se contusionnent, se déchirent, se font même des playes assez considérables ; quelquefois aussi ils tombent dans le feu, qu'on dit cependant qu'ils craignent aussi bien que l'eau, & qu'on feroit mieux de dire qu'ils doivent craindre, mais vers lesquels ils sont souvent entraînés, parce qu'en général ils sont frileux comme tous ceux chez qui le genre nerveux est foible ; & j'ai vu plusieurs malheureux qui s'étoient brûlés le visage, ou les mains, ou la poitrine ; mais je n'ai vu que le jeune homme dont j'ai parlé §. 58. qui se brula les fesses, qui ait été guéri par ce moyen. Il peut arriver qu'un épileptique saisi par son accès au bord de l'eau y soit précipité & s'y noye ; mais si jamais cela a eu lieu, cela est au moins rare je ne l'ai vu observé nulle part, & si l'on fait attention qu'il n'y a personne qui n'approche souvent le feu, & que la plus grande partie des hom-

mes ne se trouve jamais au bord de l'eau, on sera peu surpris de ce que l'un de ces élémens est souvent nuisible aux épileptiques, l'autre peut-être jamais ; il seroit cependant imprudent à eux de se tenir longtems au bord d'un courant ou sur un pont, l'aspect du cours de l'eau pourroit leur faire tourner la tête & déterminer un accès.

ARTICLE XVI.

Prognostic.

§. 93. Un article important dans toutes les maladies, c'est le prognostic ; celui de l'épilepsie a deux parties ; premièrement guérira-t'on ? En second lieu, si on ne guérit pas qu'est-ce qu'on a à craindre ?

Cette seconde partie est déjà remplie par tout ce que je viens de dire dans l'article précédent ; avoir développé les effets de l'épilepsie c'est avoir fait connoître ce qu'on a à en craindre si elle ne guérit pas, & je n'ajouterai qu'une remarque, c'est que ces suites funestes ne sont à craindre que pour ceux qui ont des accès fréquents

ou violents; j'ai vu des épileptiques chez qui les accès étoient rares & peu forts, & chez lesquels il étoit bien difficile de découvrir aucune altération sensible qui dépendit de cette cause; mais on doit craindre un épanchement ou sanguin ou fereux, & toutes leurs suites dans un accès très fort. Si les accès sont très rapprochés, ils laissent également le cerveau dans un affaïssement singulier. J'ai vu une femme dont les accès étoient fort courts, mais qui en avoit eu vingt-cinq dans une nuit, elle resta pendant deux jours dans une léthargie, dont on craignoit de ne pouvoir pas la tirer.

§. 94. La premiere partie du pronostic n'admet presque aucune généralité, & doit varier pour chaque malade; ainsi tout ce qu'on peut faire, c'est de donner les principes qui servent à l'établir, en observant premièrement qu'on l'a fait en général trop facheux, ce qui vient vraisemblablement de deux causes, l'une c'est le préjugé ancien qui faisoit regarder cette maladie comme furnaceuse, l'autre c'est que comme on la traitoit mal, on la guérissioit peu ou point.

Il y a, sans doute, plusieurs épilepsies incurables, mais elles ne le sont pas toutes; j'en ai guéri un très grand nombre; plusieurs Médecins peuvent en dire autant, & je suis persuadé qu'on en guériroit bien davantage, si les Médecins n'étoient pas eux-mêmes trop imbus de ce préjugé, si plus d'espérance leur donnoit plus d'attention, & si en abandonnant trop tôt un malade, ils ne le reduisoient pas à la triste nécessité de se jeter entre les mains meurtrières des Charlatans qui osent tout, & essayant les remèdes les plus violents en guérissent quelquefois un sur un grand nombre, & en jettent la plus grande partie dans un état fâcheux. J'ai sous les yeux un mémoire pour une fille de vingt-sept ans, attaquée d'un accès il y a cinq ans sans autre cause apparente qu'assez d'irrégularité dans les règles, qui la première année eut sept accès, la seconde treize, sans qu'on lui eut rien fait qu'une saignée du pied, deux purgations & quelques bouillons rafraichissans; après le vingtième accès, on consulta un autre Médecin qui lui ordonna pour tout remède, sans régime, des pilules antihistériques,

elle les prit pendant six mois sans succès ; elle consulta un empirique qui par un remède violent que je soupçonne être la poudre d'Algarot, la fit vomir avec des efforts dans lesquels elle faillit à rester , elle eut une salivation énorme qui lui a fait perdre plusieurs dents & lui a laissé la bouche en très mauvais état ; ses digestions ne se font plus, sa santé est ruinée & ses accès sont plus forts & plus fréquents. Si le Médecin avoit donné plus d'attention à son état , s'il en avoit mieux recherché toutes les indications , si en lui ôtant sitôt l'espérance, il ne l'avoit pas conduite à sa perte , je suis persuadé qu'il auroit pu la rétablir entièrement, & j'espère que fixer davantage l'attention des Médecins sur tous les détails de cette maladie, dont j'ai été si souvent occupé, ce fera rendre un vrai service aux malades qui ont le malheur d'en être atteints.

§. 95. HIPPOCRATES nous a laissé deux aphorismes sur le présage de l'épilepsie, „ Ceux qui en sont atte-
„ qués, dit-il, avant l'âge de puber-
„ té, guérissent, mais ceux qui n'en
„ sont atteints qu'après l'âge de vingt-

„ cinq ans le font jusques à la mort (q);
 „ & ailleurs, les jeunes gens attaqués
 „ de l'épilepsie guérissent principale-
 „ ment par le changement d'âge, de
 „ pays & de façon de vivre (r)”.
 Dans un autre endroit, il détaille un
 peu davantage ce prognostic, „ L'on
 „ a beaucoup de peine, dit-il, à guérir
 „ les épileptiques qui portent leur
 „ maladie dès l'enfance & chez qui
 „ elle s'est foutenuë jusques à l'âge
 „ viril, ou ceux chez qui elle s'est ma-
 „ nifestée dans l'âge viril, c'est-à-dire
 „ depuis l'âge de vingt-cinq ans jus-
 „ ques à quarante-cinq ans (s)”.

CELSE a adopté ici, comme ail-
 leurs, les prognostics d'HIPP O-
 CRATES. ALEXANDRE la re-
 garde comme incurable, quand on ne la
 traite pas dès les commencemens. A RE-
 TÉE avoit aussi établi avant ALE-
 XANDRE, qu'en général elle est très
 grave, & il dit que quand elle cesse spon-
 tanément, par le changement d'âge,
 elle laisse de tristes suites, & *envieus-
 ses de la beauté*, c'est son expression;

(q) Lib. 5. Aph. 7.

(r) Aphorism. 45. Lib. 2.

(s) *Prædiction*, L. 2. N°. 16.

elle laisse difformes les jeunes gens qu'elle quitte en détruisant quelques sens, en laissant quelque impression désagréable sur le visage ou en rendant quelque membre inutile; mais ce prognostic qui regarde plutôt les suites de la maladie que l'espérance de la guérison, est trop sévère, & l'on voit souvent des jeunes gens guérir sans aucune suite fâcheuse. Les plus habiles Médecins modernes n'ont rien dit de plus que ce que l'on trouve dans SENNERT qui avoit recueilli avec soin ce qu'on avoit écrit avant lui, & que l'on peut réduire aux articles suivans :

1°. Toute épilepsie est une maladie longue & dangereuse, mais elles ne le sont pas toutes également.

2°. Quand elle est héréditaire elle ne guérit jamais ou au moins très rarement.

3°. Elle guérit d'autant plus aisément qu'on la laisse moins invéterer; c'est le prognostic d'ALEXANDRE.

4°. Elle est d'autant plus dangereuse que les convulsions sont plus violentes, la lésion des fonctions plus considérable, & l'accès plus long. L'évacuation des excréments est fâcheuse; la liberté de la respiration d'un bon

augure. Il ajoute qu'elle est plus aisée à guérir, quand les paroxismes sont courts & fréquents que quand ils sont longs & rares, mais cela n'est point vrai dans tous les cas. Il rapporte ensuite les prognostics d'HIPPOCRATES & d'ARETÉE que j'ai déjà cités.

5°. Les enfans qui en sont atteints peu après leur naissance, échappent rarement.

6°. Elle se guérit très difficilement chez les vieillards & les décrepits. Je crois cet aphorisme idéalement vrai; mais les occasions de le vérifier sont très rares, j'en reparlerai plus bas.

7°. Une femme enceinte atteinte d'épilepsie court un très grand danger; c'est encore un aphorisme d'HIPPOCRATES que l'expérience ne vérifie pas toujours, & en général, le prognostic de cette maladie tient à des détails que je n'ai encore trouvé nulle part, & dans lesquels il me paroît important d'entrer.

§. 96. L'on a vu dans le prognostic général des maux de nerfs les raisons qui rendoient toutes leurs maladies difficiles à guérir, & l'on sent que l'épilepsie en général doit l'être plus qu'u-

ne autre, elle est une des plus graves; mais la croire incurable c'est ignorer les ressources de la nature & de l'art.

J'ai dit plus haut §. 9. que je regardois l'existence des épilepsies héréditaires ou connées comme fort douteuse; ainsi je n'en ferai point le pronostic; si elles existent, je suis porté à les croire incurables; la difficulté avec laquelle on détruit les vices de nerfs acquis, paroît devoir se changer en impossibilité pour les connés; mais en supposant les épilepsies héréditaires, il seroit sans doute impossible de les caractériser; tant de causes peuvent produire cette maladie dès les premiers moments de la naissance qu'on pourroit toujours les présumer accidentelles. Il n'y auroit qu'un caractère pour les épilepsies connées, ce seroit des accès dans le sein même de la mere; s'ils existoient, la mere ne pourroit pas les ignorer, & je ne doute point qu'un accès fort, ne rompit l'uterus; il ne faut pour s'en convaincre qu'avoir essayé quelquefois de résister aux membres convulsés d'un enfant dans les premiers jours de sa vie. Les épilepsies connées, si elles existent, sont héréditaires.

ditaires , quand le pere ou la mere étoient épileptiques.

§. 92. Les épilepsies qui naissent dès la premiere enfance & qui continuent doivent être & sont très opiniâtres ; ce sont peut-être les seules dont on n'a pas aggravé le prognostic ; je crois même qu'on l'a fait trop favorable en supposant qu'elles se dissipent quelquefois à l'âge de puberté spontanément ; je ne l'ai pas vu , ce que j'ai vu ne me permet pas même de le croire avec confiance , & je crains que ce ne soit un prognostic fondé sur une théorie générale plutôt que sur des observations particulières.

Les petits enfans sont très souvent attaqués de convulsions , mais très souvent on les en guérit par des remèdes assez simples. J'ai indiqué les principales causes de ces convulsions d'enfance dans l'Avis au Peuple ; quand elles ne dépendent pas de quelqu'une de ces causes particulières aux enfans , ou qu'elles ne sont pas l'effet de quelque'autre maladie de leur âge , mais bien celui de quelque'autre cause qui échappe , & que la disposition épileptique est très forte , si l'on n'y appor-

te pas un prompt remède, les accès deviennent plus fréquents, les facultés intellectuelles souffrent, la santé même se déränge, ces enfans tombent souvent dans l'imbécillité, la consomption, la plus grande foiblesse, quelquefois la noueure, & périssent la plupart avant même que d'atteindre l'âge de puberté; s'ils y parviennent, cette époque les tue & ne les guérit pas. Cette fausse idée que la maladie se dissipera à sept ou à quatorze ans, fait qu'on attend ces époques sans rien faire, & quand on souhaite du secours, il est trop tard pour en recevoir. Il n'y a pas un mois qu'on m'a amené un enfant de onze ans, qui avoit l'air cadavereux & dont les parents vantoient beaucoup l'intelligence, mais qui me parut ne comprendre bien distinctement aucune des questions que je lui fis, & qui articuloit si mal, quoiqu'il eut parlé nettement jusques à l'âge de sept ou huit ans, què je ne pus comprendre aucune de ses réponses. Toute la tendresse de son pere & de sa mere qui tachoient de nous servir de truchement avoit beaucoup de peine à masquer son imbécillité qui se peignoit

sur sa physionomie, dans ses attitudes & dans ses gestes. Je leur donnai quelques conseils pour ne pas leur paroître cruel ; mais je suis persuadé que cet enfant n'a pas six mois à vivre, & généralement les épileptiques d'enfance, qui ont passé dix ans avec leur maladie, sont presque toujours non seulement incurables, mais même mortellement malades ; en fera-t-on surpris, si l'on se rappelle ce que j'ai dit de la grande influence que les nerfs ont sur la nutrition qui souffre nécessairement, quand ils sont gravement attaqués ; & si l'on fait attention que la nutrition étant lésée dès l'enfance, entraîne nécessairement un dépérissement général ; j'ai cité plus haut l'observation d'une jeune fille qui avoit été très bien faite jusques à l'âge de huit ans, & que l'épilepsie défigura totalement.

§. 98. Quand cette maladie attaque depuis l'âge de quatre ou cinq ans jusques à celui de dix ou douze, si l'on s'en occupe à tems, si on lui donne des soins, elle guérit ; j'ai vu beaucoup d'enfans de cet âge, que la frayeur, les mauvais traitemens reçus dans les écoles par des Régents

plus faits pour être muletiers que Précepteurs , ou d'autres causes avoient rendu épileptiques & plusieurs ont été parfaitement guéris ; j'en ai perdu de vûe un plus grand nombre.

§. 99. Souvent on est attaqué d'épilepsie à l'âge de douze ou treize ans, quelquefois sans cause apparente, d'autre fois pour la plus légère cause ; ces épilepsies & cette disposition épileptique à cette époque sont souvent l'effet de la crise dans laquelle la machine se trouve ; elle est dans un état d'épuisement & de sensibilité qui dure pendant cette période, & finit quelquefois avec elle ; & c'est sans doute cette espèce qui, observée à demi, a fait dire trop généralement que la puberté guérissoit les épilepsies, mais j'ose dire qu'elle ne guérit que celle qu'elle a produit , elle ne les guérit même pas toutes ; j'ai vu des malades chez qui cette maladie avoit commencé à cette époque, chez qui elle paroissoit en être la suite & chez qui elle subsistoit dans l'âge viril ; il est vrai que cette continuation est quelquefois l'effet des remèdes mal administrés.

§. 100. Il y a une remarque particulière

culière à faire par rapport au sexe, & il est important de ne pas la négliger; elle est souvent l'objet des Consultes les plus délicates. L'on a quelques observations de jeunes personnes guéries de l'épilepsie par le mariage; on en trouve deux exemples dans les Mémoires des Curieux de la nature (t), & quelques Médecins fondés sur ces observations particulières font trop portés à dire que le mariage guérit cette maladie, comme on le dit trop souvent pour tous les maux des jeunes personnes; c'est se jouer du bonheur des intéressés, & l'événement ne justifie la promesse que quand le mal vient ou d'une suppression des règles que le mariage établit, ou de la difficulté de leur écoulement qu'il facilite, comme on la vu plus haut §. 27. ou d'un excès de temperament, cause bien plus rare qu'on ne le croit, auquel il remédie: dans toute autre circonstance le mariage augmente la disposition épileptique & la développe; j'ai déjà parlé d'une femme qui avoit eu de

(t) *Decur.* 1. Ann. 1. Obs. 86. & *Decur.* 3. Ann. 1. Obs. 12.

puis plusieurs années de légers mouvemens convulsifs dans le visage & dans la tête, avec un instant d'absence, quelques jours de mariage développèrent un véritable accès d'épilepsie, qui est devenue très forte ; ainsi il faut qu'un Médecin fasse beaucoup d'attention à ses présages sur cet article.

§. 101. J'ai vu quelques jeunes gens qui avoient été attaqués d'épilepsie environ l'âge de sept ou huit ans qui en avoient été parfaitement guéris au bout de peu de tems, & chez qui elle se reproduisoit à l'âge de quatorze ou quinze ans, mais je l'ai vue céder aisément. Quand elle se soutient dès l'enfance jusques au delà de la puberté, l'espérance diminue beaucoup ; mais pour ne l'a pas perdre tout-à-fait, il faut se rappeler le cas de LEONICENI, qu'on cite quand on veut parler de la plus belle vieillesse, & qui après avoir été épileptique dès le berceau, jusques à l'âge de trente ans, n'eut plus d'accès depuis lors, & devint presque centenaire sans aucune infirmité.

L'épilepsie chez les jeunes personnes qui n'ont pas encore été réglées,

& qui sont en âge de l'être ne se guérit point avant que les règles ayent paru ; chez celles qui ayant déjà eu leurs règles éprouvent une suppression, l'épilepsie, soit qu'elle soit l'effet de ce dérangement, soit qu'elle en soit indépendante ne se guérit point pendant que la suppression dure, mais ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, le rétablissement des règles n'opère pas toujours la guérison de l'épilepsie ; c'est un obstacle enlevé, mais l'ouvrage n'est pas fait.

§. 102. L'épilepsie qui attaque depuis qu'on est sorti de l'âge de puberté, n'est pas plus incurable qu'une autre, malgré l'Aphorisme d'HIPPOCRATE ; son pronostic ne varie que suivant les circonstances qui l'accompagnent & qui seront l'objet d'un autre paragraphe.

§. 103. J'ai déjà dit qu'il étoit fort rare que l'épilepsie attaqua les vieillards, & l'observation de Mr. MORGAGNI qui a vu un homme de soixante-huit ans attaqué de ce mal pour la première fois, est la seule de cette espèce que je me rappelle d'avoir lû ; je n'avois vu jusques ici qu'une seule personne qui en eût été attequée au

dessus de l'âge de soixante , elle l'a conservée jusques à sa mort arrivée sept ans après par une maladie putride dans laquelle je la vis ; & il y a quelques semaines que j'ai été consulté pour la femme d'un jardinier , âgée de soixante-trois ans qui , il y a deux ans , en fut attaquée pendant la nuit d'un jour très chaud ; depuis lors elle a eu dix-huit ou vingt accès , mais qui tous hors un seul , l'ont saisie la nuit , ils durent un quart d'heure ; elle paroît prête à étouffer , & après qu'il est fini , elle reste pendant quelques heures sans mémoire , & presque sans connoissance.

§. 104. Quand l'épilepsie subsiste dès la jeunesse , & ne se guérit pas , elle ne laisse point parvenir à une grande vieillesse , elle dégénère en apoplexie , & tue promptement , ou bien , comme on l'a vu dans l'article précédent , la lésion du genre nerveux jetant toutes les fonctions dans la langueur les malades périssent de quelque maladie chronique.

§. 105. Indépendamment de l'âge , il y a d'autres circonstances qui varient le pronostic de l'épilepsie.

La sympathique est en général bien plus aisée à guérir que l'idiopathique, & on peut dire qu'elle l'est toutes les fois que la cause qui la produit n'est pas incurable, ou que la partie qui en est le siège peut être emportée sans danger ; à moins cependant qu'elle ne dura depuis bien longtems, parce qu'alors il est à craindre que le cerveau n'ait acquis par l'habitude une forte disposition épileptique, & que lors même que la cause principale sera détruite, d'autres causes bien moins considérables ne la reproduisent.

L'épilepsie dont les accès sont très violents fait craindre que le malade ne succombe & ne périsse dans l'accès. Quand ils sont forts & rapprochés, on peut également craindre que l'organisation ne soit très viciée, & que le patient ne soit prêt à tomber dans la langueur.

Celle dont les accès ne sont produits que par une seule cause accidentelle, ou au moins par une cause accidentelle forte, est d'un plus heureux augure que celle qui se reproduit pour des causes si légères qu'elles échappent & qu'il est presque toujours impossible

de les assigner ; cette grande facilité à se reproduire , prouve une grande convulsibilité dans le cerveau & laisse peu d'espérance de la détruire.

La colère produit quelquefois des accès d'épilepsie , mais qui n'ont souvent aucune suite ; je n'ai même pas vu d'exemple de quelqu'un qui fut resté épileptique après la colère , excepté la femme en couche dont j'ai parlé plus haut ; mais quand cette maladie est l'effet de la peur elle est beaucoup plus à craindre & laisse bien moins d'espérance.

Quand les chagrins produisent l'épilepsie , c'est à la longue en détruisant le genre nerveux plutôt que brusquement , & elle est très fâcheuse , parce qu'elle est la suite d'un déperissement général.

Le fond du tempéramment qui a plus ou moins de ressource , l'état de la santé , les circonstances agréables ou tristes dans lesquelles on se trouve , l'air qu'on habite , le genre de vie qu'on mène , les remèdes qu'on a déjà employé , leurs effets , sont encore autant de circonstances qu'un Médecin doit peser & combiner entr'elles

avant que de donner un pronostic. Enfin il ne faut point se dissimuler qu'il reste toujours incertain à un certain point, & il n'y a qu'un charlatan ou un fourbe, qui puisse promettre une guérison complète & radicale avec cette confiance, avec laquelle on promet celle de beaucoup d'autres maladies ; parce que nous n'avons aucun signe certain pour apprécier à quel point le cerveau est endommagé & susceptible de rétablissement. Il est tems de m'occuper des moyens qui peuvent le procurer.

ARTICLE XVII.

Idee générale du traitement.

§. 106. En se rappelant ce que j'ai dit plus haut, des causes qui produisoient l'épilepsie ; on verra que je les ai partagées en cause proëgumene, ou disposition épileptique, convulsibilité du cerveau ; en causes occasionnelles ; & en causes accidentelles qui déterminent l'action de la cause proëgumene, ou des causes occasionnelles.

Pour guérir l'épilepsie, il faut,

1°. connoître exactement quelles sont les causes occasionnelles, pour les détruire ; quelles sont les causes accidentelles, dont l'influence est la plus marquée, pour les prévenir ; & enfin dissiper la cause proëgumene, en rendant au cerveau toute sa force & en changeant ce principe de convulsibilité, dont l'acte est un accès d'épilepsie : j'ai divisé les causes occasionnelles en sympathiques & en idiopathiques.

§. 107. Les causes sympathiques ont leur siège, ou dans les organes intérieurs, ou dans les parties externes ; les premières, observées jusques à présent, sont, pour continuer l'ordre que j'ai suivi plus haut, 1°. dans l'estomac ; 2°. dans les intestins ; 3°. dans le foye & la vésicule ; 4°. dans la rate ; 5°. dans les reins ; 6°. dans la vessie ; 7°. dans les organes de la génération, & 8°. dans la poitrine.

Les externes sont placées, 9°. au sommet de la tête ; 10°. à la lèvre supérieure ; 11°. au sein ; 12°. à l'épaule ; 13°. au bras & aux doigts de la main ; 14°. à l'aîne, à la cuisse & à la jambe ; 15°. aux différentes parties du pied.

§. 108. Les idiopathiques se partagent en deux classes; ou celles qui sont fixes dans la tête, ou celles qui agissent en irritant d'abord le cerveau même. Les premières, sont, 1°. les différents accidents de Chirurgie qui ont endommagé le cerveau, comme playes, fractures, contusions; 2°. les caries & les abcès du crâne; 3°. les intropressions de la table interne; 4°. la corruption & l'ulcération de la dure mere; 5°. les ossifications des membranes du cerveau; 6°. l'humeur gélatineuse & grasseuse qui s'épanche quelquefois dans les cavités, ou autour de ce viscère; 7°. la serosité qui inonde quelquefois toutes ces parties, 8°. les hydatides & les abcès qui s'y forment; 9°. le ramollissement du cerveau; 10°. ses scirres ou callosités; 11°. les tumeurs charnues qu'on y a trouvé.

Les secondes, sont, 12°. la plethore, soit qu'elle se forme peu à peu par un excès de nutrition, soit qu'elle soit l'effet de la suppression de quelqu'évacuation ordinaire, soit que par un vice de configuration, il y ait une plethore particulière du cerveau; 13°. la

plethore occasionnée par le vin ; 14°. l'âcreté des humeurs, qui dépend elle-même d'une grande variété de causes qu'il est inutile de rapeller ici.

Les causes accidentelles se rangent sous trois classes. 1°. Les passions. 2°. Tout ce qui peut augmenter la quantité ou le mouvement du sang. 3°. Tout ce qui peut irriter le genre nerveux, & l'on a vu que cette classe se subdivise en plusieurs genres.

§. 109. Avant que d'aller plus loin, il ne sera peut-être pas inutile de s'arrêter un instant sur cette division des causes, dont quelques-unes paroissent rentrer dans d'autres ; ce qui pourroit laisser chez quelques personnes une idée confuse, que je souhaite de prévenir, quoique pour cela, il faille répéter ce que j'ai déjà dit. L'épilepsie dépend de deux causes ; la prédisposante, qui est un vice inhérent aux nerfs dans leur origine & qui ne tombe pas sous nos sens ; & la déterminante, c'est-à-dire, celle dont l'action met en jeu la première & qui se divise en sympathique & en idiopathique : j'espère qu'on a compris cette division ; je la rendrai cependant encore

plus sensible par un exemple. Je vois un homme qui a une attaque d'épilepsie, j'en conclus que la cause prédisposante de cette maladie existe chez lui, & cette conclusion est bien sûre, puisque je conclus de l'effet à la cause; mais une demi heure après, cet homme se porte à merveille, il est fort bien pendant six mois, quoique la disposition de son cerveau soit toujours la même; j'en conclus avec raison qu'il y a quelque'autre cause qui excite cette première: un examen attentif me découvre que cette cause git dans l'estomac, dans les intestins, dans la vessie, dans l'utérus, au sein, au pied &c. où il y a des vices permanents qui forment un foyer d'irritation qui se répandant par les nerfs, détermine l'accès quand il est porté au cerveau; c'est ce vice que l'on appelle cause déterminante, ou occasionnelle; mais ce vice existe continuellement dans plusieurs cas & cependant l'épilepsie n'est pas continuelle, elle a de longs silences; il y a donc des tems où ce second ordre de causes n'agit pas, il faut par conséquent qu'il y en ait d'autres qui déterminent son action; c'est celles que j'ai

apellé causes accidentelles, qui sont aux occasionnelles ou déterminantes, ce que celles-ci sont à la prédisposante ou première. Mais ce qu'il est important de remarquer, pour éviter tout embarras, c'est que ces causes du troisième ordre que je viens de ranger sous trois classes, les passions, la plethore, l'âcreté, sont souvent tout à la fois cause déterminante & cause accidentelle; il n'y a pas toujours, comme on l'a vu, une cause organique fixée dans quelques parties; mais les causes que je viens d'indiquer agissent sur le cerveau même. Il y a tel malade qui n'a aucun vice dans le cerveau que sa convulsibilité, & elle n'est jamais mise en jeu que par la plethore; ici la plethore est cause occasionnelle, & les causes qui la varient sont les causes accidentelles. Chez un autre, le cerveau est comprimé par une tumeur, le malade est cependant souvent sans accès & n'en auroit jamais sans cette tumeur; mais elle fait que dès que les vaisseaux sont un peu plus tendus, il tombe dans des accès; dans ce cas la tumeur est cause déterminante ou occasionnelle; la plethore n'est que cause accidentelle. Ces

éclairciffemens & ces exemples fuffiront, j'efpère, pour enlever tout ce qu'on auroit pû trouver d'embarraffant dans cet article des caufes.

Il en eft des paffions & des humeurs âcres, comme de la plethore ; elles font fouvent caufes déterminantes & caufes accidentelles ; on a même vu que les fortes paffions produifent fouvent la caufe prédifpofante, on pourroit alors les appeller caufes créatrices.

§. 110. Guérir toutes ces caufes occafionnelles, prévenir les accidentelles ; changer la difpofition épileptique du cerveau, c'eft guérir l'épilepfie ; mais l'on fent d'abord :

1°. Que cela eft toujours très délicat, & demande beaucoup d'attention, fouvent difficile, quelquefois impoffible.

2°. Que le traitement de l'épilepfie demande par-là même d'être varié fuivant les caufes, & qu'ainfi annoncer un fpécifique général pour fa guérifon en général eft une charlatanerie, qui prouve l'ignorance ou la fourberie. S'il peut y avoir un fpécifique, ce feroit uniquement pour la difpofition épileptique du cerveau, la caufe proëgumée.

ne; mais cette même cause peut être combinée avec des circonstances différentes, qui elles-mêmes exigent des attentions particulières & mettroient obstacle à l'emploi d'un même remède; on en verra des exemples dans la suite de ce Chapitre.

3°. Que si l'on guérit peu l'épilepsie, c'est manque de faire attention à la variété de ses causes, & que si quelquefois les remèdes les plus vantés & peut-être les meilleurs réussissent mal, c'est parce qu'on ne fait point attention aux circonstances accompagnantes, qui en troublent l'usage & en pervertissent l'effet.

L'on trouve dans GUY PATIN, un morceau relatif au traitement de cette maladie, qui mérite bien d'être rapporté ici.

„ Je crois, dit-il, qu'il n'y a au-
 „ cun remède antiépileptique; ceux
 „ que CROLLIUS & la nation des
 „ Chimistes vantent pour tels, sont
 „ des fictions & de pures fables; je
 „ n'en excepte ni le guy de chêne, ni
 „ le pied d'élan, ni la racine de pi-
 „ voine, ni autres semblables bagatel-
 „ les. La guérison d'une si grande ma-

„ ladie dépend d'un exact régime de
 „ vivre , avec l'abstinence des fem-
 „ mes , du vin , de tous aliments
 „ chauds & vaporeux... il faut aussi
 „ quelquefois faire sortir du pus qui
 „ est dans le méfentère , le poulmon ,
 „ la partie cave du foye ou l'uterus ,
 „ & les paroximes ne cessent jufques
 „ à ce qu'une telle humeur foit dé-
 „ hors (y).

ARTICLE XVIII.

*Traitement des épilepsies sympathiques ;
 qui ont leur fiége dans les parties
 internes.*

§. III. L'on a vu plus haut quels
 symptomes avoient fait juger à GA-
 LIEN, que la cause de l'épilepsie du
 jeune Grammairien étoit dans l'esto-
 mac; il dirigea sa cure en conséquence
 & guérit le malade; les remèdes qu'il
 employa ne furent que de l'aloës, qui
purge & fortifie, & il fut si bien réta-
 bli, que pendant vingt ans il jouit de
 la plus parfaite santé (z). ZACU-

(y) Lettre 320. Tom. 2. p. 665.

(z) De Loc. affecl. L. 5. Ch. 7. CHART.
 T. 7. p. 493.

TUS LUSITANUS, dont j'ai déjà indiqué l'observation, sans la rapporter, ne guérit son malade qu'en l'évacuant. Les grouillements dans le ventre, les nausées, les crachats visqueux & ensuite les vertiges, qui précédoient toujours l'accès, lui prouvèrent que le mal avoit son siège dans l'estomac; il lui fit prendre tous les jours, pendant un assez longtems, un vomitif fort doux, composé de quatre onces de décoction de tabac sec, dont il ne détermine point la quantité, & d'une once d'huile d'amandes douces, ce qui lui faisoit vomir beaucoup d'une pituite visqueuse & lui procuroit deux ou trois selles. L'on a aujourd'hui des moyens plus sûrs de faire vomir; mais cette observation prouve au moins la nécessité d'employer ce remède dans quelques cas d'épilepsie, & cette nécessité est confirmée par d'autres faits. Le même Auteur, quelques observations au-dessous de celle que je viens de rapporter, cite celle d'un porte faix, attaqué d'une épilepsie très violente, qui commençoit par des contorsions des mains, suivies d'un mouvement désordonné dans la langue, un vio-

lent mal de tête, le visage pâle, l'imagination égarée, un mouvement de rotation dans la tête, un obscurcissement dans la vue; enfin il tomboit rudement avec une perte entière de connoissance, des convulsions si violentes & la continuation du mouvement de rotation si fort dans la tête, qu'on l'auroit dit possédé du démon; le mal revenoit trois ou quatre fois par mois; il essaya tous les remèdes pendant plusieurs années; tous furent inutiles; enfin il fut guéri en prenant quatre fois une préparation de vin stibié, qui lui fit rendre une immense quantité de pituite & de bile (a).

PURARI guérit un homme, âgé de vingt-cinq ans, épileptique depuis un an, en lui donnant, en trois doses, six cuillerées d'huile de baleine; ce qui lui fit rendre une prodigieuse quantité de glaires & de bile jaune & verte, & le guérit (b).

§. 112. Les émétiques entremêlés avec les purgatifs, & dans l'entre-deux des huileux, réussirent très bien

(a) Obs. 28.

(b) BURNET *Thesaurus Medicin. pract.*
Tom. I. p. 462.

au chirurgien épileptique, dont parle WOODWART; & Mrs. VAN SWIETEN & DE HAEN, ont guéri, par le même remède, deux malades dont les observations sont instructives. “J’ai vu, dit le premier, un
„ jeune homme épileptique, chez qui
„ l’accès étoit toujours précédé par
„ un tremblement de la lèvre inférieure,
„ re, (mouvement qui précède souvent le vomissement), il tomboit
„ bientôt, & s’il pouvoit vomir pendant l’accès, il étoit promptement
„ fini. L’accès revenant tous les mois,
„ environ le tems de la pleine lune;
„ je lui donnai pendant six mois un
„ émétique doux, trois jours avant
„ celui de la pleine lune, & le soir
„ même un léger anodin, les autres
„ jours il prenoit des remèdes fortifiants,
„ & au bout de ce terme il fut
„ parfaitement guéri (c).

La seconde observation, rapportée par Mr. de HAEN, est assez analogue.
„ Il est de la plus grande utilité, dit
„ cet habile Médecin, d’observer attentivement les symptômes qui pré-

(c) *Aphorism.* 1080. T. 3. p. 439.

„ cèdent l'accès , puisque l'expérien-
 „ ce a appris que si l'on pouvoit les
 „ prévenir , on prévenoit en même
 „ tems l'accès : j'en citerai un exem-
 „ ple entre plusieurs autres. Une épi-
 „ lepsie , qui depuis plusieurs années
 „ avoit résisté à tout , se caractérisa
 „ enfin par des nausées avant , & de
 „ violents vomissemens pendant l'ac-
 „ cès. Nous nous serions aisément
 „ déterminé Mr. VAN SWIETEN
 „ & moi , à donner l'émétique avant
 „ l'accès , & ensuite un anodin , si la
 „ grosseur de la malade n'avoit pas
 „ été un obstacle ; considérant cepen-
 „ dant ensuite , que , la mere & le
 „ fœtus auroient moins à souffrir de
 „ l'action du vomitif que d'un accès ,
 „ nous le donnâmes , nous le réitéra-
 „ mes & cela avec un tel succès , qu'el-
 „ le n'a eu aucun accès pendant dix
 „ ans ; elle sentoit il est vrai de tems
 „ en tems les pressentimens d'un ac-
 „ cès , mais soixante gouttes d'un mê-
 „ lange de parties égales d'esprit de
 „ sel ammoniac , de teinture de cas-
 „ tor , de succin & d'asa fœtida , l'ar-
 „ rêtoient d'abord : enfin au bout de
 „ dix ans , accablée par des chagrins cui-

„ fants, l'épilepsie revint & la tua (d). J'ai vu un jeune garçon de huit ans, qui eut plusieurs accès d'épilepsie, auxquels on ne put assigner aucune cause sensible, & auquel on donna pendant cinq mois plusieurs remèdes anti-épileptiques, sur-tout beaucoup de kina, de racine de pivoine & de camphre, sans aucun succès. Quand on me l'amena, sa pâleur, sa maigreur, son peu d'appetit, une diarrhée assez fréquente, un poids presque continuel au creux de l'estomac, me persuadèrent que ce viscère étoit le siège du mal; je lui ordonnai de l'hypécacuaana qui le fit beaucoup vomir; & ensuite du kermes mineral pendant une quinzaine de jours qui le fit encore vomir quelquefois & dont l'usage l'a guéri radicalement. Dans plusieurs autres cas, quoique je n'aye pas pu attribuer la guérison uniquement à l'émétique, je suis convaincu que je n'aurois point guéri sans ce remède; je suis même persuadé que c'est en le négligeant trop, que de grands Méde-

(d) *Ratio Medend.* Pars. 5ma. Cap. 4.
§. 1.

cins échouent, & c'est à son usage, que la plupart des Charlatans doivent le petit nombre des cures qu'ils ont opéré; mais l'ignorance avec laquelle ils l'employent presque tous, indistinctement dans tous les cas, fait qu'ils aggravent le mal infiniment plus souvent qu'ils ne le guérissent, parce que le nombre des épilepsies dans lesquelles l'émétique nuit est infiniment plus grand que celui de celles auxquelles il convient. On trouve là-dessus de plus grands détails à l'article général de l'émétique, dans les maux de nerfs.

J'ajouterai une remarque; fondée sur plusieurs observations; c'est qu'il n'est pas toujours aisé de découvrir que le siège de l'épilepsie est dans l'estomac; ce n'est quelquefois qu'après un bien long examen & une suite exacte d'observations sur ce qui nuit, ou qui est utile, qu'on peut parvenir à s'en assurer, & ce n'est qu'alors qu'on peut se flater de travailler avec quelques succès à sa guérison.

J'ai vu plusieurs épileptiques avoir un appetit prodigieux, presque vorace; chez les uns c'étoit l'effet d'une humeur acide qui irritoit l'estomac,

& la simple panacée leur faisoit beaucoup de bien, elle modéroit cet appetit, éloignoit les accès, les rendoit moins violents; chez d'autres, cette faim me paroissoit tenir à une espèce d'acreté dans les esprits animaux, qu'on ne peut pas dire acide, puisque les absorbants ne la diminuent pas, mais que j'ai trouvé chez quelques fous qui sont presqu'insatiables. Les aqueux, les huileux même, conviennent bien mieux dans cette espèce que les absorbants.

§. 113. Quand la cause du mal est dans les intestins, ou dans le mésentère, ce qu'on connoit aux signes qui caractérisent les embarras de ces parties & que j'ai rapporté, §. 20 & 21, en parlant de cette cause d'épilepsie, la vraie méthode c'est de réitérer les purgatifs: je purge tous les huit ou tous les quinze jours, tous les mois, ou plus rarement encore, suivant que les accès sont plus ou moins fréquents; je fais éviter en même tems, dans le régime, tout ce qui peut augmenter les embarras & les obstructions, surtout le salé, les graisses & les laitages; cette attention est de la plus grande

importance, & je fais prendre quelquefois dans les jours intermédiaires, car cela ne me paroît pas toujours nécessaire, quelques autres remèdes dont le choix est déterminé par les circonstances accompagnantes, quelquefois la magnésie blanche, d'autrefois des sels neutres, souvent des pillules avec les extraits savoneux & amers, des pillules gomeuses, le kermes mineral, d'autres fois, comme je l'ai déjà dit, rien du tout que les purgatifs qui suffisent souvent, ils soultraient la cause de l'irritation; & les nerfs, n'étant plus irrités, se fortifient.

Je me fers assez ordinairement de la poudre cornachine, qui réussit très bien dans ce cas; les sels neutres, la rhubarbe, le fenné, le jalap, sont aussi très utiles; mais la manne, la casse, les tamarins, ne sont que bien peu efficaces.

Il y a cinq ans qu'on m'amena une jeune fille, d'onze ans, qui, depuis dix mois, avoit eu six accès très forts, que je ne pus attribuer qu'à la saburre des premières voyes: je la purgeai avec de la poudre cornachine, que je réitérai huit jours après & que je fis

réitérer toutes les six semaines pendant un an, sans rien faire d'autre ; elle n'a eu dès lors aucun ressentiment du mal. Le même purgatif, réitéré six fois, une fois tous les mois, a guéri radicalement, il y a deux ans, une jeune fille de neuf ans.

§. 114. C'est dans les épilepsies stomachiques & dans celles-ci, que les eaux minérales chaudes réussissent quelquefois si bien, en fondant les glaires, en désobstruant, en évacuant & en purgeant. Je me suis servi avec le plus grand succès de celles de Balaruc, mais à doses modérées, de façon qu'elles ne procurent que trois ou quatre selles par jour dans les commencemens, & moins sur la fin ; données ainsi à petites doses, elles fortifient extrêmement l'estomac, les intestins, le mésentère & tous les organes sécrétoires du bas ventre ; mais que leurs succès dans cette espèce n'autorisent point à les employer dans d'autres, elles pourroient devenir funestes ; on a vu des exemples de leur danger dans le Chapitre des convulsions.

§. 115. Quand outre les embarras, les obstructions, la cacochilie, on trouve
beaucoup

beaucoup d'atonie & de foiblesse, il faut nécessairement donner des fortifiants, ou entre les purgatifs, ou quand on les a abandonnés, & la limaille de fer est un de ceux qui m'a le mieux réussi, mais à petites doses; quand ce sont des adultes, les eaux martiales froides de *Schwalbach*, de *Spa*, de *Pyrmont*, &c. sont très indiquées & réussissent très bien.

§. 116. Si le mal est d'abord compliqué d'une grande mobilité du genre nerveux, ou si les purgatifs réitérés & les remèdes apéritifs paroissent la produire, on y remédieroit par l'usage des antispasmodiques, dont je parlerai plus bas; mais qui, s'ils ne sont pas précédés par les purgatifs, sont au moins inutiles, souvent nuisibles.

Dans cette espèce produite ou entretenue par le relachement, les simples délayants, les adoucissants, les bains tièdes, aggravent le mal & jettent les malades dans la cacochimie, quelquefois dans la bouffissure.

§. 117. Une bile acre qui irrite le duodenum & les premiers intestins, est souvent la cause de l'épilepsie, & il est important de bien distinguer cette

espèce; quand elle est connue, le simple usage habituel de la crème de tartre, celui du petit lait, un régime ascétique, l'emportent très souvent; si elle est accompagnée, comme cela arrive fréquemment, d'une secheresse générale, les bains tièdes deviennent de la plus grande utilité aussi bien que les boissons délayantes prises en assez grande quantité. J'ai vu plusieurs malades que j'ai guéris par la seule crème de tartre, & Mr. SIDENIER, Médecin de *Poligny*, m'a écrit qu'elle avoit remis deux épileptiques pour qui il m'avoit consulté & à qui je l'avois conseillée; je ne retrouve pas le Mémoire à consulter, & je ne m'en rappelle point assez nettement les circonstances pour les détailler, non plus que celles de l'état d'un gentil-homme Tirolais, atteint de la même maladie, à qui je conseillai le même remède, qui, à ce que m'a marqué son Médecin, célèbre Praticien dans cette Province, a eu le même succès. Le dernier malade à qui je l'ai conseillée avoit des rapports nidoreux presque continuellement & des urines toujours rouges & brulantes; ce fut ce qui me dé-

cida à employer la crème de tartre ; je lui en prescrivis un quart d'once , à jeun , de deux jours l'un , & le jour intermédiaire de l'esprit de vitriol dans de l'eau fraîche. Pendant les trois premiers mois de cet usage , les accès qui revenoient deux fois par semaine , ne sont revenus que deux fois dans ces trois mois. Je n'ai pas ouï reparler du malade depuis sept ou huit semaines.

§. 118. Quand les vers sont la cause du mal , comme on a vu plus haut que cela peut arriver , outre les purgatifs , il faut employer les vermifuges , & je me trouve très bien de la seule grenette , à laquelle j'ai quelquefois allié la racine de Valeriane , qui est elle-même un bon vermifuge & qui fit rendre des vers à la plupart des épileptiques à qui Mr. MARCHANT l'ordonna avec tant de succès. Quand la grenette [*semen contra*] échoue , on a recours à d'autres spécifiques ; l'on a vu plus haut , que Mr. HEISTER guérit une épilepsie vermineuse avec le kina & le mercure crud ; j'en ai guéri une avec la poudre cornachine & le mercure doux , & c'est souvent le cas d'ordonner les eaux chaudes

souffrées, moyenant que les circonstances n'y mettent point d'obstacles; celles de Balaruc sont aussi très efficaces, & j'ai même vu souvent que les eaux martiales froides faisoient rendre des vers; ce qui les indique dans ce cas. J'ai aussi ordonné avec succès l'eau de chaux, pour des convulsions que je jugeai vermineuses, mais qui n'étoient pas l'épilepsie.

§. 119. Quand une maladie de la vésicule du fiel, du foye, de la rate, est la cause de l'épilepsie, ce n'est qu'en guérissant la maladie cause, qu'on peut espérer de guérir la maladie effet: mais je suppose ici le traitement de ces maladies connu, il n'est pas mon objet. Je dirai seulement que si on le perd de vue, pour s'occuper de l'épilepsie & ordonner des anti-épileptiques, il est rare qu'on ne nuise pas; ils ne conviennent point aux maladies principales, & quand elles sont terminées, ils sont souvent superflus, parce que les accès finissent avec la maladie qui les a entretenus.

§. 120. Ce que je viens de dire des maladies du foye & de la rate, s'applique également à l'épilepsie, produite

par un vice dans les reins, & l'on a déjà vu, plus haut, l'observation d'un malade, que je crois guéri de cette dernière maladie, par les bains & l'eau de chaux que je lui conseillai, pour une disposition calculeuse.

§. 121. J'ai rangé sous trois classes les épilepsies produites par les organes de la génération. 1°. Celles qui dépendent d'un excès de tempérament & d'une grande continence. 2°. Celles qui sont la suite d'excès vénériens & d'un épuisement général. 3°. Celles qui dépendent de la grossesse, des couches, &c. Je me suis assez étendu sur les deux premières dans l'Onanisme, pour être dispensé de m'y arrêter à présent; je rappellerai seulement ici une observation que je tiens d'un ancien Médecin des armées Impériales; c'est que dans la guerre d'Italie, en 1734 & 35, les soldats allemands, jeunes & sages, transportés dans un pays où le climat, les aliments & les vins les échauffoient, y étoient fréquemment atteints de cette espèce d'épilepsie, à laquelle on doit opposer le régime le plus simple & le moins irritant; il faut vivre de légumes, de fruits, de lait,

ne boire que de l'eau , prendre dès bains tièdes , & se faire saigner si l'on est sanguin ; mais le mariage est le seul spécifique.

Quand la maladie dépend de l'épuisement vénérien , comme il est très souvent l'effet d'un épuisement porté à son comble , elle est assez ordinairement incurable & accompagne le malade jusqu'au tombeau. Le régime fortifiant , le kina , le fer , la racine de Valeriane , en font le vrai remède ; les bains froids , moyenant que le malade conserve encore quelques forces font aussi très efficaces. Il y a cependant un cas dans lequel il faut commencer la cure par des bains tièdes , c'est quand on trouve un dessèchement général , une peau chagrinée , une soif continuelle , une fréquence habituelle dans le pouls. Les toniques , dans cet état , si on les emploie d'abord & seuls , augmentent le mal & hâtent la fin du malade. J'ai guéri un jeune homme qui étoit dans ce cas , par les bains tièdes , le lait pour toute nourriture , & de petites doses de fer & de Valeriane.

§. 122. J'ai déjà dit que j'avois

guéri une femme, sujette à l'épilepsie dans ses grossesses, par les saignées & les bains; ces deux remèdes, sur-tout la saignée, un régime très doux, une grande attention à avoir le ventre très libre, sont les moyens les plus efficaces pour prévenir l'épilepsie qui dépend de cet état; celle qui est une suite de couches exige des attentions qui dépendent des circonstances & qui ne sont point susceptibles d'être détaillées ici.

Quand elle est la suite de la suppression des lochies, il n'est pas rare qu'elle tue dans les premiers jours de la maladie; quand elle vient plus tard, qu'elle est la suite d'un chagrin, d'une frayeur, d'une colère, elle est ordinairement très opiniâtre, sur-tout si les règles ne se rétablissent pas régulièrement.

Quand les règles sont bien établies & qu'elle subsiste également, il faut la traiter comme l'épilepsie essentielle dont je parlerai plus bas.

Celle qui précède l'éruption des règles & est la suite de la violente douleur, est rare, quoique les convulsions soient fréquentes à cette époque,

J'ai donné le traitement qui leur convient dans l'article qui en traite , & celui qui convient à l'épilepsie est le même ; elle est le dernier degré des convulsions. C'est cette espèce que Mr. P O M M E appelle *épilepsie hystérique* (e) & qu'il traite par sa méthode, qui est en effet véritablement indiquée dans plusieurs cas de ce genre , mais pas dans tous ; & je trouve dans les classes des maladies de Mr. DE SAUVAGES une observation qui doit être rapellée ici. Une jeune fille , dont le métier étoit de laver le linge , éprouvoit toutes les fois qu'elle avoit ses règles , des cardialgies & des accès d'épilepsie , & ces accidents continuoient encore quelques tems après même que les règles avoient paru. Les bains de jambes tièdes , les bouillons adoucissans , les calmans , les demi bains tièdes sur-tout , agravoient le mal ; un grain d'extrait de jusquiame prévint les cardialgies & l'épilepsie dans le tems ; mais les règles ne parurent pas. La malade aiant appris à son Méde-

(e) *Traité des affections vaporeuses*,
Tom. I. p. 125.

cin, Mr. COULAS, que ses règles avoient souvent paru au moment où elle entroit à jambes nues dans la rivière, il lui fit appliquer pendant cette époque des fomentations d'eau froide sur tout le ventre & sur le pubis; cela réussissant bien; il la fit même plonger dans des demi-bains froids, qui procurèrent une abondante menstruation sans accidents (f).

§. 123. Quand l'épilepsie ne paroît dépendre que de la révolution de la puberté, elle demande plus de ménagement que de remèdes; on doit surtout éviter avec le plus grand soin tous ceux qui sont violents; ce tems de développement est à la santé de toute la vie, ce que le jour de la crise est à une maladie aiguë: la nature est en action, dans ces momens là, & veut être regardée ou tout au plus aidée, jamais traitée violemment; la machine est alors excessivement susceptible d'impressions, si on la tracasse par des irritans, elle fait des écarts affreux & le mal est souvent fixé pour la vie.

(f) *Nosologia Method.* Class. 9. Tom. 2. p. 306.

Je fais observer un régime exact, qui ne surcharge ni n'irrite l'estomac; je prive du salé, des pâtisseries, des graisses, du vin: je modère beaucoup l'usage des acides; je ne permets qu'une application très modérée, quand ce sont de jeunes gens qui reçoivent de l'éducation; j'interdis aux jeunes filles tous les ouvrages qui font tenir la tête baissée & qui fixent les yeux; je conseille à tous l'air de la campagne & une vie active, & si je donne des remèdes ce n'est presque jamais que des fortifiants, tels que de la limaille de fer, ou quelques extraits amers; mais toujours à très petites doses, à moins que quelques circonstances particulières n'en exigent d'autres. Souvent il vaudroit peut-être mieux n'en point faire; mais il est bien rare de trouver des parents qui aient assez de fermeté pour rester tranquilles spectateurs de cette maladie. J'ai été consulté il n'y a que peu de jours, pour un jeune homme, né de parents très sains, très bien portant lui-même & très sage, qui est dans sa quatorzième année, & qui ayant mené depuis neuf mois une vie plus sédentaire & plus studieuse.

que celle à laquelle il étoit accoutumé, fans que cela parut cependant altérer le moins du monde sa bonne fanté, a été attaqué il y a trois mois, d'un accident, qui parut être un léger accès d'épilepsie, & en étoit un en effet.

„ A huit heures du matin, après déjeuner, il travailloit, & tout-à-coup
 „ fans aucun indice préparatoire, il
 „ tomba assez rudement par terre avec
 „ des mouvemens convulsifs très sensibles, dans toutes les parties de
 „ son corps, mais fans cris, ni gestes
 „ de douleur; il y avoit seulement un
 „ peu de roulemens de yeux, & il
 „ rendit un peu d'eau écumeuse par la
 „ bouche; l'accès dura environ quatre à cinq minutes, il resta un quart
 „ d'heure à reprendre connoissance,
 „ après quoi il eut de violents maux
 „ de cœur & rendit à l'aide d'un peu
 „ d'eau tiède, beaucoup d'aliments
 „ mêlés de glaires & de bile”. On attribua le mal à une indigestion, on le purgea, on lui prescrivit un régime, il a été dix semaines très bien portant: à cette époque, à la même heure, il y a six jours, mais avant déjeuner, il a repris de la même façon, un accès.

en tout semblable au premier ; mais en tout plus foible : c'est ce second accès après lequel on m'a consulté , & je ne lui ai donné que les directions que je viens d'indiquer & que j'ai vu trop souvent réussir pour que je sois inquiet sur le parfait rétablissement de ce jeune homme.

§. 124. Quand, dans le sexe, cette époque est accompagnée d'un principe marqué d'opilations , l'on doit employer le traitement qu'exige cette dernière maladie, en se souvenant toujours que l'on ne doit se permettre aucun remède violent, qui, en augmentant la convulsibilité des nerfs, aggraverait le mal, & non seulement augmenterait l'épilepsie, mais fixerait les opilations & en rendrait la cure beaucoup plus difficile. Le tempéramment du malade décide sur le choix des remèdes, & en renvoyant à ce qu'on trouve sur cet article dans le chapitre des causes des maux de nerfs, je n'ajouterai ici qu'une seule observation ; c'est que l'une des femmes les plus cruellement attaquées des maux de nerfs que je connoisse, est une femme née forte & robuste, mais qui eut des opi-

lations opiniâtres, pour lesquelles un Apoticaire charlatan lui ordonna un remède très violent, dont elle ignore la composition; elle fait seulement qu'il y entroit de la baleine brulée, qui n'est qu'une cendre alcaline; elle eut de violentes convulsions pendant l'opération du remède, & ce moment fut l'époque du dérangement de sa santé; depuis lors elle n'a pas eu un instant de bien, & le désordre de ses nerfs m'a fourni les faits les plus bizarres; j'en ai rapporté plusieurs dans d'autres chapitres de cet ouvrage. Mr. DU POUËIX, dont j'ai rapporté l'observation, §. 54, guérit la jeune personne que la suppression de ses règles avoit rendue épileptique, par deux saignées & un usage abondant du tartre martial soluble qui les rapella (g).

§. 125. J'ai déjà dit qu'il est bien rare que l'épilepsie soit une suite de l'hystérie, comme quelques Médecins le croient; si cela arrive, ce symptôme n'exige d'autre traitement que celui qu'on oppose à la maladie principale dont il est l'effet.

(g) *Journal de Médecine*, Tom. 30.
P. 444.

§. 126. Quand on est sûr que le vice de la poitrine est la cause de l'épilepsie, c'est à la guérison de ce vice qu'il faut donner tous ses soins, & en général dans ce cas, comme dans la plupart des précédents & des suivans, il ne faut point s'occuper d'abord de l'épilepsie, on doit la regarder comme accident, mais un accident qui exige cependant quelques attentions ; la première, c'est que puisqu'il prouve que les nerfs sont très susceptibles de convulsions, il faut éviter ce qui pourroit augmenter cette malheureuse disposition ; la seconde, c'est qu'il faut surtout être en garde, dans le régime & dans les remèdes, contre tout ce qui peut trop porter les humeurs à la tête ; la troisième enfin, c'est que comme une triste expérience a appris que quoique l'épilepsie fut d'abord accidentelle & un symptôme d'autres maux, cependant lors même que la cause a été enlevée, souvent la disposition épileptique reste ; on doit être attentif, après avoir détruit la cause, à observer si la disposition l'est aussi ; si l'on a quelque lieu d'en douter, & on doit toujours le craindre quand les nerfs paroissent

être fort mobiles, il faut employer les secours les mieux indiqués, pour prévenir, s'il est possible, les nouveaux accès.

ARTICLE XIX.

Traitement des épilepsies sympathiques; qui ont leur siège dans les parties externes.

§. 127. Il seroit inutile de parcourir toutes les espèces d'épilepsies qui dépendent des causes externes que j'ai indiqué plus haut, & d'assigner à toutes leur traitement; elles ont des principes de curation communs qu'il suffit d'indiquer.

La nature, en guérissant par l'ouverture d'une ulcération sur la partie malade, comme on a vu plus haut qu'elle faisoit quelquefois chez la Religieuse dont parle DONAT, a montré la bonne voye, qui consiste à ouvrir un écoulement sur l'endroit même affecté, ou au moins sur celui d'où part le mal, si l'on n'y aperçoit rien; à emporter le corps étranger, s'il s'y en trouve un, comme chez la jeune

filles dont FABRI nous a conservé l'histoire, voyez §. 32; à extirper la tumeur, s'il y en a une, comme le fit Mr. SCHORT. Quelquefois il faut inciser, d'autres fois appliquer un vésicatoire, comme WEPFER, ou bruler, comme BRUNNER le fit chez la malade dont le mal commençoit par la nuque, §. 32. Je traitai le cordonnier dont le mal commençoit par la cuisse, en faisant d'abord appliquer un vésicatoire sur l'endroit même, ensuite quand il fut tari j'y fis ouvrir un assez grand cautère, qu'il entretenoit avec des boules de cire ovales plus grandes que celles qu'on emploie ordinairement, & je lui donnai en même tems de la Valériane, ce qui l'avoit parfaitement guéri (b). Cet

(h) Depuis que ceci est écrit, j'ai reçu de ses nouvelles; il m'a fait consulter pour un mal nouveau qui lui est survenu après cinq ans de santé; ce sont des crampes & des inquiétudes très fortes dans la cuisse affectée, qui le font souffrir depuis vingt-quatre heures; je lui ai ordonné une saignée au pied du même côté, du petit lait, & quand il en aura bu pendant quelques jours, un vésicatoire à la cuisse; mais je crains que ces crampes ne présagent un retour.

emploi des antispasmodiques, dans le même tems qu'on ouvre une issue à la cause, est une précaution qu'il ne faut point négliger; elle peut souvent être superflue, mais elle n'est jamais dangereuse, moyenant qu'on choisisse bien les antispasmodiques; ce n'est pas toujours la Valériane ou des remèdes analogues, comme on le verra plus bas, qu'il faut ordonner; c'est quelquefois les bains, d'autres fois le lait, le petit lait, les aqueux.

§. 128. Quand les vésicatoires, les brulures, le cautère, sont insuffisans, je ne balancerois pas, dans plusieurs cas où cela est très possible, à amputer le nerf qui anime l'endroit d'où part le mal; je l'ai fait avec succès, pour un mal de tête atroce (i); d'autres l'ont fait pour la migraine; d'autres pour de vives douleurs au visage; Mr. ANDRÉ, Chirurgien de Versailles, & Mr. RITZ, premier Chirurgien de S. M. le Roi de Pologne, pour le *tic douloureux*; pourquoi ne le feroit-on pas pour l'épilepsie? L'effet presque inmanquable des ligatures qui suf-

(i) *Epistola ad Zimmermann.*

pendent la communication entre la fin & l'origine du nerf, assure le succès de l'amputation, & l'on fait combien celle d'un rameau nerveux cutané est peu dangereuse. J'ai rapporté plus haut le succès de l'amputation d'un doigt; dans des cas semblables il faudroit la faire sans hésiter.

Lors même qu'on a lieu de croire ces espèces d'épilepsie absolument guéries, il n'est pas inutile d'ouvrir un cautère dans la partie qui a été le siège du mal; c'est un des cas de cette maladie où le cautère est bien indiqué, & il l'est en général plus souvent dans l'épilepsie que dans bien d'autres maladies; mais je reparlerai de ses avantages plus bas.

ARTICLE XX.

Traitement des épilepsies idiopathiques.

§. 129. Une autre classe d'épilepsies, sont celles qui ont leur siège dans la tête; dans les unes, c'est le crâne qui est affecté; dans les autres, les membranes qui enveloppent le cerveau; dans de troisièmes, le cerveau

même. J'ai rapporté des exemples de toutes ces espèces, & l'on a vu que si quelquefois le mal étoit apparent extérieurement, plus souvent il ne l'étoit point, & qu'il étoit très difficile de le découvrir. Dans tous les cas où il y a quelque vice extérieur qu'on peut avec vraisemblance regarder comme cause du mal, il ne faut pas balancer à ouvrir les tégumens suffisamment & à opérer sur l'os même par tous les moyens nécessaires. Si l'os seul est affecté, on est presque sûr du succès; si les parties internes sont aussi attaquées, on a bien moins d'espérance, & l'on a vu dans l'observation de CLOSSY, rapportée §. 50, que le vice de l'os se trouvant compliqué avec une abcédation des membranes, le malade périt. Il pourroit cependant arriver qu'un vice des membranes correspondant à la partie viciée de l'os, ou qu'un épanchement de cause interne qui se trouveroit dans le même endroit, seroient à portée d'être emportés par l'ouverture de l'os, ce qui guériroit le malade; ainsi le trépan dans ces cas là seroit toujours utile; & c'est une opération assez peu dangereuse,

quand elle est faite dans un bon air, par un bon Chirurgien, sur un sujet qui n'a point le sang gâté, pour qu'on doive se déterminer à la faire toutes les fois que, même sans vice apparent, les symptômes observés attentivement font présumer que la cause du mal est dans un endroit où l'on peut parvenir par ce moyen, dont plusieurs observations justifient l'usage dans cette maladie.

§. 130. Si l'on relit celle de ZECCHIUS que j'ai rapporté plus haut, §. 39, on comprendra aisément que les symptômes du mal conduisoient à essayer le trépan, qui auroit vraisemblablement guéri le malade de l'épilepsie & lui auroit sauvé la vie. SPIGELLIUS nous apprend, qu'un jeune homme, de dix-neuf ans, fort sujet à l'épilepsie, en fut guéri, quand FABRI *d'Aquapendente* lui eut fait le trépan, ensuite d'une chute; & MARCEL DONAT, rapporte le cas d'un jeune François, qui étant attaqué d'épilepsie, & allant en Italie pour y consulter les plus célèbres Médecins, fut attaqué en route, par des assassins, & entr'autres playes en reçut une au

front, qui emporta une grande partie de l'os; la playe fut longtems ouverte, elle se guérit cependant & en même tems le malade fut guéri de la maladie à laquelle il alloit chercher du foulagement (*k*).

L'on dira peut-être que dans ces deux premiers cas, la révolution occasionnée par la chute a plus contribué à la guérison que le trépan; mais on ne pourra pas faire la même objection à l'observation suivante, dans laquelle on voit, non pas une guérison complete, mais un foulagement sensible operé par le trépan, employé dans la vuë de guérir l'épilepsie; elle est de LA MOTTE, Auteur véridique & exact; je rapporterai ses propres termes. “ Au mois d'Octobre
 „ 1705, un particulier, affligé d'ac-
 „ cès d'épilepsie très violents & très
 „ fréquents, me consulta sur ce qu'il
 „ auroit à faire pour s'en garantir;
 „ étant bien résolu de tout tenter pour
 „ avoir du foulagement, après n'a-
 „ voir rien négligé jusqu'alors de tous

(*k*) Voy. VAN SWIETEN, §. 1081.
 Tom. 4. p. 444.

„ les remèdes qui lui avoient été pres-
 „ crits & administrés sans aucun
 „ succès. Je m'informai si les accès
 „ n'étoient point précédés de quelques
 „ douleurs particulieres en quelque
 „ partie du corps , & s'il ne prévoyoit
 „ point l'accès par quelques marques
 „ ou accidents. Il me dit qu'il n'y
 „ avoit que sa tête qu'il trouvoit oc-
 „ cupée avec une espèce de tournoye-
 „ ment si prompt , qu'il tomboit à
 „ l'instant avec perte de connoissance.
 „ Le tout bien examiné , je ne trou-
 „ vai autre chose à lui proposer , si-
 „ non l'application du trépan , à la-
 „ quelle il n'eut aucune peine à se ré-
 „ soudre. Je l'y disposai par des lave-
 „ mens, la saignée & des purgations,
 „ & le jour pris , je fis l'incision cru-
 „ ciale au milieu du pariétal gauche
 „ (1) ; j'enlevai la portion de l'os qui
 „ étoit d'une épaisseur surprenante ,
 „ sans diploé, ni presque de différen-
 „ ce en tout l'os , lequel outre son
 „ épaisseur étoit beaucoup plus dur
 „ qu'il ne l'est ordinairement. Pen-

(1) Il fut apparemment décidé à choisir
 cette partie , parce que le malade la désigna
 comme le point d'où partoît le mal.

„ dant tout le tems que le crâne fut
 „ ouvert , le malade qui n'étoit pas
 „ huit jours avant ce tems-là sans
 „ souffrir quelque'accès épileptique ,
 „ n'en ressentit aucun ; mais quand
 „ l'os fut rempli, les accès revinrent
 „ de nouveau comme auparavant, si
 „ ce n'est qu'il a maintenant le tems
 „ de se retirer en quelque'endroit se-
 „ cret & commode pour laisser passer
 „ l'accès sans risque, s'apercevant par
 „ de certaines marques de ce qui va
 „ lui arriver , sans compter que les
 „ accès ne recidivent pas à beaucoup
 „ près si fréquemment qu'ils faisoient
 „ auparavant (m).” Cette observa-
 „ tion est très importante, en ce qu'elle
 „ paroît prouver évidemment, 1°. que
 „ le cerveau se trouvoit trop comprimé
 „ par le crâne dans certains momens, &
 „ qu'alors cette compression produisoit
 „ l'épilepsie ; 2°. que la légère diminu-
 „ tion à cette compression, produite par
 „ le changement que le trépan occasion-
 „ na à l'os a suffi pour produire dans le
 „ mal deux changemens avantageux ;

(m) *Traité complet de Chirurgie*, Obs.
 172. Tom. 2. p. 409.

l'un de rendre les accès moins fréquens, l'autre de les rendre moins prompts, & de laisser par-là même assez de tems au malade pour se retirer, & il est très vraisemblable que si l'on eut appliqué encore deux ou trois couronnes, le mal auroit été emporté.

§. 131. Un effet des trépan multipliés, observé sur le Comte *Philippe de NASSAU Weichem*, confirme cette idée. Il étoit tombé de cheval, & les symptômes démontroient évidemment qu'il y avoit un épanchement, mais rien n'en faisoit connoître l'endroit, & ce ne fut qu'au vingt-septieme trépan qu'on le découvrit. Le malade guérit parfaitement, vécut plusieurs années sans aucune lésion dans ses facultés, & pouvoit même boire beaucoup plus de vin qu'auparavant, sans tomber dans l'ivresse (n). Cette observation, attestée par un billet du malade même au mois d'Août 1664, est remarquable par la multiplicité des trépan & importante pour mon sujet, par l'effet qui en résulta. On a vu plus

(n) STALPARTII *Van der Wiel*,
Observat. Cent. 1. Obs. 8. p. 36.

plus haut que tout ce qui déterminoit une plus grande quantité de sang au cerveau, renouvelloit les accès, & le vin produit singulièrement cet effet; les trépan multipliés prévinrent chez le comte l'effet le plus constant de la plethore vineuse, l'ivresse; & l'on peut, ce me semble, conclure, avec bien de la certitude, que s'il avoit été sujet à l'épilepsie, les causes qui auroient pu en déterminer les accès avant le trépan, ne l'auroient peut-être point fait après, ou l'auroient fait beaucoup moins; & convaincu que plusieurs attaques d'épilepsie n'ont d'autres causes que cette compression du cerveau par le crâne, je le suis également, que toutes les fois qu'on a lieu de soupçonner cette cause, (& on doit la soupçonner, quand les accès sont constamment produits par tout ce qui porte le sang à la tête) on feroit sagement d'essayer le trépan, lorsque la maladie élude l'effort des autres remèdes & est assez grave, & que le malade est assez courageux pour s'y soumettre. Je ne doute pas qu'on n'en retirât presque toujours des avantages considérables.

A R E T É E l'avoit déjà recomman-

M

dé (m) ; mais il en a été de ce conseil comme de tant d'autres bons conseils des anciens, qui sont absolument négligés & qui restent comme inconnus au plus grand nombre des médecins, jusques à ce que quelque moderne s'en fasse honneur & les remette en vogue.

§. 132. Quand le vice attaque les parties mêmes du cerveau, que les membranes sont ossifiées, qu'il renferme un abcès, des hydatides, qu'il est ramolli, squirreux, calleux, charnu, comme on a vu plus haut que cela arrivoit quelquefois, le mal est absolument incurable, & il ne reste d'autre remède à essayer que de prévenir par le régime & par quelques secours simples, la fréquence des accès ; mais cet objet sera le sujet d'un des articles suivans, auquel je renvoye. Peut-être que chacune de ces causes a quelque symptôme différent de ceux que les autres produisent ; nous les ignorons jusques à présent, & ces observations ne seront, j'espère, jamais assez fréquentes pour qu'on puisse parvenir à

(m) *De Curatione Morbor. chronicor.*
Cap. 4. pag. 121.

les distinguer ; mais sans les distinguer, il y a plusieurs symptômes qui peuvent conduire un médecin attentif & observateur à décider qu'il y a un vice essentiel dans le cerveau , & dans ce cas , comme dans tous ceux qui sont incurables , on doit bien se garder de donner des remèdes curatifs ; en voulant guérir ceux qui ne peuvent l'être, on change trop souvent un mal tolérable en un état affreux , & le meilleur médecin est celui qui fait se résoudre à ne rien faire qu'éloigner toutes les causes qui paroissent aggraver le mal.

ARTICLE XXI.

Traitement des épilepsies qui dépendent de la plethore ou de l'âcreté.

§. 133. Une troisième classe d'épilepsies , qu'on pourroit appeler *humorales*, est de celles , qui , sans aucun vice dans les solides , sont produites par la quantité des humeurs , ou par leur âcreté ; j'en ai détaillé les différentes espèces plus haut. La première & la principale , c'est l'épilepsie plethorique ; on la guérit en guérissant

la plethore; j'ai déjà dit que ce feroit le fujet d'un des paragraphes fuivans. Les autres dépendent ou de l'âcreté des humeurs, ou d'une évacuation naturelle dérangée, ou d'une évacuation maladeive fupprimée tout-à-coup. Dès qu'on eft parvenu à découvrir la caufe, on connoît ce qu'il faut faire, & vouloir entrer dans les détails de celui qui convient à chaque efpece, ce feroit engager à donner un traité de pratique. Ainfi le traitement a deux parties, comme je l'ai déjà dit des épilepfies fympathiques; éloigner la caufe, & enfuite, fi l'on craint que les nerfs n'ayent contracté la difpofition épileptique, donner des fpécifiques, dont je parlerai plus bas.

Les efpeces les plus opiniâtres de cette claffe, font celles qui dépendent de la repercuffion d'une maladie cutanée, ou d'une évacuation maladeive fupprimée. Il eft très-difficile & très-rare de pouvoir la rappeler, & fouvent en fe déposant fur le cerveau, elle y produit des défords incurables : je fus appellé il y a plufieurs années, dans une ville étrangere, pour un malade qui avoit été conduit, dès le com-

mencement de son mal, par trois médecins des plus éclairés, & que tous leurs soins ne purent pas empêcher de mourir cruellement. Il avoit assez ordinairement, au front, une très-légère dartre, à laquelle il n'auroit dû faire aucune attention & dont il s'inquiétoit trop; il y appliqua la liqueur de saturne de Goulard, qui fit disparaître le mal & le jetta dans des maux de tête atroces, accompagnés quelquefois d'un peu de délire, d'autres fois de légers mouvemens convulsifs. Au bout de quelques mois, la violence du mal le fit tomber dans une espèce de stupeur mêlée de momens d'inquiétudes, & après sa mort l'on trouva tout en très-bon état dans le cadavre, excepté le cerveau qui étoit en partie durci & gonflé. L'on avoit bien cherché dès les commencemens à rappeler la dartre, on avoit bien fait des écoulemens artificiels, on ouvrit même un seton en ma présence; tout avoit été inutile, & cela n'arrive malheureusement que trop souvent, surtout si l'on s'endort sur les commencemens du mal, & si on laisse former les premiers germes du dérangement

de l'organisation, qui fait alors des progrès rapides.

ARTICLE XXII.

*Traitement de la cause prédisposante.
Le régime.*

§. 134. Après avoir parlé de toutes ces espèces d'épilepsies qui ne sont point proprement l'épilepsie essentielle, il me reste à parler de cette dernière qui est la plus fréquente, & qui ne reconnoissant aucune cause sympathique, ni aucun vice sensible d'organisation dans la tête, dépend uniquement de la disposition épileptique du cerveau, mise en action par quelque-une des causes occasionnelles, quelquefois sensibles & beaucoup plus souvent imperceptibles, dont j'ai parlé plus haut. Elle peut tuer aussi bien que les autres; mais quand on ouvre le crâne après la mort, on ne trouve qu'un cerveau sain & bien constitué (n), comme je l'ai vu dans l'observation que j'ai rapporté

(n) BONETI, *Sepulchret.* Obs. 38. 39. pag. 287. &c.

plus haut, §. 64; & comme Mr. JONSTHON l'observa aussi dans ce jeune homme qu'il ouvrit, §. 51, & qui n'avoit d'autre vice que cet engorgement qui étoit né pendant l'accès.

§. 135. L'on voit que la cure a deux parties; changer la disposition épileptique du cerveau, ou détruire cette facilité qu'il a à se convulser, & prévenir toutes les causes qui déterminent l'accès. Je commencerai par la dernière, d'autant plus volontiers que souvent elle suffit; si l'on parvient à éloigner pendant quelque tems les accès, les nerfs se fortifient & perdent cette malheureuse disposition. Mr. VAN SWIETEN a dit, avec beaucoup de justesse, que comme les traces des idées qui ne sont point rappellées de tems en tems, s'effacent entièrement, de même si les mouvemens épileptiques ne sont point renouvelés, l'aptitude à les renouveler se détruit. Si au contraire on n'éloigne pas toutes les causes qui peuvent déterminer les accès, on a beau employer les spécifiques les plus efficaces, ils sont inutiles, & tout le bien qu'ils pourroient faire est promptement détruit par le mal que

font les causes irritantes ; ainsi l'action des remèdes est très-subordonnée au régime , & c'est une nouvelle raison pour le déterminer, avant que de parler des remèdes.

§. 136. GALIEN en sentoît toute l'importance , & sa belle consulte pour un enfant épileptique (o) est presque toute entière consacrée à le prescrire ; il entre dans les plus grands détails ; son premier conseil , est d'observer attentivement ce qui nuit à l'enfant & de l'éviter ; il interdit tous les alimens visqueux , flatueux , tous ceux qui peuvent déterminer le sang à la tête , le vin , la moutarde , les poissons sans écailles , qui sont tous visqueux , il recommande pour boisson , l'eau avec l'oximel , & donne beaucoup de préceptes sur l'exercice.

Le grand but qu'on doit se proposer , c'est , 1°. de prévenir la formation d'une trop grande quantité d'humeurs ; 2°. d'empêcher qu'elles ne se portent à la tête , en prévenant leur trop grand mouvement & en facilitant

(o) *Pro puero epileptico consilium.* CHAR-
TER. Tom. 10. pag. 487.

la circulation dans les autres parties ;
3°. enfin d'éloigner tout ce qui peut
irriter le genre nerveux.

§. 137. La sobriété, je le dis d'après
une multitude d'observations, est le
moyen le plus sûr de prévenir la for-
mation d'une trop grande quantité
d'humeurs, & la base de la guérison
de cette maladie. Quand la disposition
épileptique existe, elle est rappelée
par tout ce qui distend les vaisseaux
du cerveau, & ainsi une nourriture
abondante est un poison ; il est donc de
la plus grande importance de réduire
ses alimens à la moindre quantité pos-
sible pour vivre & se bien porter, &
c'est sur-tout le soir qu'on doit se per-
mettre très-peu d'alimens ; l'on a vu
plus haut que c'étoit ordinairement pen-
dant la nuit que les attaques étoient
les plus fréquentes ; & j'ai prouvé ail-
leurs que le sommeil augmentoit la ple-
thore dans la tête, ainsi c'est en se
couchant, qu'on doit éviter de se sur-
charger par les alimens ; mais outre
la diminution sur la quantité, on doit
faire beaucoup d'attention à la qua-
lité, & ces attentions rempliront en
même tems une partie de la seconde &

de la troisième indication où je ne serai pas obligé de les rappeler ; je ne m'étendrai même pas beaucoup ici, puisque ce régime ressemble à celui que j'ai conseillé aux gens de lettres avec beaucoup de détail, dans la dissertation sur leur santé. Je suppose au reste toujours une personne qui n'est qu'épileptique & dont toutes les autres fonctions sont en bon état, sans entrer dans les différences de régime que des circonstances particulières, ou la complication d'autres maladies peuvent exiger.

§. 138. Les viandes blanches, le poisson de rivière, les légumes, les farineux les plus digestibles, parmi lesquels je comprends le pain, les fruits bien mûrs, doivent être la base de la nourriture des épileptiques ; on peut leur permettre quelquefois un peu de bœuf, du mouton tendre, mais en général on doit leur interdire toutes les viandes noires, qui sont beaucoup de sang, & un sang âcre, les œufs, les pâtisseries, les fritures, les choses grasses, les oyes, les canards, la viande de cochon, toutes celles qui sont salées, fumées ou venées, les

anguilles , la raye , la sèche , la merluche , les écrevisses , les truffes , les artichauts , les asperges , le céleri & le persil.

§. 139. Je fais que ce régime paroîtra fort contraire à celui que l'on ordonne trop souvent ; il y a beaucoup de médecins qui , quand ils veulent mettre au régime , prescrivent de ne manger que du potage au bouillon , du bouilli & du roti , & permettent comme par grace un peu de légumes , mais défendent sévèrement toutes les crudités , & regardent les fruits comme un aliment nuisible dans toutes les maladies indistinctement ; je vois tous les jours des malades qui n'en ont point mangé depuis plusieurs années , mais je vois tous les jours ces mêmes malades reprendre de l'appétit , des forces , du bien être , de la gayeté , renaître en un mot , dès qu'ils recommencent à en faire usage. J'ai été consulté depuis , par une femme épileptique , qui depuis quinze mois ne vivoit que de viandes , d'œufs , de ragoûts , de chocolat , & de remèdes chauds ; je l'ai privée de remèdes , j'ai totalement changé son régime , je ne lui accorde que très-

peu de viande , point de chocolat , mais des légumes & des fruits à discrétion ; le premier effet de ce changement a été de lui enlever des maux d'estomac qu'elle avoit continuellement , & de lui donner un sommeil tranquille ; son état s'est ensuite amendé de jour en jour , & aboutira , j'espère , à une guérison que la continuation du régime qu'on lui avoit imposé , auroit rendue impossible.

§. 140. Par rapport aux boissons , l'eau pure est la seule qui leur convienne ; toutes les autres sont moins salutaires , plusieurs nuisibles.

Le vin irrite les nerfs & porte le sang à la tête , & je suis persuadé , par beaucoup d'observations , qu'excepté dans un très-petit nombre de cas , où le mal ne vient que de foiblesse & d'atonie , la privation du vin est indispensablement nécessaire ; VAN HEERS , ce bon observateur , se plaignoit déjà de ce que plusieurs jeunes gens étoient restés incurables , parce qu'ils ne vouloient pas s'en abstenir (p) ; Mr. TRALLES parle d'un homme qui étoit beaucoup mieux , dès qu'il n'en

(p) Observ. 24.

prenoit point, & dont le mal redou-
bloit, dès qu'il en buvoit (q); & il n'y
a point de médecin qui n'ait vû la
même chose.

Le thé & le café irritent auffi; le
chocolat fimple nourrit trop, & s'il eft
vanillé ou ambré, il porte à la tête, fa
feule odeur peut produire des accès.

Le régime a plufieurs autres objets,
mais dont j'aurai occafion de parler
plus naturellement fous d'autres arti-
cles; ainfi, pour éviter les répétitions,
je n'en dirai rien ici.

ARTICLE XXIII.

*De la faignée & des autres évacuations
fanguines.*

§. 141. La difpofition à la plethore
eft quelquefois telle, que malgré la
plus grande fobriété & le plus grand
choix d'alimens, il fe forme encore
trop de fang; les vaiffeaux reftent trop
pleins, & le poulx eft fouverit dur;
dans ce cas là, il ne faut pas balancer
à faire une faignée au bras, & à la réi-
térer auffi fouverit que les circonftan-

(q) *De Opio*, T. III. pag. 32.

ces le feront juger nécessaire. J'ai examiné ailleurs les objections qu'on fait contre la saignée dans les maux de nerfs, je ne m'y arrêterai point à présent, mais je suis convaincu par un grand nombre d'expériences, qu'elle est souvent très-utile dans l'épilepsie, qu'il n'y a point de moyen qui en éloigne plus fréquemment les accès, que souvent cette maladie est incurable, si l'on ne saigne pas, que quelquefois la saignée seule la guérit, & que lors même qu'elle ne fait pas du bien par elle-même, elle est indispensable pour faciliter l'effet des autres remèdes; & si l'on se rappelle tout ce que j'ai dit sur l'état du cerveau pendant l'accès d'épilepsie, on comprendra aisément tous ses bons effets.

§. 142. RHODIUS vit un jeune homme de huit ans pour qui l'on avoit tenté inutilement tous les remèdes, & que la saignée réitérée quelquefois dans un mois guérit (r). RIVIERE parle aussi d'une jeune fille de douze ans épileptique, qui avoit des accès très-fréquens, & à qui aucun remède n'avoit procuré du soulagement; elle eut

(r) Observ. cent. 1. Observ. 64.

une pleurésie pour laquelle on la saigna plusieurs fois, & depuis ce moment elle n'eut plus d'accès; observation importante & que j'ai vue confirmée par une absolument semblable, il y a douze ou treize ans. Une jeune personne, qui n'étoit point épileptique, mais qui avoit des convulsions terribles depuis plusieurs années, étoit entre les mains de deux autres médecins, & je ne l'avois vue que dans une seule attaque; je lui avois conseillé des bains & du petit-lait qu'on lui déconseilla & qu'on remplaça par un vin composé de fer, de kina & de rhuë, qui augmenta singulièrement des maux de tête cruels auxquels elle étoit extrêmement sujette, & que la nature soulageoit par des saignemens de nez fréquens; enfin beaucoup de sang & de remèdes chauds, occasionnerent une pleurésie très forte, dans laquelle je la conduisis, & que les saignées multipliées, les nitreux, les émolliens, les jus d'herbes guériront; depuis lors, elle n'a eu aucun ressentiment de convulsions, & il est vraisemblable, que si elle eût été épileptique, elle auroit été également guérie de l'épilepsie.

§. 143. Non-seulement la saignée & les autres remèdes diminuent la quantité du sang, mais ils en changent la qualité; s'il est trop épais, trop riche, inflammatoire, la saignée, & c'est un de ses bons effets dans cette maladie, en diminuant la force des vaisseaux qui forment la densité du sang, le rend plus fluide & plus coulant, la circulation se fait mieux, la distribution en est plus aisée.

SEVERIN dit avoir toujours soulagé l'épilepsie, en ouvrant les artères ou les veines temporales, & il en cite plusieurs exemples; dans deux, on voit que des malades plus sobres auroient vraisemblablement été guéris, mais ils renouvelèrent le mal en buvant beaucoup, ce qui rappella les accès (s).

ZACUTUS LUSITANUS guérit une femme de vingt-quatre ans qui avoit eu plusieurs très-forts accès d'épilepsie, par une saignée à chaque bras & des lavemens (t).

Théophile BONNET, auteur estimable de quelques collections utiles,

(s) Mr. A. SEVERINI, *de efficaci medicin. libri tres*, fol. Francf. 1671. pag. 42.

(t) *Praxis admirab.* lib. 1. Observ. 21.

appelé par un jeune homme, qu'une frayeur avoit jetté dans un accès épileptique, qui duroit depuis trois heures, lui fit faire une saignée au bras; le sang jaillit avec une très grande force; l'accès cessa d'abord, & n'eut jamais de retour (u); & ce même ZACUTUS que je viens de citer, rapporte, dans l'observation précédente, le cas d'un homme de 20 ans, fort, robuste, sanguin, sujet à de très-forts accès, contre lesquels tous les remèdes avoient échoué, qu'il guérit parfaitement, en lui faisant faire tous les mois une saignée au pied, ce qui diminua la plethore, dit-il, & rendit les vaisseaux transpirables; il rappelle à cette occasion ce que GALIEN, dans son ouvrage sur la façon de guérir par la saignée, avoit déjà ordonné de saigner les épileptiques au pied.

Le malade dans le crâne duquel Mr. HUNAULT trouva des osselets adhérens à la dure mere, n'étoit soulagé que par des saignées. De six jeunes épileptiques, PECHLIN en guérit trois par ce seul remède (x). BENEDICTUS SILVATICUS

(u) *Mercur. compil. de epileps.* §. 5.

(x) *Observat. L. 2. Obs. 30. p. 288.*

guérit un hypocondre de l'épilepsie , en faisant appliquer tous les mois des sangsues aux hémorroïdes (y) ; & Mr. DE SAUVAGES rapporte deux traits bien intéressans ; un jeune étranger , dit-il , étoit sujet à l'épilepsie , dont il avoit des attaques plusieurs fois par semaine ; il employa inutilement , pendant un an , les secours ordinaires ; enfin la valériane sauvage le soulagea ; mais n'étant point encore guéri , il alla consulter un médecin célèbre , qui le guérit parfaitement par les saignées réitérées. Un autre épileptique fut saigné par ordre des médecins , une fois toutes les semaines , & prit des demi-bains ; cette cure dissipa l'enflure qu'il avoit aux jambes , & rendit les accès beaucoup plus rares & beaucoup plus foibles (z). Le second maçon , dont j'ai parlé §. 13 , fut radicalement guéri par deux saignées , l'une au bras , l'autre au pied , & quelques nitreux. Enfin , j'ai fait si souvent des observations semblables , j'ai vu si fréquemment le mal soulagé dès les premières saignées , se guérir en

(y) *Mercur. compilat. art. epileps.* §. 40.

(z) *Nosologia Class.* 4. T. 1. p. 581.

les continuant, que je ne puis assez recommander aux médecins d'être en garde contre cette opinion funeste & trop répandue, qui interdit la saignée dans presque toutes les épilepsies.

§. 144. Je ne veux cependant point qu'on en fasse un remède général; chez un malade foible, cacochime, qui paroît avoir peu de sang, qui l'a dissous, chez qui le mal est l'effet d'un acide dans les premières voyes, ou d'une mobilité excessive, elle nuirait presque toujours; mais chez les enfans forts & robustes, chez les personnes bien portantes, à la fleur de l'âge, chez celles sur-tout qui éprouvent une suppression, soit menstruelle, soit hémorroïdale, qui ont les vaisseaux pleins, la peau dure & sèche, le visage rouge, une pesanteur de tête habituelle, le poux dur, la saignée est indispensablement nécessaire, & ordinairement en la réitérant, elle rappelle les évacuations supprimées, comme je viens de le voir depuis très-peu sur deux femmes, l'une très-jeune encore, l'autre âgée de trente-huit ans.

§. 145. Les sangsues, appliquées soit au fondement, soit aux tempes,

& les ventoufes, méritent quelquefois la préférence fur les autres faignées. Il y a quelques années qu'un très-habile chirurgien me consulta pour une femme forte, fanguine, qui avoit beaucoup de tempérament, & qui éprouvoit depuis quelque tems de violens accès d'épilepfie, occasionnés par le trop de fang qui fe portoit à la tête, & que les faignées n'avoient pas diminué. Des fangfues, appliquées trois fois aux vaiffeaux hémorroïdaux, de quinze en quinze jours, la vapeur de l'eau chaude fur une chaise percée, matin & foir, & pour tout remede, l'ufage de la crème de tartre avec une boiffon abondante, firent paroître les hémorroïdes; & dès lors la malade fut radicalement guérie.

§. 146. La faignée de la jugulaire peut être quelquefois néceffaire, & HAGENDORN parle d'un jeune homme qui prit un premier accès d'épilepfie, pour avoir eu tout le vifage enduit de poix chaude; cet accès paffa; étant revenu au bout de quelques mois, il céda encore à des remedes anti-épileptiques; mais une troifieme attaque étant plus rebelle, & les autres reme-

des inutiles, il ordonna la saignée de la jugulaire, qui enleva totalement le mal (a).

ARTICLE XXIV.

Moyens d'empêcher que le sang ne se porte à la tête.

§. 147. Non-seulement il faut prévenir la formation de trop de sang, mais il faut encore empêcher qu'il ne se porte à la tête; & les causes principales qui l'y déterminent étant, ou son trop grand mouvement, ou la circulation gênée dans quelque autre partie, soit par des sécrétions dérangées, soit par l'inaction, qui ralentit la circulation dans les extrémités, soit par le spasme; l'un des grands objets de la cure de l'épilepsie, c'est d'éloigner ces causes.

Le même régime que j'ai prescrit pour empêcher la formation d'une trop grande quantité de sang, est en même

(a) *Médecin. Septent.* De epileps. C. 19. T. I. p. 115.

tems le moyen le plus propre à empêcher son trop grand mouvement, & à prévenir par là même qu'il ne se porte trop à la tête, effet nécessaire de son mouvement augmenté, & effet presque toujours funeste. J'ai observé avec le plus grand soin, plusieurs épileptiques; j'ai constamment vu que l'augmentation de fréquence dans le poulx, précédoit toujours les accès, quelquefois cette fréquence, souvent accompagnée de dureté, duroit plusieurs jours; ils avoient alors ou des accès, ou au moins plusieurs commencemens d'accès; tout ce qui pouvoit l'abattre & amollir le poulx, leur rendoit le bien-être & éloignoit les accès, & j'ai vu leur guérison s'avancer à mesure que le poulx perdoit ce caractère fievreux & dur, auquel on ne donne point assez d'attention dans cette maladie, & dans plusieurs autres maladies de langueur.

§. 148. Tous les rafraîchissans, la crème de tartre, le nitre, le vinaigre, le petit lait, la tisanne de racine de grammont, sont propres à remplir cette indication, & je m'en suis servi souvent avec le plus grand succès, mal-

gré ce funeste préjugé qui prohibe presque tout ce qui n'est pas chaud, & malgré l'opinion qui, donnant dans un excès contraire, mais bien moins fâcheux, n'admet que les simples délayans les plus insipides. Le petit lait est, parmi les remèdes que je viens d'indiquer, celui qui mérite la préférence; il calme, il défobstrue, il rompt le spasme, il entretient la liberté du ventre, il facilite la transpiration, en un mot, il remplit presque toutes les indications.

Quelquefois il est indispensablement nécessaire de purger, & de purger même plusieurs fois; on fait que c'est un des moyens les plus propres à détourner le sang de la tête; souvent même les purgatifs actifs sont nécessaires. ERASTE & MASSARIA avoient attribué le peu de succès dans la guérison de l'épilepsie à ce qu'on ne purgeoit pas assez souvent. RIVIÈRE purgeoit fréquemment, & l'on peut appliquer dans plusieurs cas à cette maladie ce que j'ai dit des purgatifs dans les maux de nerfs en général; l'on a déjà vû plus haut les bons effets des purgatifs dans les cas où les embarras du bas-ventre

paroissent être le siège de la maladie. La méthode du docteur KINNEIR, pour guérir les enfans épileptiques, étoit de les purger tous les jours avec une infusion de rhubarbe, & de leur donner dans le même tems une poudre absorbante avec le *sal jovis*, si fort recommandé par BAGLIVI dans les affections hystériques, & une infusion de valeriane sauvage (*b*). Mr. MANGOLT rapporte l'observation d'un enfant, pour qui l'on avoit consulté les plus habiles médecins, & employé inutilement les remèdes anti-épileptiques les plus vantés, qui fut enfin guéri par la seule teinture de rhubarbe (*c*). RENEAULME, médecin de Blois, a vû au commencement du dernier siècle deux cas semblables; celui d'une jeune fille de sept ans, qui avoit jusques à six accès presque tous les jours, & qu'il guérit en lui donnant six grains de son stomachique, qui paroît avoir été l'extrait d'aloës, qui la purgea beaucoup par le bas, & détruisit la maladie; chaque accès commen-

çoit

(*b*) *A new essay on the nerves*, p. 179.

(*c*) *De epilepsia nonnullis speciebus.*

çoit par une douleur d'estomac ; l'autre est celle d'un homme de vingt ans , dont le mal commençoit de même , & que le même remède guérit (*d*).

§. 149. Quand le sang est déterminé à la tête par le dérangement des sécrétions , il faut nécessairement y remédier ; la constipation produit souvent cet effet , & l'on doit la prévenir ; le régime que j'ai indiqué , la crème de tartre , le petit-lait , & sur-tout les lavemens réussissent dans ce cas ; il ne faut point craindre d'employer fréquemment ce dernier remède , & de s'en faire par là un assujettissement ; ils cesseront d'être nécessaires , quand ils cesseront d'être utiles ; au moins je l'ai vu assez constamment.

Mais la sécrétion à laquelle il faut presque toujours faire le plus d'attention , c'est la transpiration ; j'ai déjà dit que , dans les maux de nerfs , la transpiration étoit souvent très-irrégulière , que la peau étoit presque toujours dans un état spasmodique , & qu'il

(*d*) *Ex curationibus Observationes Authore Paulo RENEALMO , Parisiis , 1606.*
Obs. 47. 48.

falloit y remédier ; le remede le plus sûr pour cela, c'est les bains tiedes d'eau simple , pris tous les jours à jeûn , & plus ou moins longs ; le degré de chaleur doit être du 25 au 26 du thermometre de Mr. de RÉAUMUR. Il est difficile de croire , sans l'avoir éprouvé , le bon effet de ce remede , recommandé dans tous les tems , mais toujours ou trop peu ordonné , ou ordonné pour trop peu de tems ; on les ordonne pour une neuvaine ou une quinzaine ; c'est être bien peu instruit de la nature des maux & de celle des remedes ; c'est bien peu se rendre compte de ce qu'on ordonne ; c'est par centaine qu'on doit les prescrire dans des cas graves , & quelquefois sans terme limité. J'ai vu une malade qui vint me consulter pour des maux de nerfs très-opiniâtres , qui étoient une suite de couche , qui portoient principalement sur la poitrine , & qui duroient depuis plusieurs années , dont elle avoit passé une grande partie à Paris , où Mr. DE LA MOTTE , qui l'avoit conduite avec beaucoup d'habileté , & qui lui avoit fait beaucoup de bien , lui avoit fait déjà prendre douze cents cinquante

bains , ce nombre ne m'empêcha point de lui conseiller de les recommencer ; le dégoût qu'elle en avoit conçu, lui a empêché de les prendre aussi fréquemment que je le souhaitois , & elle doit sa guérison au lait d'ânesse , qu'elle a pris dix-huit mois , & dont je la fis vivre pendant plusieurs semaines , sans autres alimens que des fruits crus , sur-tout des pêches , des melons , quelques légumes , du pain , & rarement un peu de poisson ; mais il n'en est pas moins réel que tous les bains qu'elle prenoit , lui faisoient toujours un bien marqué , & que sa guérison auroit été plus prompte , si elle en avoit pris davantage. Quand on a de bonnes eaux , je fais employer l'eau simple ; quand on a des eaux dures , on doit y ajouter un peu de savon , un peu de lait , si l'on veut , quelques fleurs ou quelques herbes émollientes.

§. 150. De légères frictions sur tout le corps , sur-tout aux jambes & aux cuisses , augmentent beaucoup le bon effet du bain , en facilitant la transpiration , & en rompant mieux le spasme ; mais elles doivent être très-douces : fortes , elles animeroient le mouvement

du sang, & le porteroient à la tête. Rien ne dissipe le froid des extrémités comme le bain, & en rompant le spasme, il opere aussi très-souvent la guérison des obstructions & des suppressions.

Mais quand ce froid habituel des extrémités est plutôt l'effet de la lenteur de la circulation, occasionnée par la foiblesse des fibres & la disposition aqueuse du sang, que de la plénitude des vaisseaux ou du spasme, le bain ne vaudroit rien; & pour le dissiper, on doit ordonner du mouvement, des frictions seches avec de la flanelle, & des semelles de poix de Bourgogne, étendue sur de la peau, qu'on porte habituellement sous la plante des pieds. On doit s'interdire les chauffe-pieds pleins de braise, dont la vapeur, toujours plus ou moins narcotique, nuit sensiblement aux personnes sujettes aux maux de nerfs; & heureusement ce pernicieux usage diminue tous les jours, & on les abandonne presque entièrement aux petites boutiquieres & aux revendeuses, qui passent leur vie assises aux coins des rues: ce feu leur est nécessaire; & dans des boutiques ouvertes, ou en plein air, il est bien moins

nuisible que dans des chambres où il incommode tout le monde.

§. 151. Quand c'est la fatigue de la digestion qui détermine le sang à la tête, les stomachiques y remédient, & quand cette détermination est uniquement l'effet de la mobilité, c'est en guérissant cette dernière qu'on doit y remédier.

§. 152. En proscrivant tout ce qui anime trop le mouvement du sang, on proscrie le trop d'exercice, les exercices violens, ceux qui portent singulièrement le sang à la tête, l'application, la méditation, tous les ouvrages qui font baisser la tête & qui fixent les yeux, l'ardeur du soleil & les appartemens chauds, dont on a déjà vu les dangers. les compagnies nombreuses, les repas, les veilles, les lieux élevés, où la tête tourne, & sur-tout l'action de tourner, qui, non-seulement détermine les humeurs à la tête, & peut par-là même rappeler les accès, mais peut même produire des maux très-facheux. J'ai été consulté, il y a quelques années, par un mousquetaire, que ce mouvement de rotation, poussé apparemment trop loin

un jour en badinant, a jetté dans des maladies de la tête très-graves, & dont il n'a peut-être jamais été guéri. Ces attentions paroîtront minutieuses à ceux qui n'ont encore vu que peu ou point de malades, & sur-tout à ceux qui en ont vu beaucoup sans les observer ; en observant mieux, ils en sentiront l'importance.

§. 153. Mais ce que j'ai dit sur le danger des exercices violens, ne doit point persuader que je blâme l'exercice, & qu'il soit dangereux : bien loin de là, l'exercice, moyennant qu'il ne soit pas de nature à enflammer le sang & à le porter à la tête, est sans contredit l'un des moyens les plus prompts, les plus sûrs, les moins dangereux, de fortifier le genre nerveux, & d'en détruire la convulsibilité. GALIEN, & après lui bien d'autres Médecins, ont regardé l'exercice comme le principal remède de l'épilepsie ; il est vrai qu'il donnoit les plus grands soins à tout ce qui y avoit rapport ; il commençoit le matin par faire promener l'enfant au sortir du lit ; il réitéroit cet exercice avant le diner, & ensuite à d'autres heures ; mais il ne vouloit jamais que l'enfant

prit un exercice violent sans avoir, commencé par de plus doux; & non-seulement il ne le laissoit point le maître de prendre de l'exercice à son gré, mais il vouloit qu'on ne confiât le soin de le diriger à cet égard qu'à un homme très-entendu (e).

MR. BOERHAAVE a établi, comme une vérité incontestable, & l'expérience le démontre tous les jours, qu'une grande frugalité & un grand exercice guérissent cette maladie, que la gourmandise & l'inaction rendent incurable; mais, je le répète, cet exercice, qui guérit quand le corps est en bon état, & qu'on mene une vie sôbre, irrite au lieu de fortifier, & produit les accès au lieu de les détruire, quand les vaisseaux sont trop pleins de sang, que le malade est échauffé, & que le corps est dans un état de sécheresse; tant il est vrai que dans aucune maladie, il n'y a aucune règle générale, & qu'on ne peut dire, d'aucun article de la façon de vivre, du régime & des remèdes, cela convient dans

[e] *Consil. pro puero epileptic. Chart. T. X. p. 487.*

cette maladie ; la spécification des cas & des circonstances est toujours nécessaire , sans quoi l'on abuse des choses les plus utiles.

§. 154. C'est sur-tout les passions, qu'il est important de régir avec le plus grand soin : tout ce qui pourroit les mettre en jeu nuiroit à coup sûr , & l'on a déjà vu qu'elles étoient une des causes les plus fréquentes de l'épilepsie , & qu'elles en renouvellent très-fréquemment les accès.

§. 155. En faisant l'énumération des causes qui, en irritant les nerfs par leur âcreté , produisent l'épilepsie , j'ai marqué tout ce qu'on doit éviter dans cette maladie , & il seroit inutile de le répéter ici : je dirai seulement que , tout récemment , je viens de voir un jeune homme , à qui on a donné du suc de poireaux dans du lait , pour tuer des vers imaginaires , & que le lendemain matin il a eu un accès plus fort que ceux qu'il avoit eu auparavant. Mais je dois parler des odeurs.

Tous les épileptiques doivent les fuir avec beaucoup de soin ; toute odeur forte , quelle qu'elle soit , irrite , & cette irritation nuit ; plusieurs épileptiques

ne peuvent pas soutenir celle de l'ambre, du musc, de la vanille; & il y en a d'autres qui leur font un mauvais effet, moins marqué, sans être moins dangereux. Il n'y a que quelques années qu'on a vu périr une jeune demoiselle, en Allemagne, avec tous les symptômes d'un poison narcotique, pour avoir couché dans une chambre où il y avoit un bassin de violettes qui trempoient, & qui l'avoient remplie d'une odeur très-forte [f]. Le même accident manqua d'arriver à Londres, en 1764, par l'effet de différentes fleurs, à deux jeunes personnes; mais l'une, éveillée apparemment par l'angoisse, sentit son mal, vit celui de l'autre, & eut assez de force pour ouvrir la porte & la fenêtre, & jeter les fleurs [g]. Sans parler d'une foule d'autres observations sur les dangers des odeurs, qu'on peut voir réunies dans la savante dissertation de Mr. TRILLER, que je viens de citer, & qui toutes prouvent com-

[f] TRILLER, *de morte subita ex nimis violan. odore. Opuscul. T. I. p. 240.*

[g] Ibid.

bien elles sont nuisibles aux nerfs ; l'on a vu celle des renoncules de jardin produire l'épilepsie même [b].

L'on a vu plus haut qu'un jeune homme tomboit toutes les fois qu'il voyoit quelque chose de couleur rouge ; d'autres sont aussi affectés par d'autres objets singuliers, qui irritent leurs nerfs plus qu'on ne devoit s'y attendre ; il leur importe de les éviter.

§. 156. Quand on a prescrit tous les moyens propres à prévenir l'accès, c'est avoir fait la plus grande partie de l'ouvrage, & il y a bien des épileptiques à qui cette cure suffit ; je n'en ai point fait d'autres à la première femme dont j'ai parlé §. 74, ni dans bien d'autres-cas ; & Mr. TRALLES en rapporte deux exemples très-intéressans ; l'un est celui d'un jeune homme sanguin, sujet aux saignemens de nez, studieux, qu'une colere, suivie de beaucoup d'exercice dans un jour chaud, jetta dans une épilepsie, accompagnée des mouvemens les plus violens ; qu'il guérit radicalement, & sans aucun spécifique,

[i] *Ad. Cur. Nat. Decur.* 1. ann. 9. & 30. Obs. 92. p. 170.

par la saignée, les purgatifs anti-phlogistiques, les lavemens, le nitre, la tisanne d'orge, les bains de pieds; l'autre, celui d'une femme sédentaire, qui mangeoit beaucoup, buvoit beaucoup de biere, & qui fut prise d'une épilepsie, dont la première attaque parut devoir être mortelle, qui se reproduisit ensuite fréquemment, & qui parut dépendre d'un sang visqueux, qui engorgeoit les vaisseaux de la tête. Il la guérit: 1°. par une saignée dans le premier accès, pour empêcher qu'il ne dégénérât en apoplexie, & on la réitéra quelquefois dans la suite, 2°. par beaucoup de purgatifs, de nitreux, de savonneux, qui entretenrent une diarrhée pendant plusieurs semaines, par une grande sobriété & une diète très-austère, sans aucun spécifique, qui dans ce cas & le précédent, auroient certainement été nuisibles: ce ne fut qu'après plusieurs mois, qu'il conseilla les eaux de Spa, pour rétablir les forces [i]: mais on n'est pas toujours aussi heureux; il y a des malades dont le cerveau a acquis une

[i] *De Opio*, Part. III. Cap. 1. p. 23.

disposition épileptique si forte, qu'il ne suffit pas d'éviter avec soin tout ce qui peut l'irriter, il faut agir sur lui-même; & les moyens qu'on emploie pour cela sont ce qu'on appelle, les anti-épileptiques, ou les spécifiques, dont il est tems d'examiner les effets.

ARTICLE XXV.

Les spécifiques en général. La racine de Valériane.

§. 157. Parmi les remèdes auxquels on a donné ce nom, il y en a de véritablement utiles, d'inutiles & de dangereux. Je m'occuperai d'abord des premiers; j'indiquerai ensuite ceux des deux autres classes, pour dépouiller les uns d'une réputation mal acquise, & ôter aux autres une confiance dangereuse; mais sans rappeler ici ce que j'ai dit des anti-spasmodiques, dans le chapitre des remèdes des maux de nerfs, je dirai seulement, 1^o. que de tous ces remèdes, il n'y en a aucun qui mérite véritablement le nom de spécifique anti-épileptique, parce qu'il n'y en a aucun qui guérisse certainement

& constamment la disposition épileptique du cerveau , ni même aussi constamment que le kina guérit les fièvres d'accès , ou le mercure les maux vénériens , & qu'ainsi ils ne sont pas aussi spécifiques que ces derniers remèdes : 2°. que souvent cependant , s'ils ne réussissent pas , c'est parce qu'on néglige avant de les employer , de mettre le corps dans l'état dans lequel il seroit à souhaiter qu'il fût avant d'en faire usage : on les regarde comme spécifiques absolus ; on veut par - là même qu'ils guérissent toutes les épilepsies , on les ordonne indistinctement dans toutes , sans faire attention que toutes les causes ne sont pas de nature à être vaincues par leur effet , & que comme ils sont tous de la classe des fortifiants , si on les emploie dans le tems qu'il y a plethore , tension , sécheresse , disposition à l'inflammation , embarras dans les premières voies , putridité , obstructions , constipation , loin de faire du bien , ils font un mal réel & certain : on les essaie tous successivement ; tous nuisent , & tous auroient été utiles , si on avoit donné au corps la disposition qu'il devoit avoir. Quoiqu'on regarde le

mercure & le kina comme spécifiques des maux contre lesquels on les emploie , on ne les ordonne pas indistinctement dans toutes les circonstances ; on fait qu'il y en a beaucoup dans lesquelles ils nuiroient , on commence par les éloigner , on prépare le corps , on le dispose à n'être affecté qu'utilement par le remède , qu'on prescrit alors avec confiance & avec succès : les anti-épileptiques exigent les mêmes précautions ; mais qu'il me soit permis de le dire , de très-grands médecins ne font pas assez d'attention à cette observation : consulté pour une femme qui avoit eu auparavant , outre beaucoup d'autres , les conseils de deux des plus grands praticiens de l'Europe , dont l'un lui avoit ordonné la valeriane , l'autre les feuilles d'oranger , qui sont un remède efficace ; je vis que l'un & l'autre de ces remèdes , & tous ceux de la même classe , qu'elle avoit employé , lui avoient fait un mal réel , parce qu'on n'avoit pas fait attention qu'elle avoit le sang inflammatoire , qu'elle étoit plethorique , qu'elle avoit très-souvent la fièvre , & que les spécifiques qui augmentoient ces maux , lui nuisoient sensi-

blement : je lui conseillai une préparation de six mois, adaptée à ses circonstances, par les saignées, tous les rafraîchissans, les bains ; cette préparation même lui fit beaucoup de bien, & elle a pu prendre la valeriane avec le plus grand succès.

§. 158. Cette plante est celle qui mérite la première place sur le catalogue des meilleurs anti-épileptiques. Les autres remèdes les plus vantés, sont, la racine de pivoine, le guy de chêne, le musc, les feuilles d'orange, le kina, le castor, le succin, les gommes, sur-tout l'assa-fœtida, le camphre, quelques plantes odoriférantes, le fer, les eaux minérales, & parmi les remèdes composés, la poudre de guttete en France, celle du *marquis* en Allemagne.

§. 159. La racine de valeriane, déjà employée par ARETÉE, sous le nom de *phu*, *φευ*, & décrite par DIOSCORIDE [k], n'avoit pas toute la répu-

[k] La valeriane que nous employons actuellement, est *Valeriana Sylvestris*, & malgré quelques doutes de Mr. HILL, Mr. de HALLER juge que c'est la même employée par les anciens : on doit choisir celle qui

tation qu'elle mérite, quand **FABIUS COLUMNA**, d'une des plus grandes maisons de Naples, qui avoit le malheur d'être épileptique, & qui se fit botaniste, pour trouver dans les plantes un remède à son mal, rappella l'usage de cette plante. Il nous apprend dans son ouvrage (1) qu'elle le guérit parfaitement, & que l'ayant employée pour plusieurs de ses amis, elle les guérit aussi : mais cette observation importante, renfermée dans un ouvrage de botanique, que les médecins praticiens lisent peu, ne fut point aussi répandue qu'il auroit été à souhaiter, & cette

croît sur les endroits élevés ; elle a beaucoup plus de force : celle qui croît dans les endroits marécageux est celle qui en a le moins : celle des bois tient le milieu. La bonne a une odeur forte, pénétrante, tout-à-la fois agréable & désagréable, & qui, si on en flaire une grosse quantité à la fois, enivre ; mais elle ne doit point sentir le musc, cette odeur lui est étrangère, & ne lui vient que de l'urine des chats, qui en sont excessivement friands, & qui, si l'on n'y prend pas garde, vont la manger dans les endroits où elle sèche, & la salissent. *HILL on Valer.*

[(1) *Phytobazanos*, 4to. Neapolis 1592.

racine étoit très - rarement employée dans le siècle dernier ; plusieurs auteurs célèbres ne la nomment pas même parmi les remèdes anti-épileptiques. Elle ne resta cependant pas totalement ignorée ; DOMINIQUE PANAROLI , célèbre médecin de Rome , nous apprend dans un très - bon recueil d'observations publiées en 1643 , qu'il traitoit un pêcheur épileptique qui avoit deux ou trois accès par jour , & à qui ni la racine de pivoine , ni le crâne humain , ni le pied d'élan , ni les autres spécifiques les plus vantés , ne faisoient aucun bien ; ayant lu dans COLUMNA les bons effets de la valeriane , il l'ordonna à son malade , qu'il guérit parfaitement , & dans la suite il l'employa pour d'autres avec la même réussite [*m*]. CRUGER l'employa avec succès pour guérir deux épilepsies , produites l'une par la colere , & l'autre par la peur [*n*] ; & ROSINUS LENTILIUS guérit aussi

[*m*] *Jatrologismorum seu Medicin. historiar. pentecostæ quinque* , Romæ 1643. Pentecost. I. Obs. 33. page 20.

[*n*] *Ephemer. curios. Natural. Dec. 2. Ann. 7.*

par son secours une fille que la suppression des regles avoit jetté dans la même maladie [o]. Ces trois médecins sont les seuls dont les observations sur l'usage de ce remede à cette époque me soient connues : mais au commencement de ce siècle, Mr. MARCHAND, de l'académie des sciences, botaniste & praticien, rappella l'observation de COLUMNA, essaya la valeriane sur ses malades, & s'en trouva très-bien ; elle les soulagea presque tous, en diminuant la violence & abrégeant la durée des accès, & en guérit parfaitement quelques-uns. Le premier à qui Mr. MARCHAND l'ordonna, fut un jeune homme de seize ans, qui, depuis l'âge de sept ans, avoit toutes les semaines un accès, qui duroit au moins huit minutes, & il fut parfaitement guéri. Un autre jeune homme de vingt ans, qui, depuis l'âge de quatorze ans, avoit tous les mois un accès, qui duroit demi-heure, fut aussi parfaitement guéri ; mais Mr. MARCHAND avertit bien sagement qu'il faut souvent faire précéder des remedes qui préparent à cet usage, & dans

[o] Ibid. Dec. 3.

le premier cas, elle redoubla d'abord les accès, parce qu'il y avoit dans les premières voyes des embarras qu'il emporta par des purgatifs, après lesquels la valeriane eut le succès le plus prompt & le plus heureux; tant il est vrai qu'il n'y a aucun remede qui soit bon en toute circonstance, & que l'inattention à ces circonstances rend tous les jours les meilleurs remedes nuisibles. Les amis de Mr. MARCHAND, qui l'ordonnerent sur sa parole, s'en trouverent très-bien [p]. Mr. CHOMEL atteste aussi avoir guéri, par son secours, plusieurs épileptiques, un, entr'autres, âgé de douze ans, qui tomboit, depuis trois ou quatre ans, deux ou trois fois par mois, & auquel les accès avoient procuré un tremblement continuel [q]; il ajoute que SILVIUS la préféroit à la pivoine dans les maladies accompagnées de convulsions, & que Mr. TOURNEFORT en avoit vu les plus grands effets dans

[p] *Histoire de l'académie des sciences, année 1706.*

[q] *Abrégé de l'histoire des plantes usuelles, T. I. page 71.*

la passion hystérique & dans les accès d'asthme , sans doute convulsifs ; au moins j'ai guéri cette cruelle maladie par son secours. Mr. DE HALLER a guéri , par son usage , une jeune fille véritablement épileptique [1]. Mr. SCOPOLI a guéri une épilepsie de trois ans , produite par la frayeur , (l'une des causes les plus fâcheuses , dit Mr. DE HAEN), & dont les accès revenoient plusieurs fois par semaine , en faisant prendre tous les jours deux dragmes de cette plante en poudre , & deux livres de décoction [2]. Le même remede guérit parfaitement l'homme dont j'ai parlé plus haut , qui étoit constamment attaqué d'un accès d'épilepsie dans le moment même où il remplissoit les devoirs conjugaux , & cela depuis douze ans ; il avoit essayé inutilement plusieurs remedes ; la racine de valeriane , prise pendant trois mois en poudre & en infu-

[1] *Historia stirpium indigenarum Helv.*
Tome I. page 92.

[2] HAEN *Ratio medendi*, Part. 5 Cap.
4. §. 2.

sion, le remit dans un état naturel (t); enfin elle est heureusement devenue le remède de confiance de tous les médecins éclairés (u): je lui dois les gué-

(t) DE SAUVAGES, *Nosologia Method.* Class. 9. Art. 31. N°. 6. Tome II. p. 409.

(u) Mr. HILL en avoit fait un de ses spécifiques, & je ne me rappelle qu'un seul médecin qui paroisse la désapprouver; c'est ANDRÉE, (*cases of epilepsy*, p. 262.) "C'est," dit-il, "un des remèdes qui répugnent le plus à l'estomac, qui est déjà souvent détruit par de longs maux de nerfs, & qu'il acheve de détruire". Il est vrai que c'est un remède nauséux, & que presque tous les malades le redoutent: je ne l'employerois pas comme simple stomachique; mais je n'ai jamais remarqué, & je l'emploie tous les jours, depuis dix-huit ans, qu'elle dérangerait réellement l'estomac; & le goût d'amertume & d'astringence que la véritable valériane mâchée laisse à la bouche, suffit pour prouver qu'elle ne peut pas produire cet effet: elle occasionne, il est vrai, quelquefois, dans les commencemens, si on la donne à grandes doses, une légère angoisse, mais qu'on prévient par une dose moindre, ou en y ajoutant un peu de macis; & il faut faire attention à la remarque de M. HILL, c'est qu'on trouve quelquefois dans les boutiques, parmi la racine de valériane, de la racine de renoncule, qui est vénéneuse; & ce mélange doit sans doute endommager beaucoup l'estomac.

risons d'un grand nombre d'épilepsies essentielles, & tout récemment celle du premier malade dont j'ai parlé, §. 13. Je suis persuadé que quand elle ne guérit pas, c'est parce que le mal est incurable, & le vice des nerfs a leur origine plus fort que les remèdes.

§. 160. COLUMNA la donnoit en poudre; Mr. MARCHAND a adopté cette méthode; c'est celle que j'emploie toutes les fois qu'il est possible d'y déterminer le malade; & c'est sans contredit la plus efficace; l'infusion aqueuse n'est pas sans efficace; elle a fortement le goût & l'odeur de la plante; mais quand on ne veut pas employer la poudre même, sa préparation la plus efficace, c'est l'extrait spiritueux, qui est moins désagréable que la poudre, & conserve bien mieux le goût, l'odeur & la force de la plante, que l'extrait aqueux; quand il est bien fait, il est presque aussi efficace que la plante même, & il est quelquefois utile d'avoir les vertus semblables avec un peu moins d'activité, pour des sujets que tout remède actif éprouve, comme il est nécessaire souvent de donner l'extrait de kina à

ceux pour qui le kina est trop fort.

Je me suis beaucoup étendu sur cette plante, parce que je suis convaincu que jusques à présent, il n'y a aucun remède qui puisse lui être comparé dans l'épilepsie, & dans tous les maux de nerfs qui exigent des remèdes nervins fortifiants : elle pourroit seule tenir lieu de tous les autres, qui sont bien moins efficaces : je dois cependant en dire quelque chose ; mais je ferai auparavant ici une question : ne peut-il pas y avoir des spécifiques plus sûrs que la valeriane, & ne pourroit-il pas même y avoir un spécifique infailible ?

§. 161. Je réponds à la première partie de la question, que rien ne porte à croire qu'il ne puisse pas exister de remède plus efficace que la valeriane : Mr. DE HALLER, qui comme on vient de le voir, en fait grand cas, lui préféreroit même le *spica celtica*, qui a une odeur analogue & plus pénétrante, mais qui, jusques à présent, n'est point en usage [x] ; de façon que la valeriane est encore le premier des remèdes : il

[x] *Opuscula Pathologica*, Obs. 74.

est fort à souhaiter qu'elle perde bientôt ce rang.

Par rapport à la seconde partie, peut-il y avoir un spécifique infallible, tel que CRATON desiroit si ardemment qu'on le trouvât avant sa mort (y)? On peut répondre hardiment que non. Quand un charlatan croit l'avoir trouvé & l'annonce, il peut n'être qu'un ignorant présomptueux; mais quand il dit l'avoir vérifié, il devient vraisemblable qu'il est un imposteur. Mr. BOERHAAVE a bien exprimé cette vérité : “ L'on
 „ voit, dit-il, après avoir nommé
 „ les causes qui produisent cette mala-
 „ die, combien est futile l'orgueilleuse
 „ promesse de ceux qui se vantent d'a-
 „ voir un spécifique sûr (z)”. Mr.

VAN

(y) *Utinam ante vitæ meæ exitum veram hujus mali dignotionem & verum remedium quis ostenderet. Epistol. 137. ad ZWINGUERUM.* On doit même inférer de ces expressions, qu'il attendoit la connoissance des remèdes de celle des causes, & ne pensoit point à un spécifique universel; & cette idée est bien conforme à la sagesse, à l'habileté, au grand sens & à la grande pratique de ce médecin.

(z) *Aphorism. 1085.*

VAN SWIËTËN prouve en détail cette vérité, en commentant cet aphorisme ; & M. MORGAGNI n'est pas moins positif : il dit que la variété des causes prouve la difficulté & la variété du traitement (a).

Pour qu'un spécifique fût inmanquable, il faudroit qu'il donnât aux nerfs une fermeté, une insensibilité à l'irritation, qui ne se trouve pas dans l'homme le plus fort & le plus robuste, qui ne se trouve pas même dans les animaux, puisqu'ils sont sujets aux convulsions & à l'épilepsie ; une fermeté qui est vraisemblablement absolument incompatible avec leurs fonctions, & qui, supposé même qu'elle fut possible, ne pourroit s'acquérir que par des remèdes trop toniques sans doute, pour n'être pas dangereuse en lésant d'autres organes. Le plomb, qui paroît être le plus grand sédatif, est un vrai poison, & hasarder de l'employer pour l'épilepsie, ce seroit s'exposer à une mort cruelle, ou à des paralysies incurables, pires que le mal qu'on vouloit guérir ; ainsi, sans m'occuper plus long-

[a] Epistol. 9. §. 26.

tems de ces spécifiques impossibles, je reviens à ceux que l'usage a consacré.

ARTICLE XXVI.

Suite des spécifiques.

La pivoine, le guy, le musc, l'opium, les feuilles d'orangers.

§. 162. La racine de pivoine, si fort exaltée, est bien éloignée de mériter tous les éloges qu'on lui a donné. L'odeur seule de la fleur, qui est évidemment virulente, prévient contre toute la plante que M. DE HALLER dit lui être suspecte : celle de la racine fraîche a aussi quelque chose de narcotique & de déplaisant, avec un goût âcre, & plutôt acerbe qu'amer ; sèche, elle n'a plus aucune odeur, elle perd aussi son âcreté, & n'a presque aucune faveur : mais elle paroît alors si dépouillée de toute vertu, qu'on ne peut ni en craindre l'usage, ni s'en promettre aucun bon effet marqué, si ce n'est autant qu'on en tireroit une substance farineuse un peu nourrissante ; & on pourroit la comparer à la racine de ma-

nioc, qui, dangereuse pendant qu'elle est fraîche, peut, quand elle est sèche, devenir un aliment, mais n'est jamais un remède; ainsi on doit absolument l'abandonner, parce qu'il n'y a rien de plus nuisible que de se fier à des remèdes inefficaces.

Le guy.

§. 163. Le guy de chêne, ou tout autre guy, car ils ont tous les mêmes qualités [b], est célèbre depuis long-tems [c] dans la cure de cette maladie, & sa principale vertu réside principalement dans l'écorce & dans les feuilles, que la plupart des apothicaires rejettent pour ne donner que le bois. Le docteur *John. COLBACHT*, qui en a fait le sujet d'un petit ouvra-

[b] *HILL. on nerves*, p. 55.

[c] Les druides attribuoient déjà au guy les plus grandes vertus; c'est eux qui ont fait sa réputation & qui ont donné à celui de chêne cette préférence, qui n'a d'autre fondement que leur respect pour cet arbre sacré; la récolte du guy étoit une de leurs cérémonies religieuses, dont *PLINE* le naturaliste nous a conservé les détails. *Historia Mundi*, L. 16. Cap. 95. Tom. II. p. 42.

ge , dans lequel il rapporte quelques exemples de ses succès, le croyoit même aussi spécifique dans cette maladie que le kina dans la fièvre , mais avec bien peu de raison ; machélong-tems , il a une légère amertume aromatique qui se rapproche un peu du goût du noyau de pêche , & persuade aisément qu'il est cependant supérieur à la racine de pivoine , comme il l'est en effet ; quelques observations prouvent même qu'il n'est pas absolument sans efficace , quoique M. LEWIS , dans son excellent ouvrage sur la matiere médicale , paroisse n'en faire aucun cas [d].

Mr. BOYLE cite l'observation d'une femme d'un rang distingué , qui étant attaquée d'une épilepsie , presque héréditaire , pour laquelle elle avoit essayé inutilement tous les remèdes , fut enfin guérie parfaitement par l'usage seul du guy de chêne , dont elle prenoit une dragme tous les matins dans un peu d'eau de cerises noires ou de biere [e]. ANDRÉE dit

[d] *An experimental history of the materia Medica*, p. 574.

[e] *De utilitate natural. philosoph.* Part. II. Sect. 5. Cap. 7.

en, avoir vû une fois des effets sensibles ; mais dans tous les autres cas , il ne fit rien [*f*]. Mr. BOERHAAVE dit qu'il a souvent réussi dans la mobilité & dans les convulsions [*g*], & Mr. CARTHEUSER, qui a examiné avec beaucoup de soin la plupart des remèdes , avoue que pendant longtemps il avoit cru le guy un remède inutile , mais qu'encouragé par la dissertation du docteur COLBACHT, il l'avoit employé , & ne pouvoit que s'en louer , dans l'épilepsie & les autres maladies convulsives (*h*). Un empirique d'Erfort a distribué pendant quelques années un spécifique pour l'épilepsie , qui en a guéri quelques-unes , & qui n'étoit que de guy (*i*). Mr. JACOBI , médecin de Mayence , & Mr. LOESEKE , médecin de Berlin , s'en sont aussi servi avec succès (*k*). Mr. VAN SWIETEN lui-même pa-

[*f*] *Epilept. casus* , p. 261.

[*g*] *De morbis nervor.* p. 841.

(*h*) *Fundament. mater. medicæ* , Sect. 15. Cap. 27. Tom. II. p. 528. seconde édition.

(*i*) *Hanne de puero epileptico* , p. 39.

(*k*) VOGEL , *materia medicæ* , seconde édition , p. 279.

roit lui croire beaucoup d'efficace, & Mr. de HAEN le met dans la même classe que la valériane & la pivoine, & paroît attribuer les mêmes vertus à ces trois plantes (1); mais malgré toutes ces autorités, parmi lesquelles il y en a de respectables, en l'examinant bien attentivement, il ne m'a pas paru mériter assez de confiance pour que je l'aye employé souvent; il contient un mucilage avec quelque chose de tonique; les remèdes de cette espèce sont quelquefois utiles dans la mobilité; & ce que j'ai observé des effets du guy, me persuade qu'il n'est ni tout-à-fait inutile, ni fort efficace. J'ai donné quelquefois une décoction de guy par-dessus la valériane, & j'ai cru voir qu'elle en augmentoit les bons effets; ainsi je ne le proscrirois point comme la pivoine; mais en le conservant comme remède, il faut bien se garder de le regarder comme spécifique, & de le croire capable de guérir une maladie un peu grave.

(1) *Ratio medendi*, p. 5. Cap. 4. §. 2.

Le musc.

§. 164. Le musc est regardé depuis long-temps, comme un grand remede dans les maux de nerfs; j'en parle dans le chapitre général des remedes; on l'a essayé dans l'épilepsie, mais je ne connois qu'une observation bien constatée de ses bons effets dans cette maladie; elle est de Mr. MASSA, professeur de médecine à Rome, & elle mérite bien d'être rapportée. Il vit en 1759, une fille de dix-huit ans, d'un tempérament bilieux, qui, après plusieurs accès de fièvre quotidienne, tomba dans des accès terribles d'épilepsie qui revenoient aussi tous les jours; tous les remedes furent inutiles; le bain tiède occasionnoit des symptômes d'hydrophobie; la violence de la maladie étoit telle qu'elle luxa le poignet de la main droite, produisit un crachement de sang, & faisoit craindre à chaque instant, pendant la durée de l'accès, une apoplexie ou une suffocation mortelle: il ordonna le matin avant l'accès, dix grains de musc & un scrupule de nitre antimonié, mis

en bol avec l'extrait de camomille , & fit boire par-dessus un peu de thé ; l'accès vint un peu plus tard , & fut un peu moins fort ; on réitéra la même dose le lendemain matin , & l'accès n'est jamais revenu. La sueur n'eut aucune odeur de musc , mais les matieres fécales & l'urine la conserverent pendant quelques jours (m). Les succès de ce remede dans plusieurs cas convulsifs autorisent à croire fortement qu'il seroit utile dans quelques épilepsies , il l'a peut-être même été très-souvent , & a opéré un grand nombre de guérisons qui restent ignorées , parce que ceux qui font les plus belles cures , ne font pas toujours les plus empressés à les publier : je ne balance pas à conseiller de l'essayer ; je l'essayerai moi-même des que je trouverai des cas qui paroîtront l'indiquer ; mais l'on doit être bien attentif à ne pas l'ordonner pendant qu'il y a trop de sang , qu'il se porte avec force à la tête , que les premieres voyes sont sales , qu'il y a des obstructions , beaucoup de cha-

(m) *Journal étranger* , Juillet 1760. p. 225.

leur ; il aigriroit le mal au lieu de l'adoucir ; & je traite actuellement une malade qui en a fait la triste expérience ; il agit comme l'opium ; à une certaine dose il peut presque le remplacer ; ainsi l'on doit observer , en l'employant , les mêmes précautions qu'on emploie en ordonnant ce remède , qui étant vanté dans cette maladie par Paracelse , & conseillé par quelques médecins , comme SENNERT , VEDELIUS & d'autres , doit être examiné.

L'opium.

§. 165. Cet examen est aisé , quand on a lu l'ouvrage de Mr. TRALLÉS sur ce remède ; cet excellent homme a comparé les effets de l'opium , qu'il a si bien apprécié , aux différentes indications que présentent les différentes causes de l'épilepsie , & il a démontré de la manière la plus évidente qu'il nuisoit dans tous les cas , excepté dans ceux où une forte passion de l'ame produit les accès , ou les renouvelle , ou quand elle est l'effet d'une violente douleur qu'on ne peut pas détruire sur le champ , & à laquelle l'opium n'est

pas contraire. J'ai vû il y a plusieurs années, une fille, qu'un dépit amoureux jetta dans un des états les plus violens que je me rappelle d'avoir vû : quand on m'appella, il y avoit trente six heures qu'elle vomissoit ou faisoit des efforts continuels pour vomir, avec des angoisses affreuses; depuis quelques heures, les efforts ayant discontinué à deux reprises, elle avoit eu des convulsions très-fortes, avec perte de connoissance, ce qui forme l'épilepsie, ou délire; ce qui n'est pas rare dans les convulsions; j'essayai tous les calmans, les lavemens, les huileux, le demi-bain, la saignée, tout fut inutile; dix-huit heures après l'avoir vue, elle continuoit à être dans le même état; je ne vis que de grosses doses d'opium qui pussent la soulager; j'en ordonnai trente gouttes de deux en deux heures, jusques à ce que le mal fût moins violent; dès la seconde, les accès convulsifs ne revinrent plus; dès la troisieme, les vomissemens diminuerent, on éloigna les prises; la sixieme les emporta, tout le désordre nerveux cessa, & l'opium seul pouvoit le faire cesser; mais la secousse

que la machine avoit reçu, étoit si violente, que la malade tomba dans la plus grande foiblesse, & elle fut si obstinée, dès que les douleurs eurent fini, à ne recevoir aucun secours, qu'elle périt le sixieme jour, dans un état de délire ou de foiblesse, qui alternoient successivement.

§. 166. L'on a vû plus haut que les passions rappelloient souvent les accès; par-là même, quand un épileptique en a éprouvé de nature à lui en faire craindre un, il peut lui être utile de prendre un léger anodin, qui porte dans les nerfs le calme que la passion avoit troublé; je l'ai conseillé quelquefois à une femme chez qui cet effet étoit assez constant; quinze gouttes de laudanum dans de l'eau de tilleul, le prévirent à diverses reprises; mais son éloignement me l'a fait perdre de vue.

§. 167. La douleur vive peut aussi produire l'épilepsie, comme on l'a vû plus haut, & c'est le second cas dans lequel les anodins peuvent être utiles; il est certain qu'ils auroient convenu à la jeune fille dont parle LA MOTTE, à qui le calcul des reins donnoit des

accès d'épilepsie, & qu'ils auroient calmé les convulsions qu'un mal de dent produit par une dent cariée, occasionnoit à une jeune fille hystérique, dont parle Mr. VAN SWIETEN (n), comme je les ai vû très-souvent utiles dans l'épilepsie des enfans, produite par l'irritation des dents qui percent, & que tous les autres remèdes ne peuvent souvent pas appaiser, & dans des convulsions qui duroient depuis cinq jours, sans une heure entière d'interruption, chez une femme qui avoit appliqué sur ses dents, pour en calmer la douleur, une liqueur secrète apparemment très-forte, qui la jetta dans cet état; état qui, accompagné souvent de perte de connoissance, ne différoit point dans ces momens-là d'une véritable épilepsie. Mais, excepté dans ce petit nombre de cas, l'opium est évidemment dangereux dans cette maladie, & la plus légère attention à ses effets le prouvera (o).

(n) §. 234.

(o) ARISTOTE, & après lui AVERROES, avoient déjà dit que l'épilepsie se produisoit comme le sommeil, par une vapeur & par-

Les principales indications sont , de diminuer la plethore , il l'augmente ; de détourner le sang de la tête , il l'y porte ; de procurer une grande liberté de ventre , il constipe ; d'adoucir les humeurs , il les rend plus âcres ; & si l'on ouvre le cadavre des personnes mortes après une trop grande dose d'opium , on y trouve précisément les mêmes circonstances qu'on remarque dans ceux qu'un accès d'épilepsie a tué. L'on voit par-là même combien étoit peu raisonné l'avis d'AETIUS , d'AVICENNE (p) , & de quelques autres qui comptoient l'opium parmi les spécifiques de l'épilepsie ; & combien est dangereux le conseil de SENNERT , qui ordonnoit immédiatement avant l'accès , quand on pouvoit le prévoir , une pilule composée des trois quarts

là même , dit HERRS , observ. 24. les narcotiques & le vin ne conviennent pas ; l'explication qu'ils donnoient des phénomènes , étoit fautive , mais ils avoient bien raison de juger que dans le sommeil , comme dans l'épilepsie , il y avoit beaucoup de sang à la tête.

(p) Tetrabibl. 4. Serm. I. Cap. 96. Princ. Medic.

d'opium & d'un quart de camphre (q).

§. 168. DUCHESNE, plus connu sous le nom de QUERCETAN, donnoit son nepenthe, qui n'est qu'un opium aromatisé, comme le spécifique de l'épilepsie; & RIVIERE, praticien d'ailleurs très-sage, attribuoit aussi trop d'efficace à ce remède dans cette maladie. La fausse idée où l'on étoit alors sur les effets de l'opium, qu'on croyoit diamétralement opposés à ce qu'ils sont en effet, entretenoit sans doute cette erreur sur son usage, qui avoit cependant aussi, à la même époque, ses improbateurs, & BENZONI, dans ses *Canons pratiques*, le condamnoit absolument dans l'épilepsie, les convulsions & les autres maladies de la tête (r). Dès le commencement de ce siècle, ou plutôt dès la fin du dernier siècle, on a commencé à mieux connoître sa façon d'agir; alors on a, peu-à-peu, prof-

(q) *Medicin. Practic.* L. 1. Part. 2. Ch. 31. Tom. 1. p. 730.

(r) Je le cite d'après Mr. TRALLES, n'ayant point vu son ouvrage; voyez surtout cet article, Mr. *Tralles, de Opio*, p. 3. Cap. 1. §. 8.

crit son usage du traitement de l'épilepsie, & l'on verra ici avec plaisir une observation intéressante de Mr. SCARDONA. De grands hommes, dit-il, recommandant fortement l'usage de l'opium au commencement de l'accès (s), je voulus, étant encore jeune, essayer comment il réussiroit ; pour cela je l'ordonnai à une femme épileptique, qui avoit toujours des symptômes avant-coureurs de l'accès, sur-tout un violent mal de tête & un obscurcissement de la vue, dès qu'elle se donnoit un peu de mouvement ; elle le prit le soir ; le lendemain matin le mal de tête paroissoit plus sourd, mais l'obscurcissement de la vue étoit augmenté (t), & l'accès vint plus tard, il est vrai, qu'à l'ordinaire, mais beaucoup plus violent & tel qu'il mit la vie de la malade dans le plus grand danger (u). Après avoir parlé de la

(s) L'on formeroit malheureusement un gros volume des erreurs dangereuses des grands hommes.

(t) Ces deux changemens prouvent également une plus grande compression sur le cerveau produite par l'opium.

(u) *Aphorismi de cognos. & curand. morb. Lib. 1. Cap. 8. §. 14.*

graine de jusquiame, il finit ce paragraphe par déclarer, que quelques éloges qu'on ait donné aux anodins, il est persuadé qu'on ne doit jamais les employer dans cette maladie. (x). Mais cette règle générale, outre les exceptions que j'ai indiqué plus haut, peut encore en souffrir dans d'autres cas particuliers qu'on ne peut point assigner à l'avance, mais que la sagacité d'un habile médecin lui fait découvrir; tel est celui que rapporte Mr. de HAEN, & que j'ai promis plus haut.

§. 169. Cette observation est intéressante par plusieurs endroits, & surtout par cette singularité remarquable; c'est qu'il a fallu employer le sommeil artificiel pour remédier au mal que produisit le sommeil naturel.
 „ Si quelquefois, dit l'habile médecin, à qui on la doit, cette maladie
 „ qui prend tant de formes, élude tous
 „ nos efforts, d'autres fois elle montre, comme en secret, aux observateurs attentifs, les moyens de la
 „ guérir; en voici un exemple bien

(x) *Si quid sentio, via, ita me deus amet ac ne vix quidem istius generis medicamentis utendum traderem.* Ibid.

„ sensible. Un enfant de six ans, très-
 „ bien portant, fut si fort effrayé par
 „ un dogue qui lui sauta dessus, qu'il
 „ eut des convulsions pendant trois
 „ jours entiers, & il lui resta des
 „ accès d'épilepsie qui revenoient pres-
 „ que tous les jours; le mal résista à
 „ tous les remèdes qu'on employa pen-
 „ dant six ans, ensuite il s'adoucit
 „ un peu par un remède secret; mais
 „ augmenté par une nouvelle peur,
 „ il ne reçut plus aucun soulagement
 „ du même remède; il l'attaquoit tous
 „ les jours, & quelquefois plusieurs
 „ fois dans le même jour; enfin on
 „ m'amena le malade, je lui ordon-
 „ nai, pendant trois semaines la va-
 „ leriane qui parut l'aigrir; & pour
 „ l'observer plus attentivement, je le
 „ fis entrer à l'hôpital; on remarqua
 „ qu'il avoit des commencemens d'ac-
 „ cès plus de vingt fois par jour,
 „ mais que l'accès n'étoit complet qu'u-
 „ ne ou deux fois; le castor & les au-
 „ tres remèdes fétides & spiritueux
 „ furent absolument inutiles, les ac-
 „ cès les plus terribles étoient toujours
 „ diversifiés, quelquefois tout le corps,
 „ d'autres fois seulement la moitié,

„ étoient en convulsion , & l'autre
 „ moitié dans un état de rigidité to-
 „ tale ; quelquefois c'étoit un opisto-
 „ tonos , d'autres fois un emprostoto-
 „ nos ; une fois les convulsions étoient
 „ très-violentes dans les jambes , une
 „ autre fois si fortes dans les mains
 „ qu'elles les portoient sur le visage
 „ & la poitrine avec tant de force , que
 „ si on ne lui avoit pas donné des
 „ soins , il se seroit violemment meur-
 „ tri : il avoit dans chaque accès une
 „ sueur très - puante , si abondante
 „ que le lit en étoit mouillé , & si tena-
 „ ce qu'elle colloït comme glu ; il y
 „ avoit souvent un écoulement abon-
 „ dant d'urine.

„ La maladie alloit de mal en pis ,
 „ & il y avoit des signes évidens d'u-
 „ ne raréfaction que la nature démon-
 „ tra par une abondante hémorragie
 „ des narines ; il en avoit déjà éprou-
 „ vé d'autres fois , & sa mere m'avoit
 „ averti que les accès qui les avoient
 „ suivis , avoient toujours été plus
 „ fréquens & plus forts ; cependant
 „ les symptômes paroissant l'indiquer ,
 „ je lui fis faire deux saignées au pied ,
 „ & je lui donnai des délayans & des

» calmans ; mais j'eus le chagrin de
» voir le mal augmenter : heureuse-
» ment un jour enseigne l'autre , & à
» force d'observer , je remarquai conf-
» tamment que les accès étoient beau-
» coup plus fréquens , quand l'enfant
» étoit couché & dormoit , (ce qui
» lui arrivoit fréquemment ,) que
» quand il étoit assis ou éveillé ; cet-
» te observation me détermina à le
» faire tenir sur un siege la plus gran-
» de partie du jour , & à l'entretenir
» éveillé par différens moyens qui l'af-
» fectoient agréablement ; par - là je
» rendis peu-à-peu les accès plus ra-
» res , mais il avoit beaucoup de dif-
» fosition au sommeil , & enfin je re-
» marquai que l'accès ne l'attaquoit
» que pendant qu'il étoit endormi , &
» jamais quand il étoit éveillé. La
» cause de cette terrible maladie trou-
» voit-elle donc plus de facilité à agir
» sur les nerfs dans l'état du sommeil
» que pendant que la veille les tenoit
» agités ? Ce qu'il y a de certain ,
» c'est que l'expérience prouvoit , que
» plus nous pouvions tenir le jeune
» homme éveillé , plus les accès étoient
» rares , & par ce moyen nous pou-

„ vions souvent l'en exempter pen-
 „ dant le jour ; mais enfin comme il
 „ falloit dormir , nous ne pouvions
 „ point éloigner ceux de nuit. Cette
 „ observation me fit naître une idée ;
 „ il n'a point d'accès , dis-je , pen-
 „ dant la veille , mais il en a , quand il
 „ est dans le sommeil , qui est tou-
 „ jours stertoreux ; la cause cachée
 „ de ce mal a donc plus d'action sur
 „ les nerfs pendant ce sommeil sterto-
 „ reux que pendant la veille , & ce
 „ ronflement même prouve que le
 „ sommeil n'est pas naturel ; ne pour-
 „ roit-on donc pas , continuai-je , ren-
 „ dre les nerfs insensibles par l'opium ;
 „ mais d'un autre côté , n'y auroit-il
 „ point de dangers à donner de l'o-
 „ pium avec cette disposition sterto-
 „ reuse ; ne courroit-on point risque
 „ ou de lui procurer un sommeil éter-
 „ nel , ou de le rendre imbécille ? On
 „ n'aura au moins rien à craindre en
 „ commençant par donner une très-
 „ petite dose , je l'essayai ; la premie-
 „ re n'augmenta point le penchant au
 „ sommeil , mais elle parut faire du
 „ bien ; j'augmentai la dose avec pru-
 „ dence , il ne vint plus d'accès ; le

„ sommeil devint très-naturel , & nous
 „ rendimes l'enfant à ses parens , agile ,
 „ gay , & très-bien portant. Il continua
 „ à jouir d'une bonne santé pendant
 „ trois mois , & mourut au bout de ce
 „ tems de la diffenterie (y).

Les feuilles d'orangers.

§. 170. Les feuilles d'orangers font un autre remede qui a acquis de la célébrité depuis quelque tems. Il y a douze ou treize ans qu'un charlatan inconnu les porta à la Haye , comme un secret qu'il vantoit dans tous les maux de nerfs , & sur-tout dans l'épilepsie , il les donnoit en chocolat ; & ce chocolat dont j'ai bû n'étoit point désagréable ; ou en décoction. Mr. WESTERHOF & Mr. VELSKE , célèbres praticiens à la Haye , l'essayèrent & lui trouverent assez d'efficace pour en envoyer à Mr. DE HAEN , qui l'essaya sur une fille de dix-huit ans , tourmentée de convulsions affreuses , qui fut parfaitement guérie (z).

(y) HAEN , *Ratio Medendi* , Pars 5. Cap. 4. §. 3.

[z] Idem. Pars 6. Chap. 7. §. 4.

Mr. VINCEL , célèbre oculiste , établi alors à Vienne , lui apprit que ce secret n'étoit que des feuilles d'orangers , & Mr. VELSE le lui confirma. On en fit cueillir , on en distribua dans tous les hôpitaux de Vienne , on en donna en poudre & en infusion , il opéra utilement ; mais les succès les plus marqués furent à l'hôpital *de St. Marc* ; Mr. LOCHER , qui en étoit le médecin , rassembla plusieurs épileptiques , il essaya tous les remèdes vantés , il n'en trouva point d'équivalent à la feuille d'oranger ; elle modéra la violence des accès chez les uns , elle les éloigna chez d'autres ; elle en guérit absolument quelques-uns (*a*) Mr. VAN SWIETEN , Mr. STORK , l'ont aussi donnée avec succès (*b*) , & Mr. HANNES , médecin à *Vesel* , guérit par son secours un enfant épileptique dont la maladie avoit résisté à tous les autres remèdes (*c*). J'ai

(*a*) LOCHER , *Observat. practic. circa luem Vener. epileps.* 8^o man. Cap. 2. pag. 56.

(*b*) CRANTZ , *Mater. Medic. Pars. I.* pag. 31.

(*c*) *De puero epileptico* , pag. 55.

employé les feuilles d'orangers dans l'épilepsie, dans les convulsions, dans les vapeurs. J'ai vû que dans l'épilepsie, elles faisoient quelquefois du bien; je n'ai pas vû qu'elles guérissent, & je suis convaincu qu'elles sont fort inférieures à la racine de valeriane. Si le succès de ces deux remedes dans l'hôpital de St. Marc à Vienne, a été différent, je suis porté à croire que c'est parce que la valeriane étant un remede beaucoup plus actif, peut avoir agi comme irritant sur des sujets qui n'avoient peut-être pas été préparés assez long-tems à son usage, & pour qui le lieu même où on les traitoit, n'avoit pas permis de se servir des moyens que j'ai indiqué plus haut, comme indispensablement nécessaires, pour l'employer avec confiance. Je les ai vu réussir quelquefois dans les simples convulsions, & leur usage en tisanne fait le plus grand bien à la femme la plus mobile que j'aye vu, & que beaucoup d'autres remedes irritent. Je les donne en poudre à la dose de demi dragme jusques à une dragme, trois ou quatre fois par jour, & en tisanne je fais bouillir une demi-once de ces

feuilles avec vingt onces d'eau, pendant un quart d'heure, pour la dose du jour; ainsi les feuilles d'orangers font un bon remède; leur saveur même devoit le faire présumer; mais ce n'est point un spécifique dans l'épilepsie, & Mr. LOCHER lui-même en convient.

ARTICLE XXVII.

Le kina, le fer, le camphre, le castor, l'assa-fetida, la rue, &c.

§. 171. Le kina, joint au mercure, guérit, comme on l'a vu plus haut, d'après HEISTER, une épilepsie vermineuse, que les autres remèdes n'avoient pu guérir. TOZZI, GRAINGER, FULLER, ELLER, s'en sont aussi servi avec le plus grand succès dans cette maladie; Mr. LOCHER dit s'en être bien trouvé & l'emploie souvent. Je l'ai employé plusieurs fois, & j'en ai vu d'heureux effets, je lui dois même en entier deux guérisons, mais la périodicité exacte que la maladie observoit dans ces deux cas, tout comme dans celui que décrit Mr. GRAINGER

GRAINGER dont le malade avoit un accès tous les six jours (*d*); la foiblesse d'estomac , l'atonie , qui existoient dans les autres cas dans lesquels je l'ai employé , me convinquent que le kina doit être employé avec confiance dans les épilepsies qui dépendent de quelqu'une des causes que je viens d'indiquer , mais qu'il n'a point de vertu anti-épileptique décidée ; & que quand il s'agit de remédier au vice du cerveau , à cette disposition proégumene , qui est la base de la maladie , il est bien inférieur à la valeriane : je le crois même en général , fondé sur plusieurs observations , inférieur au fer dans tous les maux de nerfs , & ce dernier remède qui est le plus puissant des fortifiants , trouve aussi souvent place dans la cure de l'épilepsie , quand elle est accompagnée de quelques-unes de ces maladies auxquelles le fer & le fer seul remédie.

Les eaux minérales chalibées qui sont dans quelques cas , la préparation martiale la plus utile , & qui ont quelquefois du succès dans l'épilepsie

(*d*) *Febris anomala Batava* , p. 112.

qui dépend de l'atonie des premières voyes, ne doivent cependant être ordonnées qu'avec prudence. Le principe spiritueux qu'elles renferment, qui porte si fortement les humeurs dans les rameaux des carotides, qu'il enivre quelques personnes & donne des maux de tête à d'autres, est une forte contr'indication pour les employer dans cette maladie. J'ai vu des épilepsies augmentées par les eaux de *Pyrmont* & de *Spa*, qu'on avoit annoncé comme des spécifiques inmanquables ; & il est démontré par la raison & par les faits, qu'autant qu'elles peuvent faire de bien dans quelques épilepsies sympathiques, autant elles peuvent nuire, quand le siège du mal est dans la tête.

Le Camphre.

§. 172. Parmi les remèdes proprement dits anti-épileptiques, le camphre, le castor, l'assa-fœtida, la ruë, tiennent aussi des rangs distingués.

Il n'est pas douteux que le camphre ne soit un remède très-efficace, ses succès dans plusieurs maladies aiguës & chroniques sont incontestables ; son

action sur les nerfs est bien démontrée , & Mr. ALEXANDER a même prouvé , par une belle observation , qu'elle étoit si forte , quand on le donnoit à grande dose , qu'elle pouvoit devenir très - dangereuse (e) ; ainsi , on pourroit conclure à l'avance , qu'il peut être utile dans l'épilepsie , & son odeur , analogue à celle de la valeriane , quoique différente , leurs effets semblables dans plusieurs autres maladies , augmentent les espérances qu'on peut en concevoir dans celle-ci & que l'expérience justifie : Mr. HANNES , dit avoir souvent donné aux épileptiques , avec succès , une teinture camphrée , composée d'une once & demi de grains de kermès & autant de camphre , dans vingt onces d'esprit-de-vin , connue sous le nom de teinture

(e) Deux scrupules de camphre pris tout à la fois , lui donnerent du mal-aïse , de la foiblesse , de l'abattement , de l'embarras de tête , un trouble total de vue , une perte de connoissance , de fortes convulsions , des défaillances , un pouls très - vite , & il fut près de trois heures dans un état dangereux. ALEXANDER *experimental essays* , &c. page 159.

épileptique de PIERRE (*f*), & Mr. LOCHER a vu les plus heureux effets d'une teinture de camphre bien mieux composée, & dont il dit qu'il est incroyable quelle efficace elle a dans le traitement de l'épilepsie (*g*); il guérit par son seul usage un malade, qui depuis trois ans étoit attaqué d'une épilepsie atroce; j'ai vû de bons effets du camphre, sans pouvoir lui attribuer aucune cure épileptique, mais je n'en ai jamais donné plus de dix grains à la fois, & j'ai soin que la dernière prise soit toujours donnée avant les quatre heures du soir: j'ai remarqué depuis long-tems, que donné plus tard, il procure souvent des nuits inquiètes.

Le Castor.

§. 173. La réputation du castor a beaucoup diminué depuis un siècle.

(*f*) *De Puer. epileptic.* page 47.

(*g*) ℥. Camphor. dr. β. facar. canar., mucilag. gumm. arab. aa. dr. i. his invicem in mortar. marm. trit. add. acet. calid. ℥β. aq. flor. samb. ℥vj. sirup. flor. pap. rhead. ℥β. *Observat. pract.* p. 42. Le vinaigre n'est peut-être pas moins utile que le camphre.

RIVINUS est le premier qui ait douté des grands effets qu'on lui attribuoit & qu'il n'opéroit pas, il vouloit même qu'on le proscrivit des pharmacies, où il ne fert, dit-il, qu'à répandre une mauvaise odeur (*b*). STAHL n'en pensoit pas plus favorablement, & JUNCKER, son élève & l'expositeur de sa doctrine, le condamne expressément dans l'épilepsie & dans les vapeurs, parce, dit-il, que s'il soulage pour quelques momens, il laisse ensuite de plus grands maux, sur-tout un grand embarras de tête & des angoisses à l'estomac (*i*). NEUMAN, qui a si bien analysé tous les remèdes, le croit incapable d'opérer les effets qu'on lui attribuoit (*k*); & Mr. ALEXANDER conclut d'après ses expériences, (il est vrai qu'il paroît tirer trop vite des conclusions générales), que le castor ne mérite point

(*h*) *Censur. Medicam. officinal.* Cap. 2. §. 8.

(*i*) *Conspectus Medic. theoret. pract.* Tab. 37. Caut. 35. & Tab. 55. Caut. 5.

(*k*) *The chemical Works of Gasp. NEUMAN*, page 566.

une place sur la liste des médicamens ;
„ d'après les observations les plus exac-
„ tes que j'aie pu faire , dit-il , & ce
„ que j'ai appris de celles des autres ,
„ on ne peut espérer aucun bénéfice
„ sensible du castor dans les maladies
„ spasmodiques (1). ” Le peu de suc-
cès que je remarquai de ce remède
dans les premières années que je l'em-
ployai , m'en dégoûta ; j'en ai fait dès-
lors très-peu d'usage , & toujours plu-
tôt par essai & en l'observant attenti-
vement que par confiance ; mais je
n'ai jamais rien vu qui ait pu me faire
changer d'idée ; d'ailleurs , le vrai cas-
tor est rare ; il conserve peu en subs-
tance , sa teinture spiritueuse distillée ,
& son extrait aqueux , sont sans for-
ce , & il n'y a que son extrait spiri-
tueux , qui peut servir à conserver ce
qu'il y a d'utile ; ainsi sans lui ôter
absolument toute efficace , comme il
est souvent sophistiqué , qu'il se conser-
ve mal , qu'il est excessivement désa-
gréable , & qu'on a beaucoup de re-
mèdes qui ont les mêmes qualités dans
un degré fort supérieur , je pense comme

(1) *Expérimental Essays* , page 87.

RIVIN, qu'il feroit à fouhaiter qu'on le proscrivit.

L'assa-fetida.

§. 174. L'assa-fetida, à laquelle on peut joindre les autres gommes qui ont des vertus assez rapprochées, mais plus foibles, sur-tout dans les maux de nerfs, est un remede véritablement efficace dans plusieurs de ces maladies, & dont j'ai vû les plus grands effets, sur-tout dans quelques asthmes convulsifs; elle est très-utile dans l'épilepsie, quand il y a une complication de viscosité dans les humeurs, d'obstruction dans les premieres voies, ou un principe vermineux; on peut dans plusieurs cas l'allier à la valeriane; mais il faut faire attention, que, comme toutes les gommes, elle porte un peu à la tête, & se souvenir de l'observation de Mr. BURGRAVE, qui a fait remarquer le premier que, pendant qu'on faisoit usage des gommes, on étoit très-sujet à voir des étincelles devant les yeux (m); symptôme auquel les épileptiques

(m) *De aere, aquis & locis Francofurtensib.*

sont sujets ; ce qui exige bien des attentions, avant que de se déterminer à leur en donner des doses un peu fortes.

La Ruë.

§. 175. La ruë est recommandée depuis très-long-tems ; ALEXANDRE *de Tralles* la vante déjà ; il est vrai qu'il paroît que c'est plutôt pour faire revenir de l'accès par son odeur forte, que pour guérir du mal ; depuis lui cependant jusques à nous, l'eau distillée de ruë est entrée dans la plupart des potions anti-épileptiques , & il est certain qu'on doit espérer des effets sensibles d'un remède aussi actif ; peut-être même cette grande âcreté, qui enflamme les mains, si on le manie long-tems , devrait faire préférer l'esprit spiritueux qui conserve toute la force du remède , & n'en perd que la fétidité , & qui dans plusieurs cas, où il y auroit des indications dont j'ai parlé à l'article de l'*assa-fœtida*, seroit extrêmement utile , mais auquel je ne crois rien de spécifique, n'ayant vu aucune observation qui me le persuade, &

ne l'ayant point essayé dans cette vue, parce qu'on ne peut point employer un si grand nombre de remèdes, & que je n'aime à sortir de ceux dont j'ai bien constaté l'efficacité, que pour en employer de nouveaux qui paroissent munis d'excellens certificats.

Le mercure, l'antimoine.

§. 176. Le cinabre n'est pas à beaucoup près aussi efficace que la plupart des derniers remèdes, & tous les éloges qu'on lui a donné, n'augmentent point sa vertu; il entre dans presque toutes les formules presque innombrables (n) des remèdes anti-épileptiques, & je ne connois cependant point de cures qu'on puisse lui attribuer; aussi Mr. TRALLES a bien démontré que c'est un de ces remèdes que l'on doit proscrire; mais il y a des cas dans les-

(n) Mr. TRILLER a pris la peine d'en réunir 17. [*Dispensatorium Universale*], aussi mal composées les unes que les autres, & qui ne sont que des ressassements de celle de Gut-tette. On est affligé que ce savant médecin ait ainsi perdu un tems qu'il pouvoit employer plus utilement.

quels le mercure, donné sous une forme capable d'action, est nécessaire dans l'épilepsie, & produit de grands effets : il est même le seul vrai remède, quand la maladie est l'effet du virus vénérien ; & Mr. LOCHER rapporte une observation qui le prouve : “ Dans le
„ tems , dit-il , que je faisois des
„ épreuves du sublimé corrosif , pour
„ les maux vénériens , il se présenta
„ un homme qui avoit la vérole &
„ l'épilepsie , & qui portoit au crâne
„ un tophus considérable ; je lui ordonnai hardiment le remède , pendant l'usage duquel les accès se renouvelèrent souvent ; mais dès que
„ le tophus fut ouvert , ils ne reparurent plus ; le tophus se dissipa , la playe se cicatrisa , & il fut guéri des
„ deux maladies (o)”. Le mercure est encore utile dans les cas où l'on a lieu de croire que le mal est produit par quelque engorgement , par une humeur dartreuse , ou par une acreté non caractérisée de la lympe ; & j'ai guéri un malade dans ce cas , par l'usage du mercure doux & des purgatifs ,

(o) *Observation. Prædica*, page 41.

fans aucun autre remede ; je ne lui donnai du kina qu'après la guérison, pour le fortifier. C'étoit un jeune garçon de onze ans, qui avoit souvent pendant six mois beaucoup de boutons sur tout le corps, avec des démangeaisons, & se portoit fort bien ; quand les boutons disparoissoient, il étoit dégoûté, foible, languissant, & avoit des accès ; mais ce n'est que dans des cas semblables, ou dans des cas vermineux que le mercure guérit l'épilepsie ; il n'est point anti-épileptique. Quand quelques médecins, dans le seizième & dix-septième siècle l'ont proposé, c'étoit sans indications précises, & à ce qu'il paroît sans expériences, comme un remede puissant, qu'il falloit par-là même essayer dans les cas désespérés ; & quand WILLIS assuroit que la salivation mercurielle guériroit complètement l'épilepsie, c'étoit une assertion théorique démentie par l'expérience ; il déclare lui-même ailleurs, qu'elle est dangereuse dans les maladies convulsives. DESAULX, (p) qui avoit promis un traité de

(p) *Maux vénériens*, page 197.

Pépilepsie , dans lequel il développeroit une méthode fort courte & fort simple pour la guérison , mais que malheureusement il n'a jamais donné ; s'étoit convaincu de son inutilité , par les observations ; s'il avoit cru que le mercure , qui étoit son remède favori , pût être le spécifique de cette maladie , il ne l'auroit sûrement pas décrié. DOLOEUS avoit vu les convulsions & l'épilepsie être une suite de l'usage du mercure (q) , & étoit bien éloigné de l'en croire le remède. Ce n'est que depuis quelques mois que Mr. HOUSSET l'a proposé comme le remède le plus actif & le plus prompt qu'on puisse imaginer dans la nature , pour la guérison radicale de l'épilepsie idiopathique ; si vous exceptez , ajoute Mr. HOUSSET , les vices de conformation du cerveau , ou les calculs , qui quelquefois se forment dans ce viscere , ou enfin les extravasations qui succèdent à des coups donnés à la tête : je demande quelle est la cause évidente ou cachée que le mercure ne pourra pas combattre avec succès (r) ?

(q) *Encyclopedia Medic.* Chap. 15. p. 303.

(r) *Dissertation sur les parties sensibles du corps humain* , &c. pag. 72. 1769.

Mr. HOUSSET appuye cette proposition d'une observation qu'il fit sur un jeune homme qui , dès l'âge de douze ans , avoit éprouvé de forts accès de migraine , qui paroissoient partir de la partie antérieure & inférieure du coronal , & qui , à l'âge de dix-sept ans , se changerent en accès d'épilepsie , qui commençoient comme ceux de la migraine , par des étourdissemens , pendant lesquels il voyoit comme des bluettes & des chandelles. Les accès étoient violens , le malade perdoit dans l'instant la connoissance ; il en eut huit plus considérables que les autres , depuis la fin de Janvier 1756 jusqu'au mois de Juillet 1758. Les saignées , les évacuans , les anti-épileptiques , parmi lesquels étoient la valeriane , le guérirent pour un an ; au bout de ce tems les accès revinrent ; Mr. HOUSSET se détermina à employer le mercure ; il saigna le malade , le fit baigner , le purgea , & ensuite lui donna des frictions qui le firent saliver pendant trois mois & demi. Depuis lors il n'a plus eu d'accident , & est mort d'une autre maladie trois ans après. Cette observation est intéressante ;

mais prouve-t-elle que le mercure soit le spécifique de l'épilepsie idiopathique ? Je suis fort éloigné de le penser : aucun médecin ne le croira ; tous jugeront que s'il a fait du bien , c'est comme apéritif , en détruisant un principe d'engorgement qui existoit vraisemblablement à la partie antérieure & inférieure du cerveau. Il y a beaucoup d'épilepsies dans lesquelles cette méthode nuirait , & ceux qui ont vu combien les frictions mercurielles irritent le genre nerveux , comme je l'ai dit ailleurs (s) , ne pensent pas qu'elles soyent le spécifique des maux de nerfs ; quand elles les guérissent , c'est en détruisant la cause qui les irritoient , causes parmi lesquelles on peut compter le virus vénérien. *Homob. PISO* guérit par la salivation un homme , que ce virus avoit jetté dans l'épilepsie (t) , & *Mr. SCARDONA* rapporte

(s) J'ai déjà cité plus haut l'observation de *DOLOEUS* , & on en trouve plusieurs autres qui confirment les mêmes craintes. *HOFMAN* , de *inscuris remediis* , §. 21. parle du mercure comme pouvant produire l'épilepsie chez les personnes foibles.

(t) *De regimine magnor. auxil.* Cap. 4.

l'histoire d'une veuve qui, à l'âge de trente ans, fut attaquée d'une épilepsie, dont les accès revenoient presque tous les jours deux ou trois fois. Les remèdes ordinaires, loin de la soulager, rendoient les accès si violens, qu'on craignit pour sa vie, sans que ce danger la déterminât à avouer son état; une violente ardeur d'urine la décéla, & Mr. SCARDONA l'ayant pressée, elle avoua que le mal avoit commencé par une gonorrhée, qui avoit été suivie de chancre dans la bouche & de l'épilepsie, dont la salivation la guérit parfaitement (u). Dans l'observation rapportée par Housset, & qui ne paroïsoit pas dépendre du virus vénérien, il faut compter l'effet de la saignée & des bains, qui firent peut-être autant de bien que le mercure.

§. 177. L'on doit placer après le mercure les préparations antimoniales, & sur-tout le soufre doré & le kermès minéral qui lui est préférable. Je m'en suis servi très-souvent avec succès dans l'épilepsie, mais sur-tout

[u] *Aphor. de cognof. & cur. morb. L. 1. Cap. 8. page 163.*

pour les enfans au-deffous de l'âge de dix ans; il détruit les matieres glaireuses , il déobstrue , il ouvre tous les couloirs , & enfin il fortifie réellement les nerfs; ce qui remplit toutes les indications qui se présentent le plus ordinairement dans plusieurs cas. L'union du mercure & de l'antimoine est quelquefois utile dans les maux de la même espece ; & le Dr. KINNEIR rapporte une bien belle cure , opérée par l'usage du mercure doux & du soufre doré , réunis suivant la méthode du Docteur PLUMMER ; c'est celle d'un jeune homme de dix-huit ans qui avoit souvent trois ou quatre accès par jour , & chaque accès d'une heure; les évacuans , les vésicatoires , les nervins , le kina même & la valeriane , employés pendant neuf mois , n'avoient produit qu'un bien léger amendement; le remede de PLUMMER le guérit dans un mois [x].

[x] KINNEIR *d new essay on the nerves*, page 178-

ARTICLE XXVIII.

Spécifiques inutiles.

§. 178. Une grande quantité d'autres plantes qu'on appelle nervines, & leurs conferves, ou leurs eaux distillées, entrent aussi dans la liste des remèdes anti-épileptiques; telles sont les eaux de fleurs d'orange, de mélisse, de tilleul, de romarin, & une foule d'autres, mais qui méritent à peine le nom de remèdes dans ce cas, & ne sont utiles qu'à servir de véhicule à des remèdes qui ont plus d'efficace.

De tout ce que je viens de dire, on peut conclure que de tous les remèdes anti-épileptiques, vantés comme spécifiques très-sûrs par de bons auteurs, 1°. la valériane, les feuilles d'orange, le musc, le camphre, sont les seuls auxquels on puisse donner ce titre, & que sans aucun doute, la valériane est celui des quatre qui le mérite le mieux; 2°. que le guy & la racine de pivoine, si fort vantés, leur sont fort inférieurs; que la racine de pivoine sur-tout n'a presque aucune

efficace , & que c'est perdre le tems inutilement que de l'ordonner aux épileptiques ; 3°. que le kina, le fer [y] , les eaux minérales , peuvent être très-utiles dans de certaines circonstances , & peuvent guérir radicalement le mal en emportant la cause ; 4°. que l'on pourroit bannir le castor , & que l'assa-fœtida , les autres gommes , la ruë , sont tout comme le kina , le fer , les eaux minérales , plus indiqués par les circonstances du mal que par le mal même : je ne voudrois cependant pas refuser quelque chose de spécifique à l'assa fœtida ; 5°. que quand je dis que tels remedes sont spécifiques dans cette maladie , j'entends seulement par - là que ce sont les remedes connus , les plus propres à changer la disposition

[y] L'on a vu depuis un an ou deux , dans les papiers publics , l'annonce d'un spécifique , qui doit avoir opéré plusieurs guérisons ; je m'en suis procuré , & après l'avoir examiné attentivement , je n'ai pu y reconnoître que la limaille de fer & les bayes de laurier ; on comprend aisément dans quels cas il doit être utile , & dans quels cas il doit nuire. Je l'ai donné à deux malades , & l'effet n'en a pas été favorable.

épileptique du cerveau , quand elle n'est compliquée avec aucune circonstance de la santé qui puisse faire craindre leur effet ; ils sont bien éloignés non-seulement de guérir , mais même d'être utiles dans tous les cas d'épilepsie. .

La poudre de Guttette , & celle du Marquis.

§. 179. La poudre de guttete & la poudre du marquis ont eu une célébrité qui oblige à en dire un mot, ne fut-ce que pour les en dépouiller. Celle de guttete est composée de racine de pivoine mâle , de guy de chêne , du crâne humain qui n'ait pas été enterré , d'ongle d'élán , de graine de basilic & de pivoine , de fleurs de bétoine & de tilleul , de poudre *diambra* , de sucre rosat , & de feuilles d'or (2). Celle du marquis est composée de ra-

(2) *Pharmacopée universelle de LÉMERI*, T. I. page 334. Elle a été réformée dans différentes pharmacopées , mais elle n'y a pas beaucoup gagné , excepté à Edimbourg , où l'on y a ajouté la racine de valeriane.

cine de pivoine mâle , de guy de chêne , de rapure d'yvoire , d'ongle d'élan , d'unicorné , d'yvoire brûlé , de corail rouge & blanc , de perles préparées , de feuilles d'or (a).

Si l'on daigne jeter un coup d'œil sur les drogues qui entrent dans ces compositions, on jugera d'abord qu'elles sont foibles , composées de remèdes dont les uns n'ont aucune vertu , les autres ne sont qu'absorbans ; & que le guy de chêne , que j'ai apprécié plus haut , étant ce qu'il y a de plus efficace , on ne peut s'en promettre aucun effet , si ce n'est peut-être dans l'épilepsie des enfans , ou dans quelque autre cas dans lesquels l'irritation de l'estomac , occasionnée par les acides , peut être une des causes particulières de la maladie ; & qu'ainsi ces poudres , malgré tout ce que l'on en a dit , doivent être placées dans la classe des spécifiques inutiles , qu'il suffit presque de nommer.

§. 180. Les principaux sont , les vers de terre , pris à jeun , au mois

(a) *Pharmacopée universelle de LÉMERI*,
T. I. p. 336.

de Juin, avant le lever du soleil, au moment du coït; le pied d'élan, le talon de lievre, l'arriere-faix d'un premier né, le crâne humain non enteré, la raclure des vertebres d'un homme mort de mort violente, le cerveau humain, le cerveau de corbeaux, l'esprit de sang humain, l'os sesamoïde du crâne humain, l'unicorné fossile, les les petits osselets de l'ouie d'un veau, la bile fraîche d'un chien noir, la fiente de paon & de lion, l'épine du dos d'un lézard rongé dans un tas de fourmis, les cœurs & foyes de taupes, de grenouilles vertes & d'autres petits animaux (b), & un grand nombre d'autres, tous aussi inutiles, aussi dégoûtans, aussi insensés, & qui, sans vertus & sans forces, indignes d'être appelés remèdes, servent à prouver dans quelles petitesse peuvent donner les hommes, quand ils se laissent guider par les systèmes; les préjugés & la superstition.

§. 181. L'on pourroit placer ici un remède dont je n'ai point dû parler

(b) JUNCHEP, *conspectus medicinæ tabul.* 55. §. 7. p. 460.

dans la première classe des remèdes spécifiques, c'est l'huile animale de DIPPILIUS, qui n'est qu'une huile de corne de cerf, dépouillée de son sel âcre par des lotions aqueuses, & plusieurs fois distillée; ce qui en fait une huile assez douce, que l'auteur (c), JUNCKER, KRAMER, SCHARSCHMID, Mr. WERLHOF même, ont recommandé dans l'épilepsie, d'après leurs propres observations, qui ne peut pas nuire, mais qui ne paroît cependant point douée d'une grande efficace, & qui d'ailleurs a été trouvée souvent totalement inutile; je ne vois pas de mal à l'employer dans quelques cas, moyennant qu'on ne l'emploie que par essai, & sans lui confier une cure qu'elle ne peut pas opérer (d).

(c) *Disquisition de vitæ animalis morbo & medicina*, p. 89.

(d) Mr. BOSCH, auteur très-moderne, paroît aussi en faire cas, *Hist. constitut. epidem. ver. minor*, Lugd. Batav. 1769.

ARTICLE XXIX.

Spécifiques dangereux.

§. 182. La troisième classe des spécifiques renferme ceux qui sont dangereux ; ils le sont , les uns par leur violence , les autres par leur vénosité.

L'on a été conduit, comme l'a déjà remarqué Mr. VAN SWIETEN, à employer les remèdes violens , par l'idée assez naturelle que , pour guérir une maladie aussi grave, il falloit nécessairement opérer un grand changement dans le corps.

Ceux qui surviennent dans le tems de la puberté, & qui changent beaucoup l'économie animale, guérissent quelquefois de cette maladie.

Les changemens de pays produisent souvent le même effet ; Mr. VAN SWIETEN a vu plusieurs épileptiques, qui ayant passé de Hollande dans les grandes Indes , avoient été exempts de cette maladie tout le tems qu'ils y avoient demeuré ; quelques-uns en avoient été de nouveau attaqués au

retour, d'autres ne l'avoient jamais reprise (e); & HIPPOCRATE avoit déjà conseillé le changement de pays & de genre de vie pour guérir l'épilepsie; mais ce remède n'est pas à la portée de tous les malades. Les maladies operent aussi quelquefois de ces changemens favorables. HIPPOCRATE avoit remarqué que si la fièvre quarte attaquoit un épileptique, elle le guériffoit; & quoique, comme je l'ai remarqué plus haut, cela ne soit point généralement vrai, cela est arrivé quelquefois. Un homme avoit toutes les semaines un accès d'épilepsie, pour laquelle il avoit inutilement essayé plusieurs remèdes; la fièvre quarte survint, qui l'en guérit parfaitement (f); & une fièvre épidémique, accompagnée de symptômes très-graves, guérit

(e) *Aphor.* 1080. page 436. Cette observation justifie le conseil de STOCKER, qui établit le spécifique de l'épilepsie, *c'est de changer un air humide contre un air sec. Prax. Medic.* page 19. Ce qui peut être vrai très-souvent, mais pas toujours; il y a des épilepsies dans les lieux les plus secs.

(f) *Ibid.*

guérit un jeune homme qui étoit épileptique depuis trois ans, avec plusieurs accès par jour, sans qu'aucun remède l'eût soulagé (g).

§. 183. Mais les médecins ne peuvent donner, ni la fièvre quarte, ni une autre; privés de ces instrumens, ils ont voulu opérer une forte révolution par de violens remèdes. ALEXANDRE de Tralles & PAUL d'Aegine, conseillent l'hellebore blanc, qui étoit pour eux le plus efficace des remèdes; GALIEN a extrêmement vanté l'oignon de mer; les modernes ont employé les préparations cuivreuses, antimoniales & mercurielles les plus violentes; & j'ai vu une thèse soutenue à Montpellier, sous Mr. DIDIER; qui en étoit l'auteur, dans laquelle on affirmoit que la poudre d'algarot, ou poudre de vie, guérissoit l'épilepsie. FABRI, médecin de Dantzic, rapporte dans les *Transactions Philosophiques*, qu'ayant injecté dans les veines d'une femme de trente-cinq ans, & d'une fille de vingt, qui

(g) Ibid. Ces deux observations sont citées d'après les mémoires des curieux de la Nature.

étoient cruellement épileptiques , un remede purgatif dissout dans un esprit anti - épileptique , l'une & l'autre vomirent violemment & beaucoup , & furent purgées ; la premiere eut un nouvel accès le lendemain , mais ce fut le dernier , & elle se porta bien ; la seconde , qui étoit encore purgée le lendemain , n'eut plus d'accès ; mais elle mourut (*b*).

§. 184. *L'ens veneris* , qui est une teinture de cuivre , a été recommandé comme anti-épileptique , & l'on trouve dans une bonne dissertation sur ce métal , une observation qui mérite d'être rapportée. L'auteur fit dissoudre du cuivre dans une solution de sel ammoniac , & en tira des cristaux d'un bleu verdâtre , qu'il employa pour une fille épileptique , de dix-huit ans , qui n'avoit point ses regles ; il le lui faisoit prendre tous les soirs en allant coucher , & en commençant par un grain , il monta successivement jusques à neuf , sans que cela procura aucune évacuation , jusques à ce qu'elle fut parvenue à huit ; cette dose lui

(*b*) *Philosophic. Transact.* 1667.

donna quelques vomissemens; elle en prit cependant neuf pendant trois jours; la santé dérangée se remit fort bien, quoique les regles ne reparussent pas; & les accès qui revenoient toutes les quatre semaines, avoient cessé depuis dix, quand l'auteur écrivoit (i). Mr. VAN SWIETEN avoit déjà vu quelques bons effets dans cette maladie, d'un remede cuivreux, préparé avec beaucoup de soin, mais dont il ne connoissoit pas la composition, qui ne procuroit aucune évacuation sensible, mais qui imprimoit dans tous les membres un singulier mouvement de fourmillement qui s'étendoit jusqu'au bout des doigts (k).

§. 185. Il n'est pas douteux que des secousses violentes ont quelquefois opéré favorablement; tout comme l'on a vu un coup de fusil tiré subitement au pied du lit d'un épileptique, au moment où il sortoit de l'accès, le guérir: mais il est également sûr, 1^o, que l'issue en est toujours très-douteuse; 2^o. qu'ils

(i) Balfour RUSSEL, *Dissertatio de cura*, Edimb. 1759.

(k) §. 1080. pag. 438.

empirent le mal plus ordinairement qu'ils ne le soulagent ; 3°. que souvent les malades sont morts entre les mains des charlatans, dans l'opération de ces remèdes violens ; d'où il est aisé de conclure qu'on ne devoit se les permettre que rarement, dans les tems même où la façon de traiter l'épilepsie, la rendoit presque incurable ; & qu'on ne doit plus les employer aujourd'hui, puisqu'une meilleure méthode a rendu la guérison de cette maladie très-fréquente.

§. 186. Outre ces remèdes dont l'opération est violente, il y a une seconde classe de spécifiques dangereux, dont la façon d'agir ou de nuire n'est pas toujours connue, mais dont on doit toujours se défier.

L'on peut placer ici la semence de jusquiame, que TURQUET DE MAYERNE conseille de donner pendant très-long-tems tous les jours, en commençant par six grains, & en montant jusqu'à un scrupule, & qu'il indique comme un remède universel. Mais Mr. SCARDONA remarque avec raison que ce remède est toujours dangereux, qu'il nuit au cerveau, & que s'il suspend les

accès pendant quelque tems, ils reviennent ensuite plus atroces (1).

§. 187. Parmi les observations que Mr. STORCK a donné sur les effets de l'extrait de la même plante dans les convulsions (m), la dixième est celle d'un épileptique que ce remède rétablit. Mais Mr. GREYING vient de publier un nouveau recueil d'observations très-détaillées, par lequel il paroît que de quatorze épileptiques auxquels il l'a ordonné, les plus heureux ont été ceux à qui ce remède n'a point fait de mal ; il a empiré l'état de quelques-uns, & paroît avoir hâté la mort de quelques autres ; & l'auteur en conclut qu'on ne peut point le regarder comme un remède utile dans cette maladie (n).

§. 188. Je connois dans le plus grand détail, par un témoin oculaire digne de foi, le cas bien frappant d'une personne épileptique, qui prit d'un char-

(1) *Aphor. de morh. cognosc. & curand.*
Lib. 1. Cap. VIII.

(m) *Libellus de stramonio, hyosciamo & aconito*, 1762.

(n) LUDVIG, *adversaria medico-practica*,
page 88. &c. Leipsic 1769.

latan un remède dont l'effet devoit être sûr, & qu'on ne devoit payer, à un prix convenu, qu'au bout d'un an, à compter du jour de la première prise, & supposé qu'il ne revint point d'accès pendant ce tems-là; il n'en revint point en effet; la somme fut payée; mais peu de jours après, le mal revint, & le malade périt dans le premier accès. J'ai aussi été instruit, mais avec moins de détail & de certitude, d'un second cas entièrement semblable; & d'autres exemples, moins funestes, mais analogues, me donnent de justes craintes sur tous ces spécifiques secrets, que les papiers publics annoncent tous les jours, qui operent des miracles, & après un long usage desquels, les malades vont cependant si souvent demander de nouveaux secours.

§. 189. STAHL parle d'un arcane dont la base étoit la teinture de lune, ou d'argent, qui guérit en effet un jeune homme d'une épilepsie assez invétérée, mais le jeta dans une fièvre lente, accompagnée d'abord d'imbécillité, puis de folie, enfin de manie, qui le tua au bout de trois

mois (o). Mr. DE SAUVAGES a été le témoin lui-même des funestes effets du foye de loup fêché, pris pendant quelques jours à assez grandes doses, par une vieille épileptique de Montpellier, que ce remede jetta dans une tristesse, une inquiétude, une crainte, un ennui de la vie, pires que la maladie dont on avoit voulu la guérir, & qui subsistoit toujours (p).

§. 190. Il y a un autre remede plus atroce que celui-là, qui n'a pas toujours inspiré l'horreur qu'il mérite, & qui s'est soutenu pendant bien des siècles; c'est le sang humain. CELSE nous apprend déjà que quelques personnes s'étoient guéries de l'épilepsie, en bûvant le sang chaud d'un gladiateur; l'atrocité du mal, ajoute-t-il, rend l'atrocité du remede plus supportable. ARETÉE se récrie aussi sur la violence d'un mal qui a pû porter à employer un remede aussi terrible, & ajoute qu'il n'a jamais appris qu'il eût été utile. SCRIBONIUS LARGUS veut qu'on le proscrive, & si on l'a

(o) *Theoria medica*, page 1019.

(p) *Nosologia method.* Class. 8. Art. 19. N°. 7. T. 2. page 257.

conservé, c'est sans doute sur ce même principe qu'il faut absolument produire une révolution violente dans la machine; & l'effet de cette boisson est bien propre à produire un bouleversement général, mais ce bouleversement n'est pas toujours heureux. TULP rapporte deux cas funestes, l'un d'un jeune homme que le désespoir de son mal décida à ce remède désespéré; il le prit d'une main tremblante, le bût en détournant les yeux avec une horreur générale & une violence inconcevable; mais bien loin qu'il s'en trouva mieux, le mal augmenta; dans un violent accès, il tomba dans le feu, & se brûla si fortement la jambe, que la gangrène s'y étant mise, on fut obligé de l'amputer; & un accès terrible le tua le lendemain de l'opération. Une jeune fille qui bût dans le même moment du sang du même criminel, n'eut pas un fort tout-à-fait aussi funeste que ce jeune homme; son mal en fut cependant considérablement augmenté (q). Mais c'est trop s'arrêter

(q) *Observat. medic. L. 4. Cap. 4. SENNERT, de epileps. quæst. 15*, blâme aussi avec raison cette horrible boisson.

fur des remèdes de ce genre, dont il étoit cependant nécessaire de montrer le danger ; & je passerois actuellement au traitement de l'accès, si je ne devois pas parler auparavant de quelques secours très-utiles , & qui cependant n'entrent pas dans le traitement ordinaire de l'épilepsie ; ce sont les acides , le lait , les bains froids & les cauterés.

ARTICLE XXX.

Usage des acides.

§. 191. GALIEN, comme on l'a vu, avoit déjà recommandé l'oxymel ; il dit même avoir guéri plus d'un épileptique par le seul usage de ce remède (r), qui est un acide végétal ; & son conseil, adopté par les médecins qui ont écrit depuis lui, avoit mis sur la voye d'employer les acides minéraux, quand ils furent connus.

L'on doit à PARACELSE le premier usage de l'esprit de vitriol dans l'épilepsie, & depuis lui il trouva plu-

(r) *Consil. pro puero epilept.* Cap. 4.
Chart. Tome 10. page 42.

sieurs partisans. *Angelus SALA* l'accrédita beaucoup, & un médecin Polonois, nommé *CNOFELL*, paroît un de ceux qui en ont fait le plus d'usage. Quoique les noms qu'ils lui donnoient, & les moyens de préparations ne fussent pas précisément ceux que les chimistes modernes employent, il est également vrai qu'ils vantoient beaucoup dans cette maladie l'acide du vitriol, & qu'ils disoient en avoir vu de grands effets. *PANAROLUS* l'a vu opérer de belles cures.

La pathologie qui régna tout le siècle dernier, & qui attribuoit tous les maux à l'acide, fit presque perdre de vue cet utile remède, pour lui substituer des poudres inutiles ou nuisibles; si on l'employoit encore quelquefois, on l'affoiblissoit en lui associant ces insipides terreux. Une doctrine plus saine a rappelé l'usage des acides, & j'ai vu trop souvent leurs bons effets dans les maux de nerfs, pour ne pas en recommander fortement l'usage. J'ai rapporté ailleurs une observation qui prouve leur utilité, & *RIVIÈRE* nous en avoit déjà conservé une autre. Une servante épileptique, dit-il, fut

guérie par l'usage de l'oxicrat , dont elle buvoit un verre tous les matins à jeun , & avant l'accès , elle buvoit du vinaigre pur ; après sa guérison , elle eut des douleurs de rhumatisme , que des bains d'eaux thermales guérèrent. (1).

Les acides végétaux peuvent faire du bien ; premierement , dans le cas où le mal vient , ou de l'épaississement , ou de l'âcreté de la bile : on a vû plus haut , & on verra encore dans la suite de ce chapitre ; les bons effets de la crème de tartre ; secondement , en favorisant la transpiration & les urines ; en troisieme lieu , en prévenant ces retours de fièvre , qui souvent rappellent les accès ; mais outre ces avantages , ces acides minéraux en ont un autre bien considérable & de la plus grande importance , c'est de diminuer la sensibilité des nerfs en les durcissant ; c'est de cette façon , & en abattant une petite fièvre à laquelle on ne fait pas assez d'attention , que j'ai souvent vû l'esprit de soufre , qui est le même que celui de vitriol , guérir des

[1] *Observat. Cent. quart. Obs. 10.*

maux de nerfs invétérés, contre lesquels on avoit employé tous les toniques & les anti-hystériques possibles. Je m'en fers souvent en même tems que de la racine de valeriane, pour empêcher qu'elle n'échauffe, & je traite actuellement un jeune homme de dix-neuf ans, à qui la combinaison de ces deux remèdes paroît faire le plus grand bien; il prend trois prises de valeriane avant midi, & trente gouttes d'esprit de vitriol deux heures avant son souper. Un Mr. DESAULX, médecin de la charité, à Versailles, il y a cinquante ans, le recommanda comme spécifique dans cette maladie, & rapporte l'histoire de trois épileptiques, dont il attribue la guérison à son usage (t). Mr. DE HALLER rapporte aussi plusieurs cas des succès de l'huile de vitriol dans la mobilité excessive des nerfs (v), & a bien vu que c'étoit en les endureissant qu'il opéroit si favorablement.

[t] *Nouvelles découvertes concernant la santé & les maladies, par Mr. DESAULX &c. Paris 1727. p. 287.*

[v] *Opuscula pathologica, Obf. 79.*

ARTICLE XXXI.

Usage du lait.

§. 192. La nécessité d'éviter tous les alimens qui ont quelque âcreté, & de se borner à ceux qui sont les plus doux & les moins propres à irriter, indique le lait comme une nourriture très-convenable aux épileptiques, & il est fâcheux qu'il n'ait pas été essayé plus souvent; on les tourmente cruellement en leur faisant avaler des tas de remèdes insipides & inutiles; on aiguise leur mal, en leur donnant des remèdes chauds, des élixirs, des vins médicamenteux, des pilules fœtides, & en leur défendant tout ce qui pourroit les calmer, au lieu qu'on les guériroit par la privation de tous ces remèdes & l'usage des adoucissans, & sur-tout du lait.

Le docteur CHEYNE est celui qui a le plus insisté sur le régime doux dans les maux de nerfs en général, & sa belle observation sur l'usage du lait dans l'épilepsie, est plus instructive que beaucoup de traités sur cette maladie.

„ L'on ne guérit point, dit-il, sans
 „ une grande sobriété & beaucoup
 „ d'attention à éviter tous les alimens
 „ qui ont la moindre âcreté, & à ne
 „ vivre que de ce qu'il y a de plus
 „ doux ; le régime, avec un petit
 „ nombre de remèdes doux, a sou-
 „ vent mieux réussi dans plusieurs
 „ cas, que tous les remèdes des phar-
 „ macies ensemble ; & l'exemple d'un
 „ célèbre médecin de Croyden, mort
 „ il n'y a pas long-tems, est bien re-
 „ marquable. Il étoit depuis long-
 „ tems sujet à l'épilepsie, & il étoit
 „ souvent tombé de cheval par un
 „ accès, en allant voir les malades ; il
 „ avoit épuisé tous les conseils des
 „ médecins & tous les secours de la
 „ médecine, comme je le fais de
 „ lui-même, sans en retirer aucun
 „ soulagement ; mais il remarqua peu
 „ à-peu, que plus ses alimens étoient
 „ légers, plus ses accès étoient foi-
 „ bles, ensuite il renonça à toute
 „ autre boisson que l'eau pure, & les
 „ accès devinrent toujours moins vio-
 „ lens & plus rares ; enfin trouvant
 „ par degré que la maladie diminuoit
 „ à mesure qu'il lui fournissoit moins

„ d'alimens, il ne vécut plus que de
 „ végétaux & d'eau, ce qui termina
 „ entièrement ses accès : mais ce régi-
 „ me étant un peu flatueux pour lui,
 „ après plusieurs essais, il se fixa à deux
 „ quarts de lait de vache par jour,
 „ une pinte à déjeuner, une pinte à
 „ souper, & un quart à diner (x),
 „ sans poisson, sans viande, sans
 „ pain, en un mot, sans quoique ce
 „ soit d'autre que de l'eau fraîche.
 „ Pendant les quatorze ans qu'il vécut
 „ depuis ce régime, il n'éprouva au-
 „ cune altération dans sa santé, sa
 „ force ou sa vigueur, excepté une
 „ fièvre d'accès qu'il dissipa très-aisé-
 „ ment, en mâchant un peu de kina;
 „ & il auroit vraisemblablement vécu
 „ aussi long-tems & aussi bien portant
 „ que CORNARO, si, en couchant
 „ dans un lit humide, il n'avoit pas
 „ gagné une pleurésie à laquelle il
 „ n'opposa aucun secours, persuadé

(x). Le *quart* anglois est égal à la pinte
 de Paris, qui pèse trente deux onces, &
 celle d'Angleterre seize; ainsi deux quarts
 font soixante-quatre onces, ou quatre livres;
 il en prenoit seize à déjeuner, seize à sou-
 per, trente-deux à diner.

» que son régime devoit guérir tous
» les maux, & qui le tua en peu de
» jours. Si l'on réfléchit, ajoute Mr.
» CHEYNE, que toutes les mala-
» dies de nerfs sont des branches du
» même arbre, on comprendra par
» cette observation, quels effets éton-
» nans on peut espérer dans les maux
» de cette espèce, d'un régime & d'u-
» ne diette ordonnés avec sagesse &
» exécutés avec courage (y) ». J'ai
employé très-souvent le lait dans les
maladies nerveuses, & dans l'épilepsie
même, avec le plus grand succès; j'en
rapporte un bel exemple dans le cha-
pitre des convulsions, & j'ai vû un
homme pauvre & épileptique, à qui
je ne donnai d'autre conseil que ce-
lui de ne manger ni lard, ni froma-
ge, & de ne boire ni vin, ni eau-de-
vie, mais de manger le soir & le ma-
tin, une soupe au lait ou au petit lait,
& dont les accès, qui revenoient au-
paravant sept ou huit fois par mois,
ne sont revenus que deux fois dans
sept mois; je ne doute point qu'en

(y) CHEYNE, *an essay on the gout*,
&c. Londres 1724. page 103.

continuant ce régime, il ne se guérisse parfaitement, & je ne crains point de proposer l'observation du médecin de *Croyden*, comme une ressource à beaucoup de malades, ou abandonnés, ou fatigués inutilement par des remèdes qui nuisent à leur santé, sans soulager leur maladie. Combien n'y en a-t-il pas qui seroient guéris, s'ils étoient mis à ce régime simple, & que des remèdes violens ou mal indiqués, ont réduit à l'état le plus triste ?

Il y a des cas dans cette maladie, comme dans d'autres maux de nerfs, où le lait d'ânesse peut être un excellent remède; mais il y en a aussi dans lesquels il nuit: cela arrive sur-tout toutes les fois que les organes de la digestion ne sont pas disposés, comme ils doivent l'être pour le bien digérer; quand il y a des obstructions, quand il constipe, & quand il y a une suppression des regles: j'ai vû des malades qui s'en sont trouvés très-mal, & chez qui son usage produisoit des accès redoublés: mais un médecin éclairé & attentif, qui pesera exactement toutes les circonstances, peut presque

s'assurer de ne l'ordonner jamais sans succès.

ARTICLE XXXII.

Le bain froid.

§. 193. Le bain froid est un autre secours qui est du plus grand usage dans un grand nombre de maux de nerfs, & qui a aussi les avantages dans l'épilepsie, dans le cas où elle paroît dépendre principalement de la mobilité des nerfs; ce qu'on connoît par les symptômes de mobilité décrits ailleurs; mais pour l'employer, il faut, 1°. qu'il n'y ait point trop de sang dans les vaisseaux, sans quoi la première impression du bain seroit de le porter à la tête; 2°. que la sensibilité ne soit point excessive; car dans ce cas il agiroit comme irritant; 3°. qu'il n'y ait ni obstructions invétérées, ni suppuration, ni aucune des autres causes qui sont regardées avec raison, comme des obstacles à son usage. Excepté dans ces cas-là, c'est sans contredit un des remèdes les plus propres à redonner de la force au genre nerveux, & à diffi-

per cette convulsibilité que la plus légère cause met en action & qui produit un accès. J'ai déjà détaillé ailleurs les avantages de ce remède; je ne me répéterai point ici, mais j'ajouterai que je vois actuellement un homme de vingt-six ans, qui depuis quelques mois a eu des accès sans aucune cause apparente, qui est frere d'un malade dont j'ai parlé à l'article de la mobilité, & que j'avois guéri par les bains froids, auquel j'ai conseillé le même remède & qui s'en trouve très-bien; il est malheureusement ferrurier, & cette profession est très-contraire à son mal (2). *Calius AURELIANUS* paroît déjà avoir conseillé les bains froids dans l'épilepsie (a), & *FLOYER* qui les recommande dans son ouvrage sur cette matiere, ajoute une reflexion que j'aime à présenter souvent, parce que je suis convaincu de son importance dans le traitement de cette maladie. Puisque le vin, dit-il,

(2) Les bains froids & la racine de valeriane l'ont entierement guéri; il y avoit plus de deux ans qu'on avoit remarqué les premiers accès.

(a) *Chronicor. Lib. 1. Cap. 4. pag. 312.*

les alimens échauffans, les bains chauds, les odeurs fortes, occasionnent des accès d'épilepsie, nous pouvons raisonnablement espérer que les contraires, une diète rafraîchissante, la boisson d'eau, les lavations froides, les préviendront (b). FLOYER paroîtroit dans cet endroit condamner les bains tièdes que j'ai recommandé plus haut & que je crois utiles; je dois lever cette contradiction apparente.

§. 194. Les effets des bains chauds, des bains tièdes & des bains froids, sont très-différens, & il est étonnant que souvent ils n'aient pas été assez bien appréciés par ceux qui les ordonnoient. Le bain chaud peut convenir quelquefois, avec bien des attentions, dans quelques cas de maladies externes, rarement dans les internes, jamais dans l'épilepsie, on dans les autres maladies dans lesquelles on craint de porter le sang à la tête, & l'on a vu, §. 52, le mauvais effet que produisirent les bains fort chauds, que le malade prit à Caутères (c).

Il (b) *ψυχρολουσιαι*, pag. 144.

(c) La Russie est le pays du monde où l'on prend les bains les plus chauds; ce sont

Le bain tiède convient, quand il faut faciliter la transpiration, en humectant, décrempant, relâchant, quand il faut diminuer l'épaississement inflammatoire du sang, quand il faut modérer une petite fièvre produite par ce même épaississement ou par l'acreté des humeurs, & ces cas étant très-fré-

des bains de vapeurs auxquels tous les ordres & tous les âges s'astreignent avec la plus grande régularité. Nous frémissons en pensant que le thermomètre de Mr. DE REAUMUR est dans ces étuves à soixante degrés au dessus de la glace; aussi les étrangers qui n'y sont pas accoutumés, sentent d'abord leur sang se porter à la tête avec violence, & y périroient promptement, s'ils n'avoient pas la force d'en sortir, comme cela manqua d'arriver à Mr. l'abbé CHAPPE d'Auteroche, & à son domestique, à *Solkamskaty*; cependant cet habile physicien les croit nécessaires à un peuple chez qui le froid continuellement rigoureux, & le peu de mouvement qui en est la suite, arrêtent absolument la transpiration, & qui se préserve du scorbut & des maladies rhumatismales par le secours de ces étuves. *Voyages en Sibérie*, Tom. I. pag. 50. Mais je suis persuadé qu'il y auroit d'autres moyens moins dangereux d'opérer le même effet, & que ces bains sont vraiment nuisibles.

quens, il y a une multitude de circonstances dans lesquelles ils font très-bien ; mais ces cas sont peut-être plus rares dans les pays du nord qu'ailleurs, & plus fréquens dans les pays chauds, où les bains tièdes doivent souvent être nécessaires & opérer les plus grands effets.

Le bain froid, comme on l'a vu, a au contraire plusieurs effets opposés, & réussit admirablement dans des circonstances différentes ; & ces circonstances se présentent vraisemblablement plus souvent dans les pays où la putridité des humeurs & le relâchement des solides sont fréquens, & les maladies vraiment inflammatoires rares, que dans ceux où les constitutions sont différentes ; mais quoique certains pays offrent plus de cas d'une espèce que d'autres, il n'y en a point dans les zones tempérées où il ne s'en trouve de toute espèce ; les variétés des épilepsies sont de tous les pays, & dans tous les pays, il y en a par-là même qui peuvent exiger les bains froids, d'autres qui exigent les tièdes.

§. 195. Importe-t-il, dira-t-on, quand on prend les bains froids, de

plonger la tête la première ? Cette idée est généralement répandue, elle est fondée sur les conseils de très-grands médecins, & ils ont cru puiser cette idée dans les règles de la mécanique du corps humain. Si l'on plonge tout le corps, ont-ils dit, sans plonger la tête, l'adstriction que fait le froid sur toute la surface du corps, doit pousser plus de sang dans les vaisseaux de la tête qui ne participent point à ce resserrement, & cette surcharge peut être dangereuse ; pour la prévenir, il faut plonger la tête la première ; mais malheureusement il y a dans ce raisonnement une erreur considérable ; c'est que l'on n'a point fait attention que les vaisseaux qui portent le sang au cerveau, & qui sont renfermés dans une boîte osseuse, ne participoient point à cette adstriction, qu'elle ne porte que sur les vaisseaux externes de la tête, & que cette compression des vaisseaux externes, bien loin d'être utile, nuit de deux façons, 1°. parce que non-seulement cette adstriction empêche qu'ils ne prêtent à recevoir une partie de ce sang surabondant, déterminé dans les carotides, qui alors se

porte tout aux internes; mais aussi, 2°. parce qu'ils en reçoivent moins que de coutume, & que cette diminution est une augmentation à celui des vaisseaux internes; aussi il ne faut jamais commencer par la tête (*d*), d'autant plus que cela ne peut point se faire sans la mettre dans une attitude plus propre à y déterminer le sang qu'à l'en détourner. Le seul avantage qu'il y ait à la baigner, n'est que celui qu'on retire de la laver à l'eau froide, & l'ablution est aussi utile que l'immersion: ceux qui ont la tête rasée peuvent la baigner toute entière; ceux qui portent leurs cheveux, les enveloppent sous un bonnet de tafetas ciré, qu'une attache à coulant, joint exactement autour de la tête, afin qu'ils ne se mouillent point; & alors ils se baignent jusques au sommet du front & au haut de la nuque.

Je

(*d*) Quoique la généralité des médecins s'accorde à prescrire de commencer par la tête, je me souviens cependant d'avoir lu le conseil contraire, mais sans me rappeler où.

Jé dois aux bains tièdes principalement, au régime & à la crème de tartre, la cure d'un jeune homme de treize ans, dont je n'osai point promettre d'abord la guérison. Cette observation a quelques circonstances instructives. Quoiqu'il fut né très-bien portant, de parens très-sains, & n'eût eu aucune maladie, il étoit bilieux & sanguin, & avoit des accidens qui dénotoient un vice dans sa constitution : 1°. il devenoit quelquefois tout-à-coup, & sans aucune raison apparente, chagrin, rétif, & si colere qu'il paroïssoit en fureur ; 2°. sans aucune cause externe, il étoit de tems en tems frappé d'une terreur subite, & se croyoit dans le plus grand danger ; son imagination étoit même si égarée dans ces momens, qu'il méconnoïssoit les personnes qui lui étoient les plus familières, & les prenoit pour autant de spectres & d'ennemis ; 3°. pendant ces accès, il avoit le visage rouge, la prunelle plus dilatée, le pouls serré & fréquent ; cet état ne duroit que quelques minutes, & le laissoit dans la tristesse ; 4°. on lui donna les anti-spasmodiques chauds les plus actifs, qui rendirent son état plus fâcheux, & le

changerent en véritables accès épileptiques, pour lesquels on me consulta, & qui avoient sensiblement affoibli la mémoire; une saignée avoit fait voir que son sang étoit fort enflammé. La densité des humeurs, la roideur des solides, & sur-tout l'âcreté de la bile me parut la cause de cet état; je le réduisis à ne prendre pour toute viande qu'un peu de poulet, mais à vivre uniquement de végétaux, à éviter les appartemens chauds, à ne boire que de l'eau, à prendre long-tems les bains tièdes, à faire un très-long usage de petit lait & de crème de tartre, & sur-tout à éviter absolument tous les remèdes qu'on appelle *anti-épileptiques*. Il suivit régulièrement ces directions qui amenderent promptement son état; peu-à-peu tous les accidens ont disparu, les accès ne sont pas revenus, & sa santé s'est extrêmement fortifiée. L'on sent aisément qu'en continuant l'usage des anti-épileptiques, on auroit toujours rendu l'état du malade plus fâcheux.



ARTICLE XXXIII.

Les cauterés & les vésicatoires.

§. 196. Le dernier remède dont il me reste à parler, c'est les caustics ou cauterés & les setons. Je n'examinerai point ici la façon d'agir de ce genre de remèdes connus dans quelques endroits sous le nom d'issues, fontaines, &c. je me borne à remarquer qu'on en a observé souvent les bons effets; 1°. dans les maladies qui dépendent d'une surabondance d'humeurs cacochimes; 2°. dans ceux où une humeur âcre roulante se porte tantôt dans une partie, tantôt dans une autre, & fait craindre qu'en se portant sur les organes intérieurs, elle n'occasionne de grands désordres; 3°. quand les humeurs ont une tendance opiniâtre sur quelque organe. Ils peuvent être utiles dans l'épilepsie à ces trois titres, & à un quatrième auquel on fait moins d'attention; c'est qu'une irritation fixée sur une partie quelconque du corps, est une espèce de frein puissant aux mouvemens irréguliers des nerfs. En em-

ployant le caustique dans l'épilepsie, on n'a fait qu'imiter la nature, qui comme on l'a vu plus haut, a guéri des épilepsies en produisant un égoût d'humeur âcre dans quelques parties extérieures, & l'art par cette imitation, a eu souvent les succès les plus heureux; aussi les cautères & les setons, qui sont le même remède, sont recommandés par plusieurs auteurs qui s'en sont servis avec succès. J'ai déjà rapporté quelques exemples de leurs bons effets, en parlant de la guérison des épilepsies sympathiques. CRATON en faisoit tant de cas, que c'est sur leur efficacité qu'il fonde la guérison dans les cas les plus fâcheux, & MONTANUS guérit, par un caustique à chaque bras, un homme de cinquante deux ans, sujet depuis long-tems à cette maladie. FABRICE de Hilden guérit un jeune homme d'ici, qui avoit au moins un accès par jour, & pour lequel on avoit essayé inutilement tous les remèdes, uniquement par un seton (e); les accès devinrent d'abord plus rares, ensuite ils cessèrent tout-

(e) *Centur. 1. Obs. 41.*

à fait. PARÉ avoit déjà vû guérir parfaitement par ce moyen un jeune homme de vingt ans, qui avoit des accès très-fréquens, & à qui HOLLIER l'avoit conseillé (f). MERCATUS, par le moyen d'un cautere au bras, éloigna si fort les accès, & les rendit si légers qu'on croyoit le malade parfaitement guéri (g); & j'ai vû moi-même quelques enfans à qui ce remede avoit fait beaucoup de bien. WILLIS parle d'une femme épileptique, qui n'avoit point d'accès aussi longtems que le cautere fluoit, & qui les reprenoit dès qu'il séchoit (h). C. PISON avoit guéri un homme de Nancy en lui appliquant un cautere au sommet de la tête, & il connoissoit une femme qui avoit été guérie par le même secours de vapeurs hystériques très-fortes; mais comme les cauterés s'ouvroient alors avec le feu, il avertit avec raison, que l'application de ce remede est dangereuse sur cette partie, parce qu'il est à craindre qu'on n'en-

(f) *Oeuvres de Chirurgie*, L. 9. C. 4.

(g) *Consult. medic. Conf.* 3.

(h) *Patholog. cerebr.* Cap. 27.

flamme les membranes du cerveau; il conseille de les appliquer à la nuque, où ils opéreront tout aussi favorablement (i). MEECKREN a fait une cure semblable à celle de PISON, c'est celle d'un jeune homme de dix-sept ans, attaqué de cruels accès d'épilepsie, dont le symptôme le plus horrible étoit l'allongement de la langue qui descendoit jusques sur la poitrine, avec une quantité prodigieuse d'écume; tous les remèdes furent inutiles; on se détermina à appliquer un cautere au point de concours de la future sagittale & de la coronale; on se servit pour cela d'un fer rouge qui brula l'os même; on pansa avec le basilic; l'escarre tomba le sixieme jour, & le malade fut guéri. Quand l'escarre fut tombée, on mettoit tous les jours un pois dans le trou, & par ce moyen on donnoit issue aux humeurs; on laissa long-tems le cautere ouvert; mais quand on n'eut plus lieu de craindre de rechûte, on ôta le pois & on laissa revenir les chairs (k). Mr. PUJATI parle

(i) *Dē morbis a colluv. serof.* Obs. 31. page 173.

(k) *Jo. a MEECKREN, Observat. medic.*

d'un homme de cinquante ans, épileptique dès son enfance, qui avoit fait beaucoup de remèdes, & qu'un cautere à la cuisse guérit presque entièrement (1). Un jeune homme de quatorze ans, sujet depuis neuf ans à l'épilepsie, & qui tomboit tous les jours, en fut guéri par trois cauteres, un à la nuque, & un à chaque bras, qu'il ne porta pas même un an (m). Il est vrai qu'il prenoit en même tems quelques autres remèdes, mais si foibles qu'on ne peut leur attribuer aucune part à la guérison; & l'on trouve dans les *Anecdotes de Médecine*, deux observations qui prouvent également les bons effets de ce remède. Une de-

Cap. 5. p. 45. Cette observation, les deux précédentes, & quelques autres, ne doivent point empêcher d'être très-circonspect sur l'emploi de ce remède, dont le danger a été prévenu par PISON, & démontré par des malheurs récents. Mr. DE HAEN a exposé les siens avec cette candeur qui caractérise le grand homme, mais tout le monde ne l'a pas imité.

(1) *Decas observat. medic. Observ. 3.*

D. page 95.

(m) *Journal de Médéc. T. 25. p. 47.*

R 4

moiselle de dix huit ans, étoit sujette, sans aucun dérangement de ses règles, & sans aucune cause apparente, à une épilepsie dont les accès, malgré les remèdes qu'on employa, revenoient tous les mois depuis deux ans; un cautere au bras éloigna l'accès de quatre mois; on en fit un second à l'autre bras, elle fut neuf mois sans aucun ressentiment; un troisieme à une jambe la guérit radicalement. Un homme de soixante ans, attaqué aussi d'épilepsie, sans cause apparente, la suspendit pendant huit mois par le bénéfice de deux cauteres; mais se croyant radicalement guéri, il en laissa fermer un, & son imprudence fut bien-tôt marquée par le retour d'un accès. Dès le lendemain, le chirurgien rétablit l'égoût, dont la suppression avoit été si nuisible, & le malade vécut depuis sept ans entiers sans éprouver aucune rechûte (n). J'ai reçu depuis quelques jours un mémoire à consulter pour un malade épileptique depuis plusieurs années, qui a essayé inutilement un grand nombre de remèdes,

(n) *Anecdotes de Médecine* 85. p. 124.

& qui s'étant enfin fait ouvrir un cautere, il y'a quelques semaines, croit déjà remarquer des changemens assez favorables pour lui faire espérer qu'il lui sera très-utile.

§. 197. L'on peut mettre dans le même rang que les cauterés, les vésicatoires, dont l'action a plusieurs choses communes, quoiqu'elle en ait plusieurs qui lui sont particulieres, & qui font que, quoique l'action du vésicatoire soit moins longue, cependant comme elle n'agit pas seulement comme évacuant, mais aussi en animant l'action des solides, elle est souvent à préférer dans bien des cas, & j'en parlerai plus au long dans le chapitre des vapeurs, où ils sont plus souvent applicables que dans l'épilepsie, quoiqu'ils ayent bien leur usage dans cette maladie; j'ai rapporté plus haut leurs bons effets dans plusieurs cas d'épilepsie sympathique, qu'ils soulagerent ou guérissent en les appliquant sur la partie, j'en ai vu de bons effets dans les épilepsies idiopathiques, & Mr. SERRAO a fait une belle observation qui prouve tout leur avantage. Il vit à Naples, un enfant de cinq ans, qui,

depuis un an ou deux, avoit un accès d'épilepsie toutes les fois qu'il commençoit à s'endormir, ce qui l'avoit rendu stupide, & lui avoit laissé une espèce de paralysie sur les jambes, de façon qu'il ne pouvoit pas se soutenir; on avoit essayé plusieurs remèdes inutilement. Cet habile médecin ordonna un emplâtre de vésicatoire à la partie postérieure de la suture sagittale; l'effet en fut si heureux que les accès qui étoient auparavant innombrables, diminuèrent d'abord, & cessèrent entièrement au bout de quinze jours; il recouvra en même tems ses facultés & l'usage de ses jambes. Mr. MORGAGNI, qui nous a conservé cette observation, ajoute que Mr. SERAO en a vu d'autres fois encore de bons effets dans des cas semblables (o).

ARTICLE XXXIV.

Traitement pendant l'accès.

§. 198. Il ne me reste à présent

(o) *De sedib. & caus. morbor. epist. 10*
§. 8. page 77.

qu'à parler du traitement pendant l'accès; & il se réduit à bien peu de chose; c'est d'éviter que les patients ne se fassent du mal. Les soins qu'on peut se donner pour cela, consistent premièrement, si on le peut, à introduire entre les dents un linge tortillé en rouleau, & assez ferme, pour empêcher qu'ils ne se déchirent la langue; ce qui arrive fréquemment, ou qu'ils ne l'amputent presque entièrement, comme on l'a vu quelquefois; le coin d'un mouchoir ou d'une serviette fine sont très-propres à cet usage, & je les ai toujours préférés au bois ou au linge. En second lieu, on doit empêcher la violence des coups qu'ils peuvent se donner contre les corps qui les entourent; pour cela, s'il est possible, on doit les mettre d'abord sur un lit, & alors tous les soins se réduisent à empêcher que les convulsions ne les jettent à terre, que leur tête ne porte trop violemment contre le chevet qu'il faut garnir de coussins, & à modérer les coups violens qu'ils se portent quelquefois au visage avec les poings, & qui occasionnent souvent des saignemens de nez, des meurtrissures à l'œil,

des échimoses considérables. Des assistans intelligens & adroits remplissent très-bien cette indication, & se donnent bien de garde de vouloir reprimer des mouvemens qu'il est impossible d'empêcher, & qu'il feroit d'ailleurs très-dangereux de contraindre, quand on le pourroit.

L'idée où l'on étoit, que si l'on pouvoit ouvrir les pouces, dont la convulsion plus constante que celle d'aucune autre partie, étoit par-là même regardée comme l'essence de la maladie; cette idée, dis-je, avoit conduit, comme l'a remarqué Mr. VAN SWIETEN, à faire les plus grands efforts pour les ouvrir; & à force de les violenter, on leur occasionnoit des douleurs souvent très-vives & très-longues, en pure perte; tous ces efforts sont non-seulement inutiles, mais dangereux, & on doit absolument y renoncer (p)

6. 199. L'usage des odeurs spiritueuses, des applications âcres, des frictions fortes, n'est pas moins inutile; l'action des nerfs sentans est ab-

folument nulle, ainsi toutes les irritations n'opèrent rien du tout; CELSE l'avoit déjà vû, & les parfums fétides sont dangereux; CÆLIUS AURELIANUS en a déjà averti. On les avoit introduit dans l'espérance de faire éternuer, ce qu'on regardoit comme très-avantageux, parce que l'on croyoit que l'épilepsie étoit l'effet d'une secousse que le cerveau se donnoit pour se débarrasser des mauvaises humeurs qui l'irritoient: mais sans parler de la fausseté de cette idée, l'éternuement seroit très-dangereux, comme ce même CÆLIUS AURELIANUS l'avoit déjà dit (q). Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se rappeler que ce mouvement commence par une suspension dans la respiration qui

(q) *De morbis chronic. L. 1. Cap. 4.* VALSALVA blâmoit aussi beaucoup cet usage, & croyoit que généralement on devoit très-rarement ou jamais employer l'éternuement comme un remède; il n'approuvoit pas non plus l'usage de la plupart des spiritueux volatils appliqués aux narines. MORGAGNI, Ep. 9. §. 6. Mr. VAN SWIETEN¹ a aussi indiqué le danger de cette pratique, qu'un médecin sensé doit absolument interdire.

accumule le sang dans les vaisseaux de la tête où il y en a déjà trop, & que cette augmentation seroit très-dangereuse, que d'ailleurs l'éternuement même est une convulsion qui n'est point propre à en faire cesser d'autres.

§. 200. Les frictions huileuses sont un remède absolument opposé à l'éternuement; & Mr. MORGAGNI parle d'un épileptique qui étoit soigné par Mr. ALBERTINI, & à qui ce grand praticien avoit conseillé de faire frotter l'épine du dos pendant l'accès, avec de l'huile d'amande chaude; ce qui lui faisoit toujours beaucoup de bien. Il est rare que ce remède puisse avoir lieu dans l'épilepsie; mais comme on l'a vu, il est très-utile dans plusieurs cas de convulsions.

§. 201. Les anciens qui voyoient l'engorgement du cerveau & dont la conduite étoit dirigée par l'observation, conseilloient la saignée dans l'accès. Quand le système dont je viens de parler, fut introduit, & qu'on regarda l'épilepsie comme un combat du cerveau pour chasser l'humeur âcre, on

la défendit (r), crainte que la nature affoiblie ne pût pas se débarrasser de son ennemi, & que le malade ne succombât. Cette fausse crainte ne mérite aucune attention; l'on peut sans risque ouvrir la veine dans l'accès & faire une très-forte saignée, quand les symptômes de l'accès, la force & la dureté du pouls prouvent qu'il y a plethore; mais outre que cela est très-difficile, souvent impossible & peut devenir dangereux par la difficulté d'assujettir un membre, cela seroit très-souvent infructueux; il survient souvent des hémorragies par les narines qui ne soulagent point l'accès (s); on ne doit pas mieux espérer, pas même autant, des saignées; cependant dans le cas où elle paroîtroit très-présumable, on devroit, je crois, se déterminer sur le champ à faire ouvrir une des jugulaires qui sont ordinairement très-apparentes. La saignée peut encore être indispensablement nécessaire sur la fin de l'accès, quand les convul-

(r) SENNERT, Lib. Part. 2. Cap. 31. Quæst. 6.

(s) BOERHAAVE *de morbis nervor.* pag. 811.

sions finissent, & que les symptômes de la plethore du cerveau subsistent & font craindre un engorgement apoplectique.

§. 202. Quand l'accès est fini, si le malade est foible, abattu, angoissé, assoupi, le meilleur remede c'est une très-grande tranquillité, de petites tasses d'eau fraîche fréquemment, un lavement d'eau tiède; & ensuite quand ils sont revenus, quelques distractions agréables qui les étourdissent sur leur mal, dont ils sont quelquefois très-affectés pendant les premières heures après l'accès. On peut même donner, quand il n'y a que de l'abattement sans irritation, de légers cordiaux, comme de l'eau de mélisse avec un peu de liqueur minérale anodine, de l'eau de fleur d'orange, ou quelque'autre mélange analogue. Les spiritueux que d'habiles médecins conseillent, me paroissent bien actifs, & j'ai vu l'accès récidiver pour avoir seulement flairé l'esprit volatil de sel ammoniac.

ARTICLE XXXV.

Traitement des suites de l'épilepsie.

§. 203. J'ai parlé plus haut de ce qu'en devoit faire d'abord après l'accès; il me reste un mot à dire des moyens de remédier aux suites fâcheuses que cette maladie laisse, dont j'ai donné l'histoire, article 14, & que j'ai divisées en morales & en physiques.

Les suites morales sont l'affoiblissement de la mémoire & des autres facultés; il dépend de celui que les différentes parties du cerveau éprouvent; ainsi l'indication que présente cet état, c'est de fortifier ces parties; le tems est ici le plus grand remède; & quand l'échec que le cerveau a reçu n'est pas incurable, ses forces se relevent à mesure que la guérison avance. Quant aux autres secours, on suivra les directions qu'on trouve dans les endroits de cet ouvrage, où je me suis occupé plus particulièrement de cet affoiblissement des facultés.

Les suites physiques sont, 1^o. l'affoiblissement du genre nerveux dans

toutes ses branches, la mobilité ou les autres effets qui en sont la suite; 2°. les différens désordres occasionnés par la violence des convulsions, tels que l'amputation de la langue, les fractures de dents, les luxations, les contusions, les épanchemens de Sang, les hémorragies.

L'on a vû plus haut les moyens de remédier à l'affoiblissement du genre nerveux; & les effets de la seconde classe doivent se traiter, quand ils sont l'effet de l'épilepsie, comme quand ils dépendent de quelqu'autre cause, en faisant cependant toujours attention dans le traitement, lorsqu'il est nécessaire d'en faire un, ce qui est rare, qu'on traite des malades épileptiques: l'amputation de la langue exige quelquefois nécessairement les futures; TURNER rapporte un exemple qui le prouve démonstrativement. La langue avoit été amputée de façon qu'elle ne tenoit que par un filet à chacun de ses bords, on fit des futures, & trois jours après l'accident, ces filets qui avoient été fort meurtris, tombèrent en suppuration; sans les futures, la langue se seroit entièrement détachée à

cette époque, au lieu que par leur moyen le malade recouvrera parfaitement cet organe.

ARTICLE XXXVI.

Epilepsie feinte.

§. 204. Voilà tout ce que je connois de plus essentiel à dire sur l'épilepsie, je n'ajouterai qu'un mot sur cette maladie simulée.

L'esprit humain s'est avisé de toutes les fourberies possibles, & plus d'une fois des scélérats ont affecté de certaines maladies pour se soustraire à la peine du travail, se faire exempter de quelques punitions, ou inspirer la pitié; l'épilepsie est une de celles qu'on a le plus souvent voulu affecter, parce, sans doute, que l'effroi qu'elle inspire, fait qu'on a plus de pitié pour ceux qui en sont atteints; peut-être aussi, parce qu'elle n'exige qu'une représentation momentanée, & qu'après l'accès, il est permis de se porter à merveille.

„ Une jeune fille, dit Mr. DE
„ HAEN, qui a ouï dire que le ma-

„ riage a quelquefois guéri l'épilepsie,
„ joue cette maladie pour qu'on la
„ marie; un moine paresseux & friand
„ en fait autant, pour se dispenser des
„ austérités du couvent; de jeunes
„ gens pour se soustraire aux écoles;
„ & il est souvent très-difficile de dé-
„ couvrir la fourberie,,. Je ne puis
rien faire de mieux que de rapporter
les observations de cet habile praticien,
& une de Mr. DE SAUVAGES.

§. 205. Le premier, ayant été consulté par la mere d'une jeune fille, qui avoit d'abord été sourde, & qui, quand la surdité fut guérie, devint épileptique, la fit venir dans son hôpital pour être plus à portée de l'examiner. Les accès qui ne revenoient d'abord que deux ou trois fois par jour, revenoient alors toutes les heures; Mr. DE HAEN en vit un qui ressembloit parfaitement à un accès naturel, & les pouces étoient si serrés qu'il pouvoit à peine les entr'ouvrir; les yeux étoient horriblement agités; il conçut cependant du soupçon, 1°. sur ce que quand elle ouvroit les yeux, c'étoit comme dans l'état naturel; 2°. sur ce que le pouls n'étoit presque point changé; 3°. sur

ce que la prunelle se dilatoit, quand on fermoit les rideaux du lit, & se referroit, quand on les ouvroit; 4^e. sur ce que si on approchoit une chandelle des yeux, les prunelles se contractoient très-vivement, & la malade tournoit la tête pour éviter la douleur. Il ordonna à un garde de la sortir du lit, & de lui donner des coups de bâton, si elle tomboit; ce remède la guérit radicalement, & elle avoua que la furdité & l'épilepsie étoient des maladies feintes pour ne pas aller en service.

Un jeune homme, dans le même hôpital, étoit encore meilleur même; l'accès étoit accompagné d'un hoquet très-violent & les convulsions du bas-ventre étoient terribles; Mr. DE HAEN ayant cependant quelques soupçons, le fit enfermer dans une chambre où il pouvoit être épié; aussi long-tems qu'il se croyoit seul, il se portoit à merveille, les accès ne le prenoient que quand il y avoit du monde, & même ils diminuoient, si l'on paroissoit ne pas le regarder. Convaincu de fourberie, il avoua qu'il avoit voulu par-là éviter l'apprentissage de char-

pentier & rester dans la maison paternelle.

§. 206. En les irritant fortement, en les brûlant même s'il le faut, on découvre ordinairement la fourberie, parce qu'il est beaucoup plus aisé d'imiter des mouvements extraordinaires que de dissimuler la douleur. Mr. DE HAEN cite cependant une femme de vingt ans, qui avoit soutenu l'épreuve du feu & qui portoit encore les cicatrices de trois brûlures considérables qu'un chirurgien lui avoit fait pour découvrir l'imposture, s'il y en avoit, sans que cela eût pu la forcer à se démasquer; mais étant détenue en prison pour meurtre, elle avoua naturellement sa fourberie, & imita si bien l'accès devant Mrs. VAN SWIETEN, DE HAEN, & plusieurs autres médecins, qu'ils crurent que ses accès de commande étoient devenus réels (t).

Une jeune fille de sept ans, contrefaisoit si parfaitement cette maladie, à l'hôpital général de Montpellier, que personne ne doutoit de sa réalité,

(t) *Ratio medend. Pass. §. Cap. 4. §. 5.*

mais Mr. DE SAUVAGES ayant pris de la défiance, lui demanda si elle ne sentoît pas un vent qui passoit de la main à l'épaule, & de l'épaule à la cuisse, elle répondit que oui; cette réponse déceloit la coquinerie; il ordonna qu'on la fouettât; elle fut guérie (u): & j'ai vû un jeune garçon qui contrefaisant une paralysie de la langue, après avoir fait une sottise, allarma prodigieusement ses parens; j'avois été dupe, quelques momens, d'un cas à-peu près semblable quelques années auparavant; je ne doutai pas que celui-ci ne fut une espièglerie de la même espece; j'ordonnai pour dégager la langue de fouetter le haut des épaules avec des orties jusqu'à ce qu'elles enflassent, le petit drôle soutint bien son rôle, il laissa cueillir les orties, & ne recouvra la parole que quand elles arriverent; & Mr. DE HAEN rappelle un fait assez connu, c'est celui de ce mendiant de Paris, qui tomboit épileptique en rue; on donna ordre qu'il y eût auprès du lieu

(u) *Nosologia Methodica*, Class. 4. Ar. 19. Tom. I. pag. 582.

qu'il habitoit, un lit de paille, où l'on put le jeter dès qu'il prendroit l'accès, pour ne se pas faire du mal; l'accès vint, on le mit sur le lit; mais dès qu'il y fut, on approcha du feu des quatre coins, & le scélerat s'enfuit comme un éclair. De tout cela on doit conclure, que pour s'assurer si une épilepsie est feinte, il faut, 1°. examiner attentivement si rien ne peut en avoir produit une véritable; 2°. si le sujet peut avoir quelques sujets de la feindre; 3°. observer si tous les symptômes sont bien semblables à ceux qui caractérisent l'épilepsie naturelle; 4°. exposer les malades à quelques douleurs ou à quelques grands dangers; si le mal est vrai, ils ne sentent pas la douleur & ils n'apperçoivent pas le danger; s'il est feint, quel ménagement doit-on à des misérables capables d'une fourberie aussi indigne, & qui est d'autant plus étonnante, que tous ceux qui ont le malheur d'être atteints de cette maladie, en sont désolés & attachent à ce mal une fausse honte, qui fait qu'ils ne négligent rien pour le cacher, & qu'ils donnent différens noms à leur mal pour le déguiser aux autres,

autres, quelquefois peut-être à eux-mêmes? ce qui fournit un cinquième moyen pour distinguer les faux épileptiques, qui font beaucoup de bruit de leur maladie, des véritables, qui ordinairement cherchent à la cacher, fondés sans doute sur ce qu'on la craint généralement & qu'on redoute d'en voir les accès.

§. 207. Cette petitesse du public tire son origine de cette antique superstition, qui ignorant les véritables causes de cette maladie, l'attribuoit à un acte particulier de la colère céleste, & regardoit un accès d'épilepsie dans une assemblée publique, comme un signe de l'improbation des dieux; ce qui la faisoit rompre sur-le-champ, & rendoit les infortunés épileptiques en quelque façon, l'objet de l'exécration publique. Les lumières qu'on a acquises depuis le tems des comices, auroient dû effacer jusques aux moindres traces de ce barbare préjugé qui a des suites fâcheuses. Si l'on témoignoit moins d'éloignement pour ce mal, ceux qui en sont atteints, perdroient cette horreur qu'ils en ont, & qui empoisonnant leur bonheur & irritant toujours

les nerfs, ne contribue pas peu à l'entretenir & à l'augmenter.

L'épilepsie est plus fâcheuse pour le malade que bien d'autres maladies, mais elle n'a rien de plus fâcheux pour les assistans; c'est un spectacle triste que celui d'un accès; mais il n'est effrayant qu'autant que la prévention le rend tel; on en prend peur la première fois qu'on en entend prononcer le nom., on s'en effraye toute sa vie sans en avoir vû, & il est cependant vrai qu'il n'y a point de maladie moins douloureuse pour le malade & moins dangereuse pour un spectateur, qui la considérant de sang froid, n'y verroit qu'un homme privé du sentiment, dont les muscles sont mus avec une force, une vitesse & une variété étonnante, & ne seroit pas exposé par-là même aux influences qui font le produit d'une imagination erronée. On ne séquestreroit plus alors ces infortunés, comme on ne le fait que trop, on ne les relégueroit plus, comme on le faisoit autrefois, dans des maisons de gens qui ne s'en chargeant que pour bénéficier sur la pension, les traitoient ordinairement très-durement & ne con-

tribuoient pas peu à augmenter le mal. L'ennui de la solitude, le chagrin de l'abandon, pourroient seuls occasionner la maladie; combien ne doivent-ils pas l'accroître? Il me semble qu'heureusement l'on revient peu-à-peu à une manière de penser plus juste & plus humaine, que l'on n'attache plus de honte à une maladie aussi peu faite pour en inspirer qu'un rhume ou la fièvre tierce, & j'espère que bientôt elle ne sera plus un objet de mystère, ni de dédain, mais seulement de pitié, comme toutes les autres.

ARTICLE XXXVII.

RÉCAPITULATION.

§. 208. J'ai cru ne devoir rien omettre de ce qui pouvoit servir à répandre quelque jour sur le traitement d'une maladie aussi grave & aussi fréquente que l'épilepsie; cela m'a obligé à réunir une multitude d'observations qui ont rendu ce chapitre extrêmement long; & cette longueur pouvant empêcher plusieurs lecteurs d'en saisir exactement l'ensemble, il ne sera peut-

être pas inutile de rappeler ici en peu de mots, sous un petit nombre d'articles, les principaux objets qui doivent fixer l'attention.

I. L'épilepsie dépend toujours de la cessation de l'action des nerfs sentans, & de l'augmentation de celle des nerfs mouvans; par-là même il y a toujours perte totale de sentiment, & convulsion ou spasme dans plusieurs, ou seulement dans quelques muscles.

II. Les accès varient non-seulement beaucoup en durée, mais aussi dans leurs phénomènes, suivant que l'irritation se porte à plus ou moins de muscles, & à différens muscles.

III. L'accès est quelquefois présagé par différens symptômes qui dénotent ou un commencement d'embarras dans la tête, ou un commencement d'irritation dans les parties éloignées, & dans ce cas on peut quelquefois supprimer l'accès par une forte ligature au-dessus de l'endroit où l'irritation commence.

IV. Comme le cerveau, les nerfs & les muscles sont très-fatigués pendant l'accès, s'ils se répètent souvent, ils altèrent les fonctions du cerveau,

affoiblissent la mémoire, jettent dans l'imbécillité, produisent des maux de nerfs, détruisent les digestions, laissent dans une foiblesse générale, & font éclore d'autres maux qui sont une suite de ces premiers.

V. Quelquefois l'épilepsie succède à d'autres maladies; d'autres fois elle cesse & produit une maladie différente; j'ai vu tout récemment un malade chez lequel cette marche étoit très-marquée: le dérangement de sa santé avoit commencé à l'âge de quinze ans, par de fortes migraines; bientôt il s'y joignit un autre accident, qu'on appella *vertige*, mais qui étoit réellement épilepsie, puisque le malade se sentoît tout-à-coup la tête embarrassée, & perdoit un instant la connoissance avec une très-légère convulsion; le mal devenant plus long & plus fort, il eut, il y a deux ans, des accès d'épilepsie les plus marqués, qui ont dégénéré en foiblesse totale des nerfs moteurs, de façon que l'action de tous ses muscles est considérablement gênée & affoiblie; il parle, mâche, avale, marche très-péniblement & très-mal; l'usage de ses bras n'est pas plus facile, sa

mémoire a beaucoup souffert, les autres facultés ne paroissent pas sensiblement endommagées.

VI. Cette maladie est produite par tout ce qui peut irriter assez les nerfs pour faire entrer le cerveau en convulsion, & ces causes sont ce qu'on appelle les *causes procatartiques*; mais la disposition d'un cerveau plus susceptible de convulsion qu'il ne devoit l'être dans l'état de parfaite santé, est ce qui s'appelle *cause prééminente*.

VII. Ces causes procatartiques ont leur siège ou dans la tête, & agissent immédiatement sur le cerveau; on les appelle *idiopathiques*; ou dans quelques parties éloignées, soit internes, soit externes; on les appelle *sympathiques*, & il y en a un grand nombre; elles résident ou dans les solides ou dans les fluides.

VIII. Les humeurs âcres portées sur le cerveau, sont une des causes qui le plus souvent produisent cet effet; on a vû plus haut une épilepsie succéder à une galle repercutée, cela est ordinaire après les dartres: j'ai vû un malade chez qui l'humeur de la goutte produisit, entre une foule d'autres

maux, trois accès véritablement épileptiques.

IX. Ces causes procatartiques sont elles-mêmes mises en action par les causes accidentelles qui se tirent des variations perpétuelles dans les fix choses non-naturelles. La trop grande sobriété même nuit; on a vu un homme d'ailleurs très-bien portant, avoir deux accès d'épilepsie en sa vie, & n'en avoir que ces deux-là, occasionnés l'un & l'autre par un trop long jeûne (x), qui avoit sans doute rendu les humeurs trop âcres.

X. On est d'autant plus exposé à cette maladie, que les nerfs sont plus sensibles; par-là même, les enfans, les femmes & les gens foibles en sont plus attaqués que les vieillards, les hommes & les personnes robustes.

XI. Les passions, & sur-tout la crainte, la peur, la tristesse, les chagrins & les regrets, la produisent plus souvent que les dérangemens physiques. J'ai vu plusieurs malades chez qui il étoit impossible d'assigner d'autres cau-

(x) WAINEVRIGHT *on nonnaturals.*
page 172.

tes qu'un chagrin soutenu, une vie malheureuse, qui rend les nerfs trop sensibles, & les humeurs âcres.

XII. Quand la convulsibilité du cerveau est devenue très - considérable, les accès sont reproduits par des causes si légères, qu'ordinairement elles échappent.

XIII. Quelquefois l'épilepsie est incurable, mais elle l'est moins souvent qu'on ne l'a cru, & si on la guérit si peu, il y en a deux raisons ; la première, c'est que sans donner aucune attention aux causes éloignées qui la produisent, aux causes occasionnelles qui la renouvellent, & à la constitution physique du malade, on a voulu guérir tous les épileptiques par des remèdes spécifiques, qui, sans agir sur les causes éloignées & sur les vices de tempérament, & sans pouvoir corriger les erreurs du régime, dont l'observation est si importante dans cette maladie, n'étoient destinés qu'à agir sur le cerveau même ; la seconde, c'est que les moyens qu'on employoit ordinairement pour cela, étoient incapables d'opérer cet effet.

XIV. Pour se mettre en état de gué-

rir cette maladie, il faut commencer par s'assurer s'il y a quelque cause sympathique qui l'entretienne, & quelle elle est; ou si elle est idiopathique, c'est-à-dire, si elle dépend uniquement de la grande convulsibilité du cerveau, & observer avec soin quelles sont les causes accidentelles qui la reproduisent le plus souvent, & quels sont les vices de constitution qui peuvent se trouver dans le malade.

XV. Pour la guérir, il faut, si elle est sympathique, détruire sa cause par les moyens que la médecine indique pour cela; ensuite, si la convulsibilité du cerveau subsistoit après que cette première cause est détruite, employer les moyens propres à la déraciner. Si elle est idiopathique, il faut prescrire la façon de vivre la plus propre à empêcher que les humeurs ne se portent à la tête, en faisant observer une grande sobriété & un régime très-doux. S'il y a plethore, obstructions, sécheresse, y remédier par la saignée, les délayans, les purgatifs, les bains tièdes; il arrive souvent que ces remèdes guérissent les épilepsies qui dépendent de quelque-une des causes que je viens

d'assigner, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux spécifiques; j'en ai rapporté plusieurs exemples, & l'on n'a rien dit de mieux sur la guérison en général, que ce qu'en dit CELSE. Il recommande, „ de ne manger que peu de viande;
 „ & point de celle de cochon, d'éviter
 „ le soleil, les bains chauds, le feu, le
 „ vin, tout ce qui peut échauffer, les
 „ plaisirs de l'amour, le froid, la vue
 „ d'un précipice, tout ce qui peut ef-
 „ frayer, la fatigue, les inquiétudes,
 „ les affaires (y).

XVI. Quand on a mis le corps dans un très-bon état, qu'il ne reste d'autre vice que la convulsibilité du cerveau & la mobilité des nerfs, & qu'on n'a plus à craindre que les spécifiques, qui ont tous quelque chose de stimulant, nuisent plus en enflammant le sang & en le portant à la tête, qu'ils ne feroient de bien en fortifiant les nerfs, on peut les employer; le meilleur de tous est la racine de valériane sauvage, en poudre, ou en extrait spiritueux. Le bain froid, le lait, les cauterés, le musc, les feuilles d'oranger, sont aussi très-souvent des remèdes utiles.

(y) *De medicina*, L. 3. C. 23. pag. 173.

XVII. Il ne peut point y avoir de spécifique immanquable ; celui qui le promet est ignorant ou fripon ; celui qui le prend , dupe ; & ces spécifiques vantés manquent tous les jours ; mais les charlatans qui les donnent , ont ordinairement soin de prescrire tant d'observances minutieuses & difficiles , qu'il est impossible de ne pas manquer à quelque-une ; & l'infraction à cet égard sert alors d'excuse au peu de succès du remède.

XVIII. Par une contradiction bien singulière , l'épilepsie est la maladie que les fourbes jouent le plus souvent , & que les vrais malades redoutent le plus.

XIX. La fausse honte qu'on y attache , est un malheur réel qui contribue à l'augmenter , & il seroit à souhaiter qu'on parvint à la regarder comme les autres maladies. Le préjugé populaire à cet égard est la suite d'une antique superstition dont HIPPOCRATE avoit déjà montré le ridicule , & qui se soutient cependant depuis plus de deux mille ans.

F I N.

616279



